


ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРІЯ ЦАРСТВА ЖИВОТНЫХЪ,

въ изображенияхъ

СНЯТЫХЪ И РАСКРАШЕННЫХЪ СХОДНО СЪ НАТУРОЮ









90 us.

ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРІЯ

животныхъ млекопитающихъ

ВЪ ИЗОБРАЖЕНІЯХЪ.

СНЯТЫХЪ И РАСКРАШЕННЫХЪ СХОДНО СЪ НАТУРОЮ.

для нагляднаго изученія

ВЪ ОБЩЕСТВЕННЫХЪ ЗАВЕДЕНІЯХЪ И ПРИ ДОМАШНЕМЪ ОБРАЗОВАНІИ ЮНОШЕСТВА.

СОСТАВЛЕНА ПО ПРОСТРАННОМУ УЧЕБНИКУ ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРІИ ПРОФЕССОРА

ШУБЕРТА

КАКЪ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНІЕ

ко всякому учебному руководству,

СЪ ПРИЛОЖЕНИЕМЪ КРАТКАГО ПОЯСНИТЕЛЬНАГО ТЕКСТА.

СЪ НЪМЕЦКО-ФРАНЦУЗСКАТО ПОДЛИННИКА ПЕРЕВЕЛЪ

Г. И. КОРИ.


ПЯТОЕ ИЗДАНІЕ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ. изданіе книгопродавца ф. а. витепажа. Дозволено цензурою. С.-Петербургъ. 10 Октября 1879 г.



-		ì	CHI	1 Г А	им	EE	Î	
Лечатн.	Выпуск	В перепл. един. соедин. №М вып.	Таблии	Карт	Иллюстр.	Служебн.	№№ списка и порядковый	1955 r.
5					90	627	30	92



млекопитающія.

(Mammifera - Mammifères - Säugethiere).

таблица І.

Обезьяны (Simia—Singes—Affen).

- I. Орангутангъ (Simia Orang-outang Der Orang-outang). Эта порода обезьянь, не имѣя ни хвоста, ни защечныхъ мѣшечковъ, ни мозольныхъ затвердѣній на ляшкахъ, замѣчательна сходствомъ съ человѣкомъ и водится въ самыхъ жаркихъ странахъ Азіи и Африки, а также на островахъ Индѣйскаго Океана. Виды ея:
- а) Шимпансъ (Simia troglodites Chimpanzé Der Schimpanse) шерсти черной или темнобурой, имѣетъ руки, достигающія до колѣнъ; все тѣло, кромѣ живота и заднихъ ляшекъ, покрыто рѣдкими волосами, которые на щекахъ гуще и длиннѣе. Средній ростъ у молодаго Шимпанса отъ 2 до 3 фут.; старые доростаютъ до 5 фут.; обитаетъ въ лѣсахъ материка Средней Африки, въ областяхъ Анголѣ и Конго; оказываетъ способность къ выучкѣ разнымъ штукамъ.
- б) Азіатскій Орангутангъ (Simia satyrus L'Orang-outang d'Asie Der Asiatische Orang-outang). Отличается отъ предъидущаго болье длинною шерстью краснобураго цвёта и болье длинными руками. Заднія ляшки такія же, какъ у Шимпанса. Орангутанги этой породы, хотя и вывозятся въ Европу, но только въ молодомъ еще возрасть и не достигшими еще полнаго развитія (не болье 2 ½ до 3 фут. вышины). Они чрезвычайно переимчивы и при этомъ смѣшны и довольно смирны; водятся въ дикомъ состояніи по льсамъ Южной Азіи, полуострова Малакки и острова Борнео. Въ Европъ они не живучи.
- II. Гиббонъ или Жиббонъ (S. Hylobates Gibbon Der Gibbon). Этотъ родъ обезьянъ также походить на человѣка; не имѣетъ ни хвоста, ни челюстныхъ мѣшечковъ. Руки у него достигають до земли. Виды его:
- c) Длиннорукій Гиббонъ (S. Lar—Le Gibbon à long-bras Der langarmige Gibbon), темнокоричневой шерсти.
- d) Связнопалый Гиббонъ (S. Hylobates syndactilus—Le Siamang—Der Siamang). Цвёта

чернаго, ростомъ 3 1/2 фут.; водится въ лѣсахъ острова Суматры большими стадами, которыя при восхожденіи и захожденіи солнца поднимають страшный крикъ, слышный на разстояніи нѣсколькихъ миль. Лазитъ по деревьямъ медленно и прыгаетъ неловко.

таблица и.

Мартышка безхвостая или такъ называемая обыкновенная обезьяна (Inuus ecaudatus—Le Magot ou singe commun—Der Magot oder sogenannte gemeine Affe) не имѣетъ собственно хвоста, а на мѣсто его — отвисшую шкурку; цвѣтъ его зеленовато-бурый; родина—Сѣверная Америка, нерѣдко является у насъ въ странствующихъ звѣринцахъ.

Мартышки (Cercopithecus—Le cercepithèque —Die Meerkatzen-Affen) имѣютъ хвостъ и защечные мѣшечки.

Къ этой породѣ принадлежитъ большая часть обезьянъ Стараго Свѣта (Остъ-Индіи и Африки). Онѣ водятся большими стаями; большею частью чрезвычайно прытки и ловки и, живя по сосѣдству обитаемыхъ мѣстъ, охотники опустошать сады. Извѣстнѣйшіе изъ видовъ мартышекъ:

- a) Бурый Санажу (Cebus apella—Le sapajou ou sajou brun Der braune Sapajou) небольшое, хорошенькое животное. Съ помощью длиннаго свивающагося хвоста своего выдёлываеть необыкновенно-ловкія и быстрыя движенія.
- b) Зеленая Мартышка (Cebus sabaeus Le singe vert d'Afrique — Der grüne Sapajou). Спина зелено-оливковаго цвёта, съ сёрымъ отливомъ, животъ бёловатый, лицо черное. Живетъ стадами по деревьямъ и нерёдко вывозится къ намъ, въ Европу.
- с) · Павіанъ (Cynocephalus—Le Babouin ou Cynocephale Der Pavian) имѣетъ морду высунувшуюся впередъ; продолговатая голова его походитъ на собачью. На задлихъ ляшкахъ у него разноцвѣтныя мозольныя затвердѣнія. Защечные мѣшечки просторнѣе, хвостъ бываетъ и длинный, и короткій. Павіанъ—животное презлое и, обладая значительною силою, для человѣка опасенъ. Съмолода еще можно его кое-какъ приласкать, но въ старости онъ неукротимъ. Павіаны водятся какъ въ Азіи, такъ и въ Африкѣ, ватагами и питаются плодами, кореньями,

большою осторожностью.

- d) Мандриль (Cynocephalus Mormon Le Mandrill — Der Mandrill) — съ короткимъ хвостомъ и длинными клыками. Носъ и ляшечныя мозоли отличнаго краснаго цвёта, волосъ жесткій и длинный, лице морщинистое, красиваго синяго цвъта; ростъ - до 4 фут.; мъсторожденіе—Гвинея. Мандриль животное дикое и злобное.
- e) Ревунъ черный или Алуатъ (Stentor Beelzebub, Pithecia Satanas — Le hurleur noir-Der schwarze Brüllaffe oder Waldteufel) цвъта чернаго, съ густою бородой; водится стадами въ Бразиліи. Ревъ его раздается по ночамъ, сперва по одиночкѣ, но вскорѣ общимъ рычаніемъ цёлой компаніи.

Породы Сапажу (Cebus) не им'вють защечныхъ мъщечковъ ляшечныхъ мозолей: хвостъ у нихъ свивающійся, весь въ волосахъ; родина въ Америкъ; онъ меньше ростомъ, нежели обезьяны Стараго Свёта и вообще болёе кроткаго нрава.

ТАБЛИЦА ІІІ.

- а) Ревунъ медвѣжій (Mycetes ursinus Le hurleur ourson — Der bärenartige Brüllaffe). Волосъ длинный, изкрасна-бурый, лицо черновато-синее, съ длинною бородой. Это одна изъ самыхъ обыкновенныхъ обезьянъ Южной Америки, такъ что нередко можно ихъ видѣть по сорока на одномъ деревѣ. Самцы во всякое время производять страшній ревъ, громкимъ, похожимъ на барабанный бой голосомъ своимъ.
- b) Монахъ или плаксивый Сапажу (Cebus capucinus - Saï ou le pleureur - Der Winselaffe oder Kapuzineraffe). Масти коричневой, часто меняеть шерсть, равно какъ и цветь ея. Видъ этотъ весьма обыкновененъ.
- с) Желтый Сапажу или Тити (Callithrix sciurea — Le sapajou jaune — Das Sachoinchen oder Titi, Eichhornäffchen) цвѣта оливковаго; мордка и рыльце черноватыя, переднія части рукъ и ноги ржаваго цвъта. Миловидная обезьяна эта немного больше бѣлки; живой и кроткій звірекъ. Встрічается въ Южной Америкѣ и, по забавности своей, нерѣдко содержится въ домахъ. При отдыханіи это животное обертываеть хвость свой вокругь шеи.

- листьями и яицами. Сады они грабять сь d) Левъ-Мартышка (Hapale rosalia—Le petit singe lion — Das Löwenäffchen) золотистожелтаго цвъта, съ длинною гривою у головы; чрезвычайно красива.
 - е) Маки (Lemur—Lemur—Per Maki). Морда острая, похожая на лисью, хвость волосистый, длиниве твла. Веселое, проворное животное, держится постоянно на деревьяхъ и встръчается только на островѣ Мадагаскарѣ; питается преимущественно плодами.

ТАБЛИЦА IV.

Нетопыри — летучія мыши (Vespertilio — Chauves-souris - Fledermäuse).

У этой породы животныхъ, между длинными пальцами переднихъ ногъ и задними ногами, натянута тонкая обнаженная шкурка, съ помощью которой нетопыри летають такъ легко и шибко, какъ птицы; за-то ходить имъ весьма трудно. Для отдохновенія, онъ цъплются задними ногами или большимъ пальцемъ переднихъ ногъ, закидывая при этомъ полетную шкурку вокругъ тъла. Это большею частію ночныя животныя; днемъ онъ прячутся въ норахъ, откуда появляются только въ сумерки. Въ странахъ съверныхъ онъ проводять зиму сномъ, въ разеблинахъ, вися на заднихъ ногахъ и завернувшись въ свою летательную кожицу. Въ теплые дни просыпаются и летають, но при появленіи мал'яйшаго холода костен'яють. Нетопыри хотя живуть вмѣстѣ, но часто между собою грызутся. Европейскія летучія мыши питаются нас'вкомыми, которыхъ ловятъ на-лету; въ другихъ же странахъ онъ сосуть и кровь, а некоторыя едять илоды и цветы. Оне выводять обыкновенно по одному, а изръдка и по два д'ятеныша, которыхъ носять у сосковъ, пока дѣти не выростутъ. Виды нетопырей:

- а) Летучій песъ (Pteropus edulis—Le ptérope ou chien volant - Der fliegende Hund, das Flatterthier) водится на островахъ Южнаго Океана, самая большая, но наименте безобразная изъ летучихъ мышей. Имветъ красивую лоснящуюся шерсть и нѣкоторое сходство съ собакою. Летательная кожица промежду ляшекъ у него представляетъ значительные выкружки; питается большею частью сокомъ растеній и плодами. Разм'єрь его сь распущенными крыльями до 3 фут. и болъе.
- b) Кровососъ или Вамниръ (Vespertilio Vam-

ругиз Vampyre — Der Vampyr, Blattnase). Водится въ Южной Америкѣ. По ночамъ нанадаетъ на спящихъ людей и животныхъ и высасываетъ у нихъ кровь, при-чемъ опахиваетъ ихъ крыльями своими, чтобъ не проснулись.

- c) Летучая мышь обыкновенная или простая (Vespertilio murinus Chauve-souris ordinaire Die gemeine Fledermaus). Уши длиною наравив съ головой, хвость почти одинаковой длины съ туловищемъ.
- d) Ушанъ (plecotus, Vespertilio auritus—l'Oreillard Die langöhrige Fledermaus). Длина ушей почти одинакова съ туловищемъ, а въ срединѣ они кажутся какъ бы двойными.
- e) Подковникъ. Подковчатая летучая мышь (Equinus-Rhinolope—La Chauve-souris—Fer-à-cheval—Die Hufeisennase) имѣетъ по объ-имъ сторонамъ носа лунообразные листки, соприкасающіеся надъ верхнею губою и образующіе здѣсь рубчикъ, такъ что выходитъ подобіе подковы.
- f) Летучія Маки (Galeopithecus volans Le galléopithêque Der fliegende Maki, Flattermaki) подходить почти болье къ обезьянамъ, нежели къ нетопырямъ. Летательная кожица служить ему только парашютомъ и находится лишь между задними ногами и хвостомъ. Величиною летучій Мани равняется кошкъ, бъгаеть и лазить проворно и ловко перекидывается съ одного дерева на другое. Родина его Молукскіе острова.

ТАБЛИЦА V.

Хищные звъри (Carnivora—Carnivores—Raubthiere).

Виверры, циветы (Viverrae—civettes—Viverren).

- а) Цибетъ (Viverra Zibetha— Civette (proprement dite) Die Zibethkatze) шерсти сърой, на ляшкахъ и по сторонамъ туловища черныя поперечныя полосы; хвостъ длинный, въ бѣлыя и коричневыя кольца; длина туловища почти 2¹/2 фута; у задней части оба пола снабжены мѣшечкомъ, раздѣляемымъ на-двое и отдѣляющимъ отъ себя сильно-пахучую матерію, называемую также цибетомъ. Водится въ Остъ-Индіи.
- b) Kypma (Herpestes Ichneumon—La Mangouste d'Egypte, ou Rat de Pharaon—Der Ichneu-

товище длинное и гибкое, длиною въ 1 ½ фута; хвостъ такой же длины, съ кистью на концѣ. Шерсть каштановаго цвѣта, въ желтыя колечки; животное это водится въ Египтѣ и весьма полезно тѣмъ, что истребляетъ крокодиловы яица, змѣй и мышей. (Въ древности ему поклонялись).

- c) Индѣйскій Ихневмонъ или Индѣйская Курма (Herpestes Mungos La Mangouste des Indes orientales Der Ostindische Ichneumon). Извѣстенъ и уважается какъ истребитель змѣй. Разсказывають, что, будучи укушенъ змѣею (что рѣдко случается), онъ отыскиваетъ травы, которыми спасаетъ себя.
- d) Куница (Mustela Martes—Marte de bois—
 Der Baummarder, Edelmarder) красивато каштановато цвѣта, съ яично-желтою подшейкой. Живетъ въ дуплахъ и почти не
 показывается въ жилищахъ людей. Преслѣдуетъ мышей, бѣлокъ, молодыхъ зайцевъ,
 тетеревей, глухарей, куропатокъ и другую
 штицу и вредитъ дичи болѣе, нежели чего
 сто́итъ его хорошій мѣхъ.
- e) Тумакъ (Mustela-foina La fouine Der Steinmarder) — темнокоричневаго цвъта съ бѣлою шейкою; это хитрое и проворное животное -- одинъ изъ самыхъ жестокихъ хишниковъ. Днемъ скрывается въ разселинахъ скаль и въ старыхъ строеніяхъ, а ночью искусно и осторожно прокрадывается къ домашнимъ уткамъ и гусямъ, гдв душитъ все на поваль, и оставляеть по себъ такое зловоніе, что птица посл'є того не хочеть ужь идти въ птичникъ, имъ посѣщенный. Онъ обыкновенно только откусываеть у птицы голову, которую и пожираеть, а за тъмъ высасываеть кровь изъ туловища. Въ зимнее же время, при недостаткъ къ пищъ, онъ събдаетъ и всю птицу.
- f) Хорекъ (Mustela putorius—Le Putois—Der Iltis). Туловище коричневое, ноги и хвость черные, мордка и уши бѣловатыя; нѣсколько меньше куницы; распространенъ по всему нашему краю и водится какъ по лѣсамъ и полямъ, такъ и въ домахъ, куда переселяется въ особенности на зиму. На деревъя взбирается рѣдко. Главную пищу его составляютъ мыши; но любитъ онъ тоже и яица и преслѣдуетъ птицу; забравшись въ птичникъ или курятникъ, онъ умерщвляетъ

не все, а довольствуется одною жертвою, которую и увлекаеть въ свой притонъ.

ТАБЛИЦА VI.

- а) Ласочка (Mustela vulgaris—La Bellette— Das kleine Wiesel). Туловище длинное и гибкое, красновато-коричневое, хвость одноцвѣтный, нѣсколько свѣтлѣе; водится во всей Европѣ, по полямъ, огородамъ и по сосѣдству домовъ; — опасный врагъ домашней птицѣ и яицамъ ея.
- b) Горностай (Mustela Erminea—L'Hermine—
 Das Grosse Wiesel oder der Hermelin) гораздо больше предъидущаго. Лѣтомъ красновато-бурый, на зиму бѣлѣетъ и только кончикъ хвоста во всякое время остается чернымъ. Необыкновенно проворенъ, лазитъ и
 плаваетъ хорошо; водится во всей Европѣ
 и въ Сибири. Зимній мѣхъ горностая сѣверныхъ странъ цѣнится высоко. Эта порода ласокъ питается мышами, но охотно
 высасываютъ и яица, а потому опасный врагъ
 для всякой птицы; нападаетъ также и на
 молодыхъ зайцевъ.
- c) Африканскій хорекъ (Mustela furo—Le Furet—Das Frettchen) изжелта бѣлый, съ красными глазами; водится въ Европѣ только какъ животное домашнее, пріучаемое къ ловлѣ кроликовъ.
- d) Соболь (Mustela Zibellina La Zibeline Der Zobel) черно-коричневый; ноги густо покрыты волосомъ. Ростомъ онъ одинаковъ съ куницею; живетъ въ Сибири, по дупламъ и подземнымъ норамъ. Мѣхъ его очень дорого цѣнится. Ловля соболей производится зимою, и отправляющіеся за нимъ охотники запасаются живностью на нѣсколько мѣсяцевъ, поселяются въ шалашахъ и ловятъ соболей сѣтями.
- е) Вонючка или Шинтъ, Вонючка вивера (Мерhitis Moufette Das Stinkthier). Величиною съ куницу, блестящаго чернаго цвѣта, съ бѣлыми продольными полосами; шерсть длинная, хвостъ двустрочный, пальцы почти совсѣмъ сросшіеся, когти вытянутые. Это животное водится въ Америкѣ, живетъ въ норахъ и питается плодами, насѣкомыми и птичками. Отдѣляющаяся у него изъ проходныхъ железъ жидкость такъ зловонна, что запахъ ея оглушаетъ людей и цѣлый домъ можетъ быть зачумленъ ею на долгое время.

Выдры (Lutra—La Loutre—Die Fischotter).

Имѣютъ у ногъ пальцы, соединенные между собою плавательными перепонками. Туловище плотное, ноги коротки. Это животныя ночныя, хорошо плавающія и ныряющія; почему и нелегко ихъ стрѣлять или ловить. Виды ихъ:

- f) Выдра обыкновенная (Lutra vulgaris—Loutre commune — Der gemeine Fischotter), темнобураго цвъта. Морда широкая и короткая. Европейскія выдры водятся по берегамъ ръкъ и озеръ и живутъ на яминахъ, вымытыхъ водою, которыя онъ, для помъщенія своего, приспособляють. Пища состоить изъ раковъ, рыбы и лягушекъ, на ловлю коихъ онъ отправляются по ночамъ. Мелкую рыбу онъ глотають въ водъ, а крупную выносять на берегь и обгрызають, оставляя голову и спинную кость. Самка выводить отъ 2 до 4 слѣныхъ дѣтенышей за-разъ. — Мясо выдры, хотя и не лакомство, въ некоторыхъ мъстностяхъ однакожъ ъдятъ. — Она доростаетъ до 40 фунтовъ въсу, а шкура ея оплачивается довольно дорого.
- g) Морская выдра (Lutra marina—La loutre de mer—Der Seeotter) вдвое больше обыкновенной рѣчной, имѣетъ короткія заднія ноги, уши низенькія, хвостъ не очень длиненъ. Цвѣта темнобураго, съ блестящимъ крапомъ. Обитаетъ по берегамъ Камчатки и Сѣверо-Западной Америки и даетъ драгоцѣнные мѣха, во множествѣ вывозимые въ Китай.

ТАБЛИЦА VII.

Порода кошекъ (Felis — Les chats — Das Katzengeschlecht).

а) и b) Левъ (Felis Leo—Le Lion—Der Löwe) блѣдно-желтаго цвѣта; рость длиною отъ 8 до 9 футъ; длина хвоста отъ 3 до 4 фут.; когти, какъ и у всѣхъ кошечьихъ видовъ, втягиваются. Левъ-самецъ имѣетъ у плечь гриву, которой у львицы нѣтъ. Левъ обитаетъ во всѣхъ частяхъ Африки и въ прилежащихъ краяхъ Азіи и представляетъ нѣсколько видоизмѣненій, въ числѣ коихъ Сенегальскій левъ отличается самою короткою гривою. Великолѣннаго и страшнаго звѣря этого именуютъ царемъ звѣрей. Сила его изумительна. Онъ уноситъ быка съ такою же легкостію, какъ кошка мышь или крысу; ударомъ ланы раздробляетъ у лошади

спинную кость, опрокидываеть хвостомъ самаго сильнаго человека и бросается на добычу свою прыжками въ 20 и до 36-ти фут. Видъ его величественъ, голосъ — страшное рычаніе, приводящее въ ужасъ всёхъ обитателей лъса; онъ однако же несравненно менѣе отваженъ, нежели тигръ и не такъ кровожаденъ. Обыкновенную пищу его составляють обезьяны и дикія козы. Предъ человѣкомъ левъ имѣетъ инстинктивный страхъ и нападаеть на него только при сильномъ голодъ. Львы живуть попарно, а самка выводить отъ 2 до 4 львенковъ за-разъ. Левъ не боится никакого другаго звъря. Днемъ рѣдко отправляется за добычею, по ночамъ же ложится въ засаду, или подкрадывается ползкомъ, такъ близко, чтобы схватить добычу свою однимъ прыжкомъ. Льва можно укротить, но и тогда надобно остерегаться, чтобъ не раздражить его природной кровожадности. Ловять его большею частью въ ямахъ.

- c) Тигръ (Felis Tigris—Le Tigre—Der Tiger) свътлобураго цвъта, съ поперечными черными полосами; доростаеть 8 и 9 фут. длины и водится только въ самыхъ жаркихъ полосахъ Азіи, а именно въ Остъ-Индіи, гдѣ львы вовсе не водятся. Это самый страшный изъ хищныхъ звърей, не только по неимовърной силъ своей, но и потому, что не знаетъ для себя никакой опасности. Тигръ избираетъ для жительства своего преимущественно мѣста населенныя и до такой степени дерзокъ, что нередко бросается на толну вооруженныхъ людей и, выхвативъ изъ нея одного, уносится съ нимъ. Онъ умерщвляетъ и въ то время, когда не побуждаеть его къ тому голодъ — изъ одной страсти душить. Это животное составляеть страшнъйшій бичь жителей Ость-Индіи, гдв ежегодно пожираеть множество народа и дѣлаетъ путешествія опасными. Тигрица выводить отъ 3 до 4 дѣтенышей за-разъ. Что тигръ-самецъ нерѣдко самъ пожираетъ своихъ дѣтей, въ томъ нужно признать мудрость Творца.
- d) Ягуаръ (Felis Onca—Le Jaguar—Der Jaguar) отличается блеклостью желтаго цвѣта и продольными рядами черныхъ, кольцеобразныхъ пятенъ, имѣющихъ по срединѣ черную-же точку. Цвѣтъ шерсти на груди и животѣ бѣлый, съ черными пятнами. Это самое большое и опасное изъ хищныхъ жи-

вотныхъ Южной Америки, достигаетъ 5 фут. длины и нападаетъ на всёхъ прочихъ животныхъ. Ягуаръ производитъ въ стадахъ домашняго скота страшныя опустошенія и въ состояніи, схвативъ лошадь въ пасть свою, волочь ее по землё на большое разстояніе. Рогатый скотъ храбро обороняется противъ ягуара, но лошади и лошаки легко становятся его добычею. Никогда не умерщвляетъ онъ болёе одного животнаго вдругъ, въ чемъ имёетъ сходство со львомъ.

Въ мѣстахъ населенныхъ ягуаръ боится человѣка, но въ отдаленіи отъ жилищъ, боязнь эта проходитъ, и онъ даже гонится за нимъ. Опасный звѣрь этотъ обрѣтается на пространствѣ между рѣками Ориноко и Лаплата.

ТАБЛИЦА VIII.

- а) Леопардъ (Felis leopardus—Le Leopard—
 Der Leopard) цвѣта чалаго (блекло-желтаго)
 съ продольными рядами черныхъ пятенъ,
 имѣющихъ очеркъ розеты, но безъ точки по
 серединѣ. Хотя леопардъ ростомъ и меньше
 льва, однако же чрезвычайно опасенъ для
 домашнихъ стадъ. Водится по всей Африкѣ и въ болѣе жаркихъ частяхъ Азіи.
- þ) Кугуаръ (Felis concolor—Le Cuguar—Der Cuguar) изкрасна-сѣраго цвѣта, иногда съ поблекшими будто пятнами. Туловище до 3 фут. длины, хвостъ 2 фута; водится по всей почти Южной Америкѣ и въ Сѣверной Африкѣ. Ловко прыгаетъ и лазитъ по деревьямъ.
- c) Рысь (Felis Lynx—Le Lynx—Der Luchs) красновато-блеклый съ неясными пятнами; уши острыя, съ волосистою кисточкою по концамъ; хвостъ коротокъ; длина туловища 31/2 ф. Это самый большой изъ видовъ кошекъ, обитающихъ въ нашей части свъта въ дикомъ состояніи. Въ Германіи и во Франціи рыси почти совершенно истреблены и только изредка встречаются въ лесистыхъ горахъ Богеміи, Баваріи и Швейцаріи. Этотъ отважный хищный звърь хотя и боится человека, но для домашнихъ животныхъ онъ тѣмъ опаснѣе, что душить все, что ни попадется ему. На ловлю рысь выходить въ вечерніе и утренніе сумерки и пресл'ядуеть сернъ, ланей, барановъ, мышей, равно какъ и всякую птицу. Засѣвъ на деревѣ или за

кустами, онъ изъ этой засады бросается на свою жертву и прокусываеть у нея шейную артерію. Если ему не удалось догнать добычу нѣсколькими прыжками, то онъ ее далье и не преслѣдуеть. Мѣхъ рысій довольно дорогъ.

- b) Дикая кошка (F. catus ferus, silvestris— Le chât sauvage — Die wilde Katze) изжелта-красно-съраго цвъта съ черными поперечными кольцами; длина туловища 2 ½ фута, хвость 1 футь. Встръчается по всей Европъ въ лъсахъ, гдъ гнъздится въ дуплахъ, и въ покинутыхъ норахъ лисицъ и барсуковъ. Лазитъ по деревьямъ отлично, и въ почное время дълаетъ большія опустошенія между всякою дичью. Въ томъ числъ не щадитъ и зайцевъ; но за то истребляетъ, множество мышей и кротовъ. Стръляя въ нее, надобно быть весьма осторожнымъ, потому что она часто бросается на охотника и можеть опасно изранить его.
- c) Котъ домашній (Felis domestica—Le chât domestique Die Hauskatze) всякому извѣстенъ.

таблица іх.

Гіена (Hyaena — La Hyène — Die Hyäne). Отличительные признаки ея: высокія ноги и когти невтягивающіеся; уши длинны и остроконечны, хвость коротокъ, а подъ заднею частью находится железистый кармашекъ.

Это животное, —сильное, дикое, злобное и раздражительное, —не выпускаеть изъ зубовъ то, что разъ захватить. Живетъ большими стадами, на человѣка не нападаетъ, но и не даетъ ему дороги. Днемъ гіена скрывается въ пещерахъ, но по ночамъ проникаетъ въ селенія и города и захватываетъ домашнюю скотину, собакъ и даже дѣтей, если встрѣтитъ внѣ домовъ. Преимущественно она питается падалью и откапываетъ даже трупы изъ могилъ. За караванами она слѣдуетъ для того, чтобы воспользоваться павшею въ дорогѣ или отставшею отъ каравана скотиною. Гіенъ имѣется два вида:

a) Гіена полосатая (Hyaena striata—La Hyène rayée — Die gestreifte Hyäne) изсъражелтая, бока и ноги отмъчены чернобурыми поперечными полосами; по всей спинъ идетъ короткая грива. Достигаетъ 5-ти футовъ дли-

ны; водится въ Сѣверной Африкѣ и въ теплыхъ полосахъ Азіи.

b) Гіена крапчатая или пестрая (Hyaena crocuta — La Hyène mouchetée — Die gefleckte Hyäne). Изжелта-сърая, съ темными пятнами.

Собака (Canis — Le Chien — Der Hund). Морда заостреная; у переднихъ ногъ 5, у заднихъ 4 невтягивающихся когтя. Порода эта распространена по всему земному шару и представляетъ множество видовъ, изъ ко-ихъ большая часть живетъ стаями.

- c) Собака дворовая (Canis domesticus Le mâtin Der Haushund).
- d) Собака охотничья (Canis venaticus—Le chien de chasse—Der Jagdhund). Изъ всёхъ домашнихъ животныхъ, ни одно не представляетъ такого множества видоизмѣненій, относительно шерсти и роста, какъ собака. Извѣстнъйшіе виды зея:

Догга или бульдогь (Canis mastivus — Le Dogue — Die Dogge).

Mocька (Canis fricator — Le doguin — Der Mops).

Пудель (Canis aquaticus—Le barbet—Der Pudel).

Лягавая собака (Canis avicularis — Le chien d'arrèt — Der Vorstehhund, Hühnerhund).

Гончая собака (Canis venaticus—Le chien coureur—Der Jagdhund).

Борзая собака (Vertagus—Le Lévrier—Der Windhund, Das Windspiel).

Takca (Canis vertagus — Le basset — Der Dachshund).

Bолонка (Catellus—Le bichon—Der Schoshund, Bologneser).

Такъ какъ всѣ эти роды собакъ общеизвѣстны, то описывать каждый отдѣльно нѣтъ надобности, а достаточно пройти общую характеристику этого домашняго животнаго.

Съ наидревнъйшихъ временъ собака поступила въ услужение къ человъку и сопровождала его по всъмъ концамъ свъта. Она единственно изъ всъхъ прочихъ домашнихъ животныхъ привязалась къ нему съ любовью и повинуется человъку не изъ одного страха, а изъ привязанности. Изъ всъхъ органовъ чувства, самый сильный у собаки есть обоняніе, чутье, которое у нея върнъе зрънія и слуха. По чутью отыски-

ваетъ она и признаетъ своего хозяина и преследуеть зверя. Бегь собаки скорь и неутомимъ; она никогда не пответъ, а только выввшиваеть языкъ при усталости. Какъ животное хищное, — она любитъ мясо, въ особенности гнилое, но привыкаеть и къ растительной пищѣ, которая наиболее и идеть ей въ прокъ. Является на свътъ слъною, и только черезъ 10 до 12 дней получаеть зрѣніе. Сука производить за разъ отъ 3 до 15 щенковъ. Въ числѣ собачьихъ болѣзней — бѣшенство или водобоязнь самая страшная и онасная, и противъ нея до сихъ поръ нътъ еще средствъ безъусловно-върныхъ. Переимчивостью собака превосходить всёхъ прочихъ животныхъ. Никакое другое животное не можеть такъ хорошо понять волю своего хозяина, какъ собака. При хорошемъ обращеніи, каждая собака ласкова, помнить добро и легко забываеть зло. Способъ воспитанія им'ьеть рѣшительное вліяніе на природныя свойства собаки; при томъ каждая порода собакъ имфетъ свои отличительныя способности и наклонности, при надлежащемъ обращении которыхъ въ дъло собака оказываеть человъку многоразличную помощь. Повсюду собака служить върнымъ спутникомъ охотнику; она гонится за трусливымъ зайцемъ и смъло идетъ на лютаго волка и на могучаго льва. Въ Сибири — собака тащить сани, въ Ирландіи ловить птицъ, а у нъкоторыхъ американскихъ племенъ — даже рыбу. Это единственное животное, отстаивающее господина своего на жизнь и смерть. Не разъ върная собака обличала убійцу ея хозяина. Особеннаго упоминанія заслуживають собаки, содержащіяся при обители, на гор'в Сенъ-Бернаръ, для спасенія путниковъ, погибающихъ въ зимнее время, продолжающееся до 8 мѣсяцевъ, въ тамошней нагорной мѣстности. Нельзя здёсь не упомянуть о вёрномъ и умномъ Барри, который въ продолжении 12 лътъ неутомимо служилъ человъчеству; не ожидая приказанія, рыскаль по горамь, вызывая блуждающихъ лаемъ своимъ на върную тропу, отгребая засыпанныхъ снѣгомъ или призывая помощь людей туда, гдъ самъ не могъ управиться. Почетное мѣсто въ Бернскомъ музеѣ вполнъ заслужено этою върною собакою, - о которой стоило упомянуть и въ этомъ краткомъ обзоръ части царства животныхъ.

 водкъ (Canis lupus — Le Loup — Der Wolf) шерсти изжелта-сърой; на переднихъ ногахъ спереди продольныя черныя полосы, хвостъ

метлой, обыкновенно поджать между заднихъ ногъ. Волкъ равняется ростомъ большой овчаркъ или шафкъ и достигаетъ до 31/2 футовъ длины; распространенъ почти по всей землѣ и въ Европѣ представляетъ самаго опаснаго изъ хищныхъ зверей. Въ Германіи волки рѣдко показываются; но тѣмъ больше ихъ есть во Франціи, а еще болже въ восточной части Европы. Ощущенія его, въ особенности чутье, - чрезвычайно тонки, а сила такъ значительна, что, схвативъ барана въ насть и закинувъ на спину, онъ удираетъ съ нимъ въ лѣсъ съ необычайною скоростью. Тъмъ не менъе волкъ трусливъ и только сильный голодъ дълаетъ его отважнымъ до дерзости. Онъ живетъ большею частью въ лъсахъ, уединенно; изръдка лишь, а именно зимою, когда мучить его голодь, собирается ватагами и даже стадами. Волкъ нападаетъ на овецъ и рогатый скотъ, на собакъ и лошадей, а въ лъсу преслъдуетъ краснаго звъря: серну, лося, оленя и другихъ. Въ крайней нуждъ нападаеть и на человъка, что во Франціи и въ Россіи случается нер'єдко. Не презираеть онъ и падали и вообще онъ животное прожорливое и ненасытное. Волкъ не лаеть, а воеть страшно. Съ-молода хотя и можно его укротить, но подъ старость онъ онять становится дикимъ. Между волкомъ и собакою инстинктивная вражда, и въ особенности шафка идеть на волка съ ожесточеніемъ; волкъ подверженъ бітенству, какъ собака и лисица. Волчица ежегодно выволить отъ 3 до 9 щенковъ.

тавлица х.

Къ породъ собакъ принадлежатъ еще слъдующіе два вида:

- а) Шакалъ (Canis aureus Le chacal Der Schakal) похожъ на волка, но меньше его, съ болѣе короткимъ хвостомъ; шерсти желтовато-сѣрой; съ ржавчато-желтымъ отливомъ на ногахъ и на концѣ хвоста. Въ Африкѣ въ теплѣйшихъ странахъ Азіи шакалъ водится стадами; по одиночкѣ же особенно встрѣчается въ Далмаціи. Въ образѣ жизнишакалъ сходствуетъ съ гіеною, питаясь какъ живою добычею, такъ и падалью или трупами.
- b) Лисица (Canis vulpes Le Renard Der Fachs) имъетъ нъкоторое сходство съ шии-

цомъ; главиъйшій цвъть его красно-рыжій; хвость прямой, съ густымъ волосомъ. Лисицы распространены по всей Европъ, Азіи и Съверной Африкъ и живуть въ подземныхъ норахъ, устроенныхъ на глубинѣ 6 до 8 фут. ниже поверхности и простирающихся футовъ на 50 и болже, съ раздѣленіемъ на нѣсколько вътвей, съ отдъльными выходами. Лисица отрываеть эти норы сама, или пользуется готовыми, устроенными барсукомъ. Питается она птицею, зайцами, молодыми сернами и рыбами; но въ нуждъ довольствуется и червяками, мышами, падалью и плодами. Лиса выводить въ норѣ отъ 3 до 9 щенковъ, которые родятся слепыми. Животное это - одно изъ вреднѣйшихъ, не по своей силъ, а по хитрости. На ловлю выходить она преимущественно по ночамъ и мало отдаляется отъ норы своей; имжетъ чрезвычайно тонкое чутье. Къ числу млекопитающихъ, употребляющихъ въ пищу насѣкомыхъ, принадлежатъ:

- с) Ежъ (Erinaceus Europaeus Le Hérisson commun Der Igel). Уни короткія; рогообразныя иглы на спині білы, съ черными колечками, а ноги черны. Животное это ліниво, неуклюже и трусливо; при малібішемь опасеніи ежъ свертывается въ игольчатый комокъ. Онъ живеть въ норахъ, которыя частью самъ для себя отрываетъ, и отъ первыхъ морозовъ до наступленія весенней теплоты спитъ. Пищу отыскиваеть себі по ночамъ, и отчасти полезенъ тімь, что истребляеть мышей и разныхъ насібкомыхъ; любить однакоже и древесные плоды. Обрівтается во всей Европів.
- d) Остроносая мышь (Sorex araneus La Musaraigne commune Die Spitzmaus отличается заостреннымъ рыльцемъ, которымъ удобно роетъ землю. Глаза у нея крошечные, уши короткія. Большая часть изъ нихъ издаетъ запахъ, похожій на мошусъ, почему кошки хотя и умерщвляютъ ихъ, но не пожираютъ.
- e) Водяная остроносая мышь (Sorex fodiens— La Musaraigne d'eau—Die Wasser-Spitzmaus) сверху черна́, снизу бѣла́, нѣсколько больше предъидущей; водится большею частью около воды и хорошо плаваетъ.
- f) Карловатая остроносая мышь (Sorex pigmaeus—La Musaraigne Pygmée—Die Zwerg-Spitzmaus) сверху съро-бурая, снизу съро-

- вато-бѣлая, самое крошечное изъ млекопитающихъ. Въ Италіи и въ Германіи.
- g) Кротъ (Таlра—Таuре—Der Maulwurf). Переднія лапки о пяти пальцахъ, широкія, похожія на руки и способны къ копанію земли. Рыльце продолжено въ видѣ хобота; глаза маленькіе, скрыты подъ волосами; ушей наружныхъ нѣтъ. Прорывая подземныя норы, кротъ выбрасываетъ землю наружу, вслѣдствіе чего образуются кочки, называемыя кротовинами. Зимою онъ не спитъ, только зарывается все глубже. Главная пища крота—насѣкомыя и червяки, въ особенности гусеницы. Самка ежегодно выводитъ отъ 3 до 5 дѣтенышей, которыхъ воспитываетъ съ большимъ тщаніемъ.

таблица хі.

Медвѣдь (Ursus—L'Ours—Der Bär) имѣеть между большими клыками и коренными зубами, сь широкою жевательною площадкою — замѣтный промежутокъ. Тѣло его неуклюже, толсто и покрыто длиннымъ волосомъ, хвостъ коротокъ. Изъ этихъ некрасивыхъ и угрюмыхъ звѣрей одни питаются болѣе растеніями, другіе болѣе животными.

- a) Черный медвёдь (Ursus Malaianus, Americanus—L'ours noire—Der schwarze Bär).
- b) Медвідь обыкновенный (Ursus Arctos L'ours brun — Der braune Bär). Последній нѣсколько меньше перваго; обитаетъ преимущественно въ сѣверныхъ странахъ и придерживается нищи растительной и меду. Объ породы медвёдя сходствують между собою въ образъ жизни. Живутъ они въ гористыхъ мъстностяхъ Европы и Съверной Азіи, изрѣдка встрѣчаются въ Швейцаріи, Тиролѣ, въ Южно-Баварскихъ горахъ и въ юго-западной части Богемскаго лъса. Медвъдь доростаеть длины въ 4 и 5 фут., имъетъ нравъ угрюмый, ленивый и строптивый и живеть въ одиночествъ, среди чащи лъсовъ, откуда выходить только по ночамъ, для отысканія себъ пищи. Онъ нападаеть на барановъ, лошадей, рогатый скоть и т. п., но не легко нападаеть на человѣка, если не будеть раздраженъ. Кромѣ того, питается онъ плодами древесными и полевыми, виноградомъ, медомъ и зелеными посъвами (горохомъ и т. п.). Имѣя широкія ступни, медвѣдь удобно ходить на заднихъ лапахъ и, въ состояніи

укрощенномъ, легко выучивается илясать. Врага своего онъ обхватываеть стоя и задушаеть его. Медвъдь лазить и плаваеть искусно. Дѣйствительно ли медвѣдь проводить зиму погруженный въ сонъ и въ какое время выводить дѣтей — это еще съ точностью не опредълено. По столътнимъ замъчаніямъ надъ медвадями, содержимыми въ городскомъ зваринцѣ въ Бернѣ, такъ называемый зимній сонъ ихъ состоитъ только въ томъ, что животныя эти въ зимнее время гораздо меньше ***** Вдять. По т* вмъ же зам* вчаніямъ, медв* дица въ январъ мъсяцъ выводить двухъ медвъжать, величиною съ крысу, слъныхъ и неуклюжихъ и достигающихъ въ продолженіе трехъ или четырехъ мъсяцевъ величины пуделя. Мясо медвѣжье употребляется въ пищу, а ланы считаются лакомствомъ. Шкура даетъ ценный мехъ. Медведь живеть до 30 и до 35 лѣтъ.

- c) Бѣлый медвѣдь (Ursus Maritimus L'ours blanc — Der Weisse Bär) съ заостренною головою, вдвое больше предъидущихъ двухъ родовъ, обитаетъ большими стадами по берегамъ Ледовитаго моря, плаваетъ искусно и представляеть собою опаснъйшаго хищнаго звъря полярныхъ странъ. По временамъ бълые медвъди заносятся по одиночкъ на льдинахъ къ берегамъ Исландіи и Норвегіи. Пищу бѣлаго медвѣдя составляетъ рыба, олени, тюлени или падаль разныхъ животныхъ, выбрасываемая на берегъ. Онъ не боится шикакой опасности и такъ силенъ, что схвативъ человъка въ пасть, можеть безъ затрудненія бѣжать. Мясо его ѣдять, а шкура даеть отличный мѣхъ.
- d) Енотъ-полоскатель (Procyon lotor Le Raton laveur Der Wasch-Bär) сѣро-бураго цвѣта; подъ каждымъ глазомъ черная полоска, хвостъ бѣловатый, глаза каріе; величиною съ барсука. Обрѣтается онъ въ Америкѣ, начиная съ сѣвера и до Парагвая. Днемъ спитъ, а по ночамъ отыскиваетъ себѣ живность, состоящую изъ насѣкомыхъ, червяковъ и плодовъ. Онъ имѣетъ странную привычку, передъ употребленіемъ пищи, обмакивать ее въ воду.

ТАБЛИЦА ХИ.

a) Poccomaxa (Gulo borealis — Le Glouton — Der Vielfrass). Туловище толстое и неуклю-

жее, мѣхъ бурый съ темнымъ пятномъ на спинѣ. Длина россомахи, не считая хвоста, нѣсколько болѣе двухъ футовъ. Она водится въ Швеціи, на сѣверѣ Европейской Россіи и въ Спбири и ведетъ ночную жизнь. Притаившись на деревѣ, она подстерегаетъ проходящихъ мимо оленей, бросаетсѣ на нихъ сверху и прокусываетъ имъ затылокъ. Преслѣдуетъ она также зайцевъ и птицу, а лѣтомъ лакомится ягодами; но что россомаха ненасытима — это сказка.

b) Барсукъ (Meles vulgaris—De blaireau—Der gemeine Dachs). Ноги и хвость коротки. Подъ хвостомъ находится мёшечекъ, отдёляющій зловонную жидкость. Шерсть сверху коричневая, снизу черная; на бѣлой головѣ двѣ продольныя черныя полосы. Неуклюжее длинношерстное животное это, длиною свыше 2 футовъ, водится въ лъсахъ по всей Европъ, живеть въ подземныхъ норахъ, которыя отрываеть само для себя и снабжаеть двумя выходами, ведущими къ просторному гнъзду, выложенному травою, мхомъ и листьями. Рядомъ съ гнездомъ чистоплотный зверь устраиваеть особое отхожее мъсто. Днемъ онъ спить, а выходя изъ норы ночью, отдаляется не болъе, какъ на полчаса пути. Коренья, ягоды, насъкомыя и мыши составляють его пищу. Всю зиму онъ спить, но въ теплыя ночи по-временамъ показывается и бродитъ по ближайшимъ окрестностямъ. Барсукъ робокъ и любить уединеніе до-того, что два пола живуть въ отдъльныхъ норахъ. Самка выводить оть 3 до 5 дътенышей. Мясо барсука сладковато, но рѣдко употребляется въ пищу. Жиръ и шкура его цёнятся.

Чревосумчатыя животныя (Marsupialia — Marsupiaux — Beutelthiere).

с) Двуутробка (Dydelphis—Le Dydelphe—Die Beutelratte, das Beutelthier). — Голова заостренная; уши длинныя; туловище вытянуто, ноги о инти нальцахъ, съ безноготнымъ большимъ нальцемъ назади. Хвостъ цѣнкій и безволосый. У самокъ нодъ животомъ нмѣется карманъ, образуемый брюшною кожею и служащій для ношенія безобразныхъ новорожденныхъ, которые довольно долго висять неподвижно у сосцовъ, нокуда не подростуть. Тогда они оставляють свою переносную люльку, но при малѣйшей опасности

опять въ нее прячутся. Двуутробка — ночной звѣрь, подобно хорьку, навѣщающій птичники. Охотясь на лѣсную птицу, иногда цѣпляется за деревья хвостомъ. Мѣсторожденіе Америка.

Грызуны (Rosores — Rongeurs — Nagethiere).

- d) Кангуру (Macropus или Halmaturus Le Kangurou Das Känguruh). Г Животное это отличается страннымъ складомъ всѣхъ членовъ. Заднія ноги очень длинны, съ чрезвычайно-толстыми лядвями и о четырехъ лишь нальцахъ. Переднія ноги о пяти пальцахъ, но весьма коротки, вслѣдствіе чего животное съ трудомъ можетъ ходить, но легко и шибко прыгаетъ. Хвостъ длиненъ и толстъ, хорошее мясо Кангуру привлекаетъ преслѣдованіе его охотниками. Не смотря на робость свою, онъ ловко обороняется хвостомъ и задними ногами. Водится стадами отъ 20 до 30 въ Новой Голландіи.
- e) Ликобразъ (Histrix Le Porc-Epic Das Stachelschwein). Голова и затылокъ снабжены пучкомъ длинныхъ волосъ, спина же покрыта длинными, закругленными, острыми колючками, перемѣшанными со щетиною, внутри пустыми, подобно стволу пера. Хвостъ короткій, висячій. Какъ всё грызуны, дикобразъ имъетъ съ каждой стороны челюсти но два ръзца, а вмъсто заднихъ зубовъ пустоту. Животное это бываеть длиною до 2 футовъ и водится въ Сѣверной Африкъ и въ Южной Европъ, отрываетъ для себя нору, съ однимъ входомъ и множествомъ каморъ. Онъ издаеть звуки, уподобляющіеся хрюканью свиньи и можеть взъеживать колючки свои.
- f) Морская свинка (Cavia—Le Cochon d'Inde—Das Meerschweinchen). Уши и ноги коротки; у переднихъ ногъ по четыре, у заднихъ по три пальца. Будучи первоначально вывезена изъ Америки, она и въ Европъ сдълалась всюду извъстнымъ домашнимъ животнымъ. Питается растеніями. Самецъ съ самкою обходится чрезвычайно нъжно.

тавлицы хіп.

a) Aгути (Dasyprocta Aguti — L'Agouti — Der Aguti) отличается отъ морской свинки длинными и тонкими задними ногами и короткою шерстью. Голова съ раздвоенною верхнею губою, имъетъ сходство съ заячьею. Цвътъ бурый, переходящій въ оливковый; ростъ зайца; живетъ въ лъсахъ Южной Америки, по мъстностямъ сухимъ; питается травою и плодами и легко освоивается.

b) Хомякъ или Карабышъ (Cricetus vulgaris—

- Le Hamster—Der Hamster)—сверху краснобурый, снизу черный, имфетъ голову короткую, туловище толстое; бываеть длиною отъ 10 до 12 дюймовъ. Настоящій образецъ скунца. Все лъто онъ таскаетъ въ нору свою (куда не допускаеть даже самки) разныя зерна, которыхъ за каждою щекою умѣщается у него до 1/8 фунта. Это животное сердитое, неуживчивое и жестокое. Побъжденнаго противника пожираеть; самка прогоняеть дътенышей своихъ изъ норы уже послѣ трехъ недъль, хотя они въ это время еще очень малы, и вообще поступаеть съ ними какъ злѣйшій врагь. - Хомякъ встрѣчается на ровныхъ мъстностяхъ, отъ береговъ Рейна и до Сибири. Зимою онъ затыкаетъ входъ своей норы и остается въ оцъпенъніи до весны. Въ мартъ просыпается и кормится запасами, накопленными въ подземельи. Самка выводить по два раза въ годъ отъ 6 до 20 дбтенышей, что и причиною чрезвычайнаго ихъ размноженія. Въ окрестностяхъ города Гота (въ Германіи) иногда въ одну осень откапывають до 30,000 хомяковъ. Каково же было бы ихъ число, если бы не взаимная ихъ ненависть.
- c) Сурокъ (Arctomys Marmotta La Marmotte -Das Murmelthier, Der Mungger) - TOJCTOTEлый, съ толстыми округленными ушами и волосистымъ хвостомъ, сверху — буро-сърый, снизу сфровато-желтый. Кроткое, между собой уживчивое животное. Питается растеніями Альпъ, охотно грвется на солнцв. Будучи чрезвычайно осторожны, сурки остерегають другь друга, издавая свисть; отрывають для себя въ землѣ глубокія норы, которыя затыкають въ октябре месяце — и целое семейство ихъ проводитъ холодное время года въ гнъздъ, въ совершенномъ оцъпенвній, пока въ апрвлв теплота солнца ихъ не разбудитъ. Мясо ихъ ѣдятъ, а Савояры выучивають сурка разнымъ штукамъ.
- d) Бълка обыкновенная (Sciurus vulgaris— L'Ecureuil— Das gemeine Eichhörnchen) кра-

волосистымъ хвостомъ, и такою же кисточкою на концахъ ушей. Это живой, безпокойный и проворный зв'трекъ, обитающій во всёхъ лёсахъ Европы; держится почти постоянно на деревьяхъ, гдв и устраиваетъ для себя по нъскольку гнъздъ. Пища бълки состоить изъ оржховъ, плодовыхъ косточекъ, сфиянъ хвойнаго лфса и т. п., изъ которыхъ она составляеть себ' большой запась на зиму, такъ какъ она не проводить ее сномъ, подобно другимъ животнымъ, одинаковой съ нею породы. — Самка выводить отъ 3 до 7 слѣныхъ дѣтенышей. — Бѣличье мясо удобосъбдомо, а мъхъ - собираемый въ зимнее время, сфраго цвфта — составляетъ извфстный скорняжій товаръ.

Нѣкоторые виды бѣлокъ, имѣя между ногами растягивающуюся кожицу, одарены способностью перелетать съ высшаго на низшее мъсто и отъ этого называются летучими бълками.

- е) Сонливая бѣлка—соня (Myoxus glis—Le Loir—Der Siebenschläfer) сверху красиваго свраго цвъта, а снизу совершенно бълаго, имфеть уши большія, хвость длинный, волось густой, при концѣ утолщенный; легко лазить и прыгаеть. Длина туловища 6 дюймовъ; живетъ въ нагорныхъ лѣсахъ средней Европы и проводить зиму въ дуплахъ и въ разсълинахъ скалъ. Мясо ея очень вкусно.
- f) Мышь полевая (Mus arvalis—La Souris des champs—Die Feldmaus) сверху красно-сърая, снизу желтовато-бѣлая, обрѣтается во всей Европъ и самая обыкновенная по нашимъ полямъ и лъсамъ. Роетъ норы съ двумя отверзтіями, одно для входа, другое для выхода. Питается хлѣбнымъ зерномъ, кореньями и руномъ озимыхъ поствовъ. Распложаясь чрезмърно, эта мышь въ иные годы чрезвычайно опустошительна для полей. Самка выводить черезъ каждыя пять недёль отъ 4 до 12 мышать.
- g) Мышь домовая (Mus Musculus—La Souris—Die Hausmaus) темно-съраго цвъта. Это крошечное, трусливое и проворное животное водится по всему земному шару въ домахъ; **Всть** что попало, — охотные всего зерновой хлъбъ и вещи жирныя. Мышь-самка выводить нъсколько разъ въ годъ по 4 и до 8 дътенышей, слъпыхъ и безшерстныхъ, въ гиъздахъ изъ соломы и разнаго сору.

- сивое и стройное животное съ длиннымъ | h) Крыса (Mus Rattus—Le rât—Die Ratte) черно-съраго цвъта, длиною до 7 дюймовъ; за исключеніемъ полярныхъ странъ, распространена повсемъстно. Эти ночныя животныя гивздятся въ строеніяхъ и пожирають все, что служить пищею для человъка. Живуть вмёстё, но часто грызутся между собою. Самка выводить отъ 4 до 7 сленыхъ и голыхъ дътенышей за-разъ.
 - i) Лѣсная мышь (Mus sylvaticus—Le rât des bois — Die Waldmaus) сверху сфробурая, снизу бълая. Туловище ея длиною до 4 дюймовъ, а хвость такой же длины; живеть въ скалахъ, въ лъсахъ и по лугамъ. На зиму роеть для себя норы въ землъ и питается полевыми плодами; по временамъ распложается до необычайности и, перекочевывая громадными стадами, путешествуетъ въ какомъ-нибудь, но всегда въ прямомъ направленіи.
 - k) Мышь безглазая (Spalax Typhlus—La souris aveugle—Die blinde Maus) находится въ южной Европъ, но въ особенности распространена на востокъ, а именно въ Палестинъ; имъетъ широкую сплошную голову; глаза незамѣтны, потому что прикрыты кожицею. Хвоста у нея вовсе нътъ.

ТАБЛИЦА XIV.

Заянъ (Lepus-Le Lièvre-Der Hase). За передними зубами имфетъ еще пару малыхъ зубовъ. Уши и заднія ноги длинны, хвость короткій. Всѣ виды зайцевъ — животныя ночныя и трусливыя; главные изъ нихъ:

а) Заяцъ обыкновенный (Lepus timidus – Le Lièvre commun—Der gemeine Hase). Спина сврая, подбрюшье бёлое; уши длиннве головы; водится по всей Европъ и въ Съверной Азіи. Спить съ открытыми глазами; зимою держится больше въ лѣсахъ, лѣтомъ и осенью на поляхъ, отгребая для себя только логовище. Пища его: зерновой хлъбъ, капуста и другая овощь; зимою же-древесная кора и руно озимовыхъ поствовъ. Зайчиха щенится отъ 3 до 4 разъ въ годъ: въ мартъ, мат, въ іюль, а иногда и въ сентябрь; въ первый разъ однимъ или двумя, а послъ и 3 или 4 зрячими зайчатами; отъ чего и происходить значительное размножение зайцевъ, не смотря на преслъдованіе ихъ людьми, хищными звёрями и птицами.

- b) Бѣлый заяцъ (Lepus variabilis—Le Lièvre des Alpes—Der Alpenhase). Уши нѣсколько короче, нежели у предъидущаго, съ черными кончиками, и ростъ его меньше противъ сѣраго зайца. Лѣтомъ онъ бываетъ сѣро-бураго цвѣта, съ бѣлымъ подбрюшьемъ, а на зиму бѣлѣетъ; изъ лѣса въ поле не выходитъ. Мясо его не такъ вкусно.
- с) Кроликъ (Lepus cuniculus—Le Lapin—Das Kaninchen) отличается отъ предъидущихъ меньшимъ ростомъ и меньшею длиною ушей и заднихъ ногъ. Есть дикіе и домашніе кролики. Дикіе водятся только въ теплъйшихъ странахъ Европы и бываютъ цвъта красновато-свраго; они распложаются невыразимо, такъ что отъ одной пары въ 4 года можеть ихъ развестись до 1,274,840 штукъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ они становятся истиннымъ бичемъ края. Домашніе кролики изм'вняются въ цв'вт'в, какъ и прочія домашнія животныя. Представляемое изображеніе показываеть кролика домашняго, такъ называемаго «шелковистаго зайца». Мясо кроликовъ чрезвычайно бѣло и нѣжно.
- d) Боберъ (Castor Le Castor Der Biber) имжеть чешуйчатый хвость и плавательную шкурку между пальцами заднихъ ногъ. У бобра обоего пола предъ заднею частью имѣются два мѣшечка, въ которые отдѣляется сильно-пахучая жидкость, называемая «Бобровою струею» и употребляемая въ медицинъ. Боберъ достигаетъ росту до 3 фут. въ длину; встръчается въ Европъ, въ Съверной Азіи и въ Сѣверной Америкъ. Въ последней изъ этихъ частей света бобры водятся стадами; въ Европъ же только небольшими семействами, по берегамъ нѣкоторыхъ ръкъ, напримъръ въ Германіи, на Эльбѣ, Одерѣ и Дунаѣ. Они всегда держатся въ водв и въ ней проводять большую часть времени. Пищу ихъ составляють: древесная кора, сучья и стебли, которые отгрызають они острыми, кринкими зубами своими. Животное это славится искусною постройкою своихъ жилищъ. Для этого по нъскольку бобровъ живутъ вмъстъ, закладывають у самой воды основаніе изъ земли и камыша и на немъ уже выстраиваютъ изъ жердочекъ, прутьевъ и камыша будку, въ видъ пекарной нечи, которую изнутри обмазывають землею; входъ въ эти жилища

- находится подъ водою. Боберъ доставляетъ драгоцѣнный мѣхъ, темно-бураго цвѣта, а равно и шелковистую шерсть, изъ которой дѣлаются извѣстныя бобровыя шляны и другіе предметы одѣянія.
- е) Крыса Мускусовая или Антильскій Пилори (Mus pilorides, Fiber zibethicus—Le rât piloris, Le rât Musqué—Die Zibethmaus). Хвость длинный, шерсть рёдкая, пальцы снабжены плавательными кожицами; цвёта красновато-сёраго, величиною до 1 фута; обитаеть по берегамъ рёкъ и озеръ Сёверной Америки въ печко-образныхъ домикахъ. Складъ тёла походитъ на крысій; у задней части находятся двё железы, которыя отдёляютъ жидкость, издающую сильный мускусовый занахъ.

ТАБЛИЦА XV.

Щербатыя млекопитающія (Bruta edentata — Mammiferès Edentés — Zahnlückige Säugethiere).

- I. Муравьевдъ (Myrmecophaga Le Fourmilier—Der Ameisenfresser). Голова длинная, хоботообразная; вдоль спины красивая длинная грива. Хвость длинный, мягкій и пушистый. Зубовъ вовсе не им'ветъ; когти длинные и острые; рыло заострено, а языкъ очень длиненъ, имъетъ видъ червяка и далеко высовывается. Всв виды этого животнаго питаются муравьями и термитами или древесными вшами, разрывая когтями муравейники и гнъзда этихъ насъкомыхъ и всасывая ихъ липкимъ языкомъ своимъ. Отчизна Муравье довъ-Южная Америка. Нъкоторые изъ нихъживутъ на деревьяхъ, иные ходять только по землѣ. Муравьеѣдъ почти одинаковой величины съ мясничьею собакой; имъетъ походку медленную. Мясо его употребляется въ пищу.
- b) Утконосъ (Ornithorhynchus fuscus L'Ornithorynque Das Schnabelthier) изкраснасъробурый, съ роговымъ клювомъ, илоскимъ какъ утиный, пальцы соединены илавательными перепонками, тъло покрыто короткимъ волосомъ; имъетъ въ каждой щекъ только по два зуба. Наружныхъ ушей нътъ. Утверждаютъ, что изъ заднихъ когтей истекаетъ ядовитая жидкость, но новъйшие наблюдатели это оспариваютъ. Животныя эти водятся въ болотахъ Новой Голландіи и закладываютъ

вдоль береговыхъ обрывовъ норы, длиною отъ 20 до 50 фут., съ уширеніями въ концахъ, гдѣ помѣщаются самки съ дѣтенышами. Здѣсь молодые утконосы, сначала слѣпые, остаются, пока клювъ ихъ еще такъ коротокъ и мягокъ, что дозволяетъ имъ сосать грудь, при помощи длиннаго ихъ языка.

- с) Чешуйникъ или Ящеръ (Manis—Le Pangolin Das Schuppenthier) имѣетъ длинное рыло, беззубый ротъ и покрытъ острою чешуею, въ родѣ хвойныхъ шишекъ. Языкъ длинный, въ видѣ червя, высовывается далеко и служитъ для вхлебыванія мурашей и термитовъ, которыми животное питается. Когти крѣикіе, а чешуя для обороны топырится. Мѣсторожденіе Африка и Остъ-Индія.
- d) Броненосецъ (Dasypus Le Tatou Das Gürtelthier oder Tatu). Коренные зубы многочисленны, скалкообразны, но слабы; голова длинна и заострена, уши большія стоячія, роть маль, а все тёло покрыто жесткимь панцыремъ или бронею. Броня эта состоить изъ отдёльныхъ, между собою сросшихся щитовъ, образующихъ только по срединё туловища подвижные поясы. Она покрываетъ голову, снину и хвость, оставляя открытымъ только одинъ животъ. Броненосецъ обрётается въ южной Америке, живеть въ подземныхъ норахъ и питается червями, насёкомыми, плодами и листьями. Мясо его вкусно и составляеть тамъ обыкновенную дичь.
- е) Тихоходъ или Лѣнивецъ (Pradypus Le Paresseux Das Faulthier) имѣетъ голову круглую, коренные зубы скалкообразные, переднія ноги длиннѣе заднихъ, вооруженныя тремя жесткими когтями, волосъ густой и сухой, какъ сѣно. Тихоходъ водится въ чащѣ лѣсовъ Бразиліи и постоянно держится на деревьяхъ, по которымъ лазитъ удобно, питаясь ихъ листьями. Длинныя переднія ноги его, при короткихъ заднихъ, пригодны для лазанья, но неудобны для ходьбы. Спитъ на деревѣ, держась когтями за сучья.

ТАБЛИЦА XVI.

Многокопытныя (Pachyderma—Pachydermes— Vielhufer).

a) Носорогъ Индъйскій (Rhinoceros Indicus— Le Rhinocéros—Das Indische Nashorn). Неуклюжее, безшерстое животное, съ толстою и столь крѣнкою шкурою, что свинцовая пуля нелегко пробиваеть ее, кром' только на животъ. На носу имъетъ одинъ или два рога. Заднихъ зубовъ нётъ; а у нёкоторыхъ не имъется и переднихъ, но у всъхъ по семи кръпкихъ коренныхъ зубовъ. Ноги очень толсты, о трехъ продольныхъ копытахъ. У Индъйскаго носорога одинъ рогъ; кожа съ опредъленными складками. Цвъть ея темно-бурый, а въ складкахъ красновохровый; у Африканскаго же два рога; кожа почти безъ складокъ, а переднихъ зубовъ вовсе нътъ. Носорогъ съ острова Суматры имфетъ тоже два рога, но снабженъ передними зубами и опредъленными складками кожи. Громадное животное это упрямо, глупо и неуклюже: достигаетъ ростомъ 12 фут. длины и отъ 6 до 7 фут. вышины, но миролюбиво и робко. и не будучи раздражено — уступаетъ человѣку дорогу; оно можеть быть укрощено, къ выучкъ однакоже неспособно. Мясо его ъдятъ: изъ кожи делають щиты, а изъ рога вытачивають кубки и т. н.

b) Слонъ (Elephas — L'Eléphant — Der Elephant) отличается отъ всёхъ прочихъ животныхъ тъмъ, что носъ его образуетъ длинный и подвижный хоботь, вытягивающійся до 6 фут. въ длину и укорачивающійся на половину. Туловище слона неуклюжее, кожа толста и покрыта немногими щетинистыми волосами. Голова велика, съ длинными висячими ушами и крошечными, въ сравненіи съ величиною звъря, глазами. Изъ верхней челюсти торчать два огромные клыка; резцовъ и заднихъ зубовъ слонъ не имъетъ; коренныхъ же зубовъ въ каждой щекъ у него по одному, по два, рѣдко по три. Хоботъ, съ пальцеобразнымъ приростомъ на концѣ его, служить не только органомъ обонянія, но и для захватыванія пищи и положенія ея въ ротъ. Ноги, столько же неуклюжія какъ и туловище, снабжены раздёльными копытами, переднія—пятью, а заднія—четырьмя. Хвость не очень длинный, оканчивается пучкомъ жесткой щетины. Слонъ, самый большой изъ сухопутныхъ звърей, обитаетъ въ жаркихъ странахъ Азіи и Африки и питается растеніями. Изъ двухъ извъстныхъ видовъ слона, только одинъ способенъ къ выучкѣ, какъ домашнее животное, для переноски и передвиженія тяжестей. Оть другаго вида пользуются только клыками, дающими такъ-называемую слоно-

вую кость. Слонъ доростаеть до высоты 10 и 14 фут. у плечь, и водится большими толнами обоего пола. Хоботъ слона замъчательное орудіе. Посредствомъ его слонъ въ состояніи повадить самаго сильнаго тигра и можеть поднять съ земли мельчайшую монету, вынуть пробку изъ бутылки, развязать узель и т. д. Когда слонъ хочетъ пить, то наполняетъ водою хоботъ и переливаетъ ее въ пасть. Съ древнъйшихъ временъ уже слона держатъ въ домохозяйствъ. Хотя способности его часто преувеличивались разсказами, но во всякомъ случат онъ принадлежитъ къ наиболте развитымъ животнымъ; чрезвычайно переимчивъ, понимаетъ приказанія своего господина, исполняеть дѣла свои съ очевидною обдуманностью; а ласками и объщаніями можно его побудить къ самымъ труднымъ работамъ п усиліямь. Испытанныя благод'янія онъ хорошо помнитъ, за то и не дается дразнить и обижать безнаказанно. — Однажды раздраженный слонъ свиръпствуетъ страшно. Взрослый слонъ въ состояніи нести на себ' грузъ отъ 2,000 до 4,000 фунтовъ. Въ старину употребляли его на войнъ, навьючивая на него башни съ войскомъ.

Слоны питаются только растеніями; ручной употребляеть въ день 100 фунтовъ рису, столько же сѣна и овощей и до пяти ведеръ воды; вино и ромъ онъ пьетъ охотно. Купанье въ водѣ для него необходимо, ибо, въ противномъ случаѣ, у него растрескивается кожа. По приблизительнымъ свѣдѣніямъ, слонъ можетъ прожить до 150 лѣтъ.

ТАБЛИЦА XVII.

- а) Тапиръ (Tapirus suillus Le Țapir Der Tapir). Нось продолговатый, оканчивается подвижнымъ, но короткимъ хоботомъ; у переднихъ ногъ по четыре, у заднихъ по три копыта, хвость очень коротокъ. Туловище неуклюжее, покрытое рѣдкимъ волосомъ. Цвѣтъ темно-бурый; величиною съ мула или малую лошадъ. Тапиръ питается травою и плодами, водится въ болотистыхъ лѣсахъ и плаваеть очень хорошо. Мѣстами дѣлаютъ его ручнымъ; онъ не злобенъ, и въ образѣ жизни уподобляется свинъѣ. Родина его Южная Америка, островъ Суматра и полуостровъ Малакка.
- b) Бегемотъ (Hyppopotamus-Amphibius—L'Hippopotame—Das Nilpferd)—безобразное и не-

уклюжее животное, съ безшерстою кожею, синевато-бураго цвъта; ноги о четырехъ, въ прямой рядъ расположенныхъ пальцахъ съ конытами. Голова огромна, рыло широкое, раздутое. Ноги толсты и коротки такъ, что брюхо почти касается земли. Въ широкой пасти находится вверху и внизу по 4 переднихъ зуба; крайніе зубы очень велики, но прикрываются губами; кром' того, въ одной челюсти имъется еще 6 или 7 коренныхъ зубовъ, хвостъ коротокъ; уши и глаза небольшіе. Тяжелый звѣрь этоть бываеть длиною въ 11 до 12 фут. и вѣсомъ свыше 2,000 фунтовъ. Днемъ онъ остается въ водъ и въ камышахъ, хорошо плаваетъ и ныряетъ, по ночамъ же производить большія опустошенія въ рисовыхъ и другихъ посввахъ. Онъ глупъ и миролюбивъ, но, будучи раздраженъ, идетъ на врага съ слъпымъ ожесточениемъ. Кожа его такъ толста и крвика, что въ редкомъ мъстъ ружейная пуля можеть ее пробить. Мясо бегемота употребляють въ пищу, а шкура даетъ кръпкую кожу; большіе крайніе зубы превосходять качествомъ лучшую слоновую кость.

- с) Свинья (Sus Le cochon Das Schwein). Рыло хоботообразно и притуплено; ноги снабжены копытами, попарно расположенными на каждой по четыре. Изъ нихъ однакоже только передняя большая пара наступаеть на землю. Натура и свойства домашней свиньи всёмъ извёстны.
- d) Кабанъ-дикая свинья (Sus scrofa ferus-Le Sanglier - Das wilde Schwein) буроваточернаго цвъта, отчего и называется иногда черною дичью. Самець называется также вепремь (Le sanglier mâle — Der Eber, Keuler), самка супоросью (La laie — Die Sau), а молодые ихъ — поросятами (marcassin — Der Frischling). Кабаны водятся въ лѣсахъ, преимущественно въ дубовыхъ, по всей Европъ и Средней Азін; бывають длиною оть 4 до 5 футовъ и вѣсомъ отъ 200 до 400 фунтовъ. Живуть стадами, состоящими изъ нъсколькихъ супоросей, со своими поросятами и молодыми кабанами до 21/2 и 3-хъ-лътняго возраста. Старые кабаны живуть одиночно и присоединяются къ супоросямъ только въ концѣ ноября и въ началѣ декабря, отгоняя въ это время молодыхъ, при чемъ не обходится безъ кровавыхъ схватокъ. Супо-

детенышей за разъ, удаляясь для этого въ самую чащу лъса, и въ это время онасно приближаться къ ея луговищу. Мясо, шкура и щетина кабановъ идуть въ дело.

ТАБЛИЦА XVIII.

Жвачущія (Busulka Ruminantia — Ruminants — Wiederkäuer).

Верблюды (Camelus — Chameau — Das Kameel) отличаются горбами на спинъ, которыхъ бываеть одинъ или два. Голова продолговата; верхняя губа раздвоена, шея длинная и согнутая; ноги высокія, коныты несовствить раздвоены, а снизу соединены почти совершенно мозолистою подошвенною кожею, почему онъ и довольно малы. На груди и на ногахъ есть мозоли. Верблюдъ — животное очень теривливое и умфренное, питающееся сухими колючими растеніями и выдерживающее по 6 и 8 дней безъ питья. При содъйствіи широкихъ ступней своихъ, онъ ходитъ легко по пескамъ, не увявая въ нихъ; можетъ носить большіе грузы и совершать продолжительные переходы; вообще же очень переимчивъ и смиренъ. Верблюда почитають кораблемъ пустыни потому, что безъ него невозможно было бы обитать въ неизмѣримыхъ песчаныхъ пустыняхъ Африки и Азіи, и всякое сношеніе между тамошними племенами прекратилось бы. Верблюдъ переносить грузь отъ 1,000 до 1,500 фунтовъ; но въ караванахъ на нихъ навыючивають гораздо менъе. Если нагрузить его чрезъ мъру, то онъ не встанеть, пока не снимуть лишняго. У Арабовъ пустыни верблюдъ составляетъ главное богатство. Арабъ пьетъ его молоко, фстъ его мясо, дълаетъ ткани изъ его шерсти, кожанный товаръ изъ шкуры, и даже высущенный пометь верблюда въ твхъ странахъ составляетъ драгоц'внное топливо. Виды верблюдовъ:

а) Дромадеръ или одногорбый верблюдъ (Dromedarius-Le Dromadaire-Das Dromedar). Шерсть тонкая и курчавая, сърая или бурая. Длина животнаго до 8 футь. Обрътается въ Съверной Африкъ, въ Аравін и Персіи и въ дикомъ состояніи нигдѣ уже не встръчается. Музыка ускоряеть шаги этихъ животныхъ. Оно уже 200 лътъ водится въ Тосканіи, и теперь уже въ этомъ краю насчитывають ихъ до 170 штукъ.

рось выводить оть 4 до 8 и даже до 12 | b) Двугорбый верблюдъ (Camelus Bactrianus - Chameau de la Bactriane-Das Trampelthier) съ двумя горбами на спинъ. Больше и сильнъе предыдущаго, бываетъ длиною до 11 фут. Водится у Татаръ, Киргизовъ, Тибетанцевъ, Монголовъ и Китайцевъ, а также въ южной полосъ Сибири, гдъ также употребляется для верховой ъзды и для перевозки товаровъ. Въ Аравіи же и въ Африкѣ этого вида верблюдовъ не имъется.

ТАБЛИНА XIX.

- a) Jama (Anchenia Lama Le Lama Das Lama). Пальцы раздёлены, на спин'в горба нъть, хвость коротокъ и у кольнь мозоли. Шерсть длинная, цвъть ея каштановый, который однакоже изм'вняется, когда животное становится ручнымъ. Величиною лама равняется лани. На высовихъ горахъ въ Перу она встрвчается еще въ дикомъ состояніи, стадами отъ 2 до 300 штукъ. Бъгають скоро и чутки; питаются сухими растеніями. Укрощенная дама употребляется для носки тяжестей, по крутымъ горнымъ тропинкамъ; она выносить до 100 фунтовъ грузу и проходить до 5 миль въ день, но не даеть себя обременять чрезь міру. Мясо обращается на пищу, а изъ шерсти выдёлываются ткани.
- b) Кабарга мускусная (Moschus Moschiferus— Le Musc - Das Moschusthier). Porobb не имъетъ; крайніе зубы (у одного только самца) значительно выступають наружу. Цвъта чернобураго, съ бълымъ подшейкомъ, хвость короткій. Красивый и проворный звірь, величиною съ молодую серну; волось грубый, а у молодыхъ пестрый, водится въ горахъ Азіи, въ Тибеть и Южной Сибири; чрезвычайно пугливъ и удаляется отъ человъческихъ жилищъ. Охотятся за кабаргой для добыванія пахучей жидкости, заключающейся въ мъшечкъ, который у нея находится подъ животомъ.

Олени (Cervus — Cerfs — Hirschtiere).

c) Joeb (Cervus Alces - L'Elan - Das Elennthier). Голова ноходить на лошадиную; нодъ гордомъ пучекъ длинныхъ волосъ; ноги длиннѣе и тоньше, нежели у другихъ видовъ этой породы. Грубая и густая шерсть образуеть вдоль холки короткую гриву. Цвъть -

чернобурый, а подъ брюхомъ сѣровато-бѣлый; длина до 8 фут., вышина почти 6 фут.; вѣсъ отъ 6 до 700 фунтовъ. Лось обрѣтается на всемъ сѣверномъ полушаріи земли; обитаетъ въ частыхъ болотистыхъ лѣсахъ; бѣжитъ чрезвычайно быстро, при чемъ бодцы, ударяясь другъ о дружку, производятъ хлопанье. Въ Германіи лоси теперь уже не встрѣчаются какъ прежде.

таблица хх.

- а) Олень сѣверный (Cervus Tarandus—Le Renne — Das Rennthier). Огромные рога, разделяющиеся при вершине въ виде ладони съ нальцами, снабжены надъ самымъ лбомъ животнаго зубцами, наклоненными впередъ. Самка тоже рогата; ноги у нея толще, но короче, нежели у самца, а коныта шире. Мѣхъ густой и мягкій, въ лѣтнее время цвъта изжелта-съраго или бураго, зимою бѣловатаго; длина животнаго 6 фут. Олени обитають въ северной полосе Стараго Света, частью въ дикомъ, а частью въ ручномъ состояніи. Они такъ быстроноги, что въ часъ времени легко пробъгають двъ мили (14 версть). Нищу ихъ составляють листья, мохъ, лишан и грибы или губки деревъ. Спину оленя неръдко протачиваетъ червь овода, такъ что иногда эта часть тъла его бываетъ вся въ желвакахъ, причиняющихъ ему сильную боль. Это смирное и ласковое животное составляеть главное богатство народонаселеній крайняго сівера материка нашего. Оно употребляется для верховой и запряжной Езды. Молоко его вкусно, мясо нитательно, а шкура даеть хорошій мѣхъ и кожу для одежды; изъ костей его выдълывають ложки и другія снадобья; изъ кишекъ-канаты и веревки; изъ жилъ - нитки.
- b) и с) Олень обыкновенный (Cervus Elaphus Le Cerf commun Der Edelhirsch). Оленица (La Biche Die Hirschkuh). Рога казистые, многоконечные, въ разръзъ круглые, съ загнутыми взадъ концами; шерсть лѣтомъ краснобурая, зимою красносърая; хвостъ коротокъ. Ростомъ олень бываетъ до 6 ½ фут. длины, вѣсомъ отъ 3 до 500 фунтовъ. Отъ передняго уголка глаза идетъ слезная виадина, наполняющаяся матеріею, сперва жидкою, а внослъдствін твердъющею. Оленица не имѣетъ рогъ. Старые олени теряютъ

рога свои къ концу февраля, молодые же въ мартъ и апрълъ. Дней черезъ пять снова новазывается на мъсто ихъ мягкій хрящикъ, а въ 12 или 14 недѣль рога опять отростають во весь размъръ свой, будучи покрыты мягкою оболочкою въ видъ коры, которую олень соскабливаеть о деревья. Молодой олень въ первый годъ получаеть одинъ только бодець, безъ вътвей; послъ втораго года прибавляется у него одна видка; посл'в третьяго у него на каждомъ рогъ появляется по 6 или по 8 концовъ; далъе же, съ числомъ льть, число концовь этихъ возрастаеть неопределенно. Олень имфетъ чрезвычайно тонкое чутье и слухъ и зоркіе глаза; можеть онъ жить до 30 лёть; водится по всей Европт и въ большей части Азіи и живеть купно. Самецъ и самка съ молодыми составляють одно отдёльное стадо. За кормомъ отправляются они по захожденіи солица, а съ утреннею зарею возвращаются въ лъсъ. Вдять посвы, траву, листья, овесь, капусту, плоды и т. п. Лань телится въ мав, однимъ или двумя телятами.

ТАБЛИЦА ХХІ.

- а) Олень-Лань (Cervus Lama Le Laim Der Dammhirsch). Рога силющены, широки, при концахъ рукообразно расширены, хвость средней длины. Шерсть лѣтомъ красно-бурая, съ бѣлыми пятнами; зимою сѣрѣе и безъ пятенъ. Лань отличается отъ обыкновеннаго оленя только меньшимъ ростомъ; водится въ болѣе теплыхъ краяхъ Европы.
- b) и c) Серна—дикая коза (Cervus Capreolus— Le chevreuil — Das Reh). Pora маленькіе. угловатые, въ концахъ раздвоенные, хвостъ незамътный; цвътъ шерсти льтомъ краснобурый, зимою — сърый. Серна живетъ точно какъ домашняя коза, цвётомъ и складомъ тела походить на оленя, но красивее его и гуще обросни волосомъ. Самка не имветь рогь, а самець м'вняеть рога свои въ ноябрв. — Животныя эти живуть толпами, оть 2 до 6, рѣдко отъ 10 до 12 штукъ вмѣстѣ. Самецъ ностоянно сопровождаетъ самокъ, которыхъ у него бываеть отъ одной до трехъ, и отважно защищаеть свое семейство, въ случав нападенія. Серны вообще очень осторожны и выходять кормиться только по утрамъ и но вечерамъ. Самка выводить детей въ

- май місяці, обыкновенно двухъ. Мясо серны превосходно и годится къ употребленію во всякое время года.
- d) Cyrak's (Antilope oreotragus—Le Sauteur— Der Klippenspringer). Рога круглые, кольчатые или спирально скрученные. Подбородокъ большею частію безъ бороды, а хвостъ коротокъ. Рога частью у однихъ только самцовъ, а частью и у самокъ-смотря по мъстнымъ видамъ этого животнаго. Сугаки или Антилопы вообще хорошо сложены, проворны, быстроноги, сильны, но пугливы; подходять частью къ оленямъ и сернамъ, а частью къ козамъ и рогатой скотинѣ. Онѣ бывають величиною оть серны и до лошади средняго роста; водятся только въ дикомъ состояніи большими стадами, и ради вкуснаго мяса ихъ и хорошей шкуры часто подвергаются преследованіямъ охотниковъ.

ТАБЛИЦА ХХИ.

- а) Жирафъ (Camelopardalis La girafe Die Giraffe). Короткіе рога одъты шкуркою, покрытою волосами; голова длинная и худая; шея необыкновенно длинная, спина кругонокатая отъ шен къ хвосту; туловище короткое, а переднія ноги значительно длиннъе заднихъ. Цвътъ шерсти бъловатый, съ желтымъ краномъ и коричневыми иятнами. Жирафъ высотою роста превосходить всёхъ млекопитающихъ, ибо достигаетъ 18-ти фут. Это кроткое, красивое и быстроногое животное обитаеть въ странахъ внутренней Африки, гдѣ водится небольшими стадами и питается древесными листьями и травою. На ходу оно поднимаеть объ ноги одной стороны вдругъ, отчего корпусъ его постоянно качается, а длинная шея страннымъ образомъ колышется. Въ прежнія времена, въ Европъ его ръдко видали. Въ 1824 году привезена была въ Парижъ одно живая жирафа, въ подарокъ отъ Египетскаго Паши. Тамъ онъ и теперь держатся, тогда-какъ привозимыя въ Вѣну и въ Берлинъ вскорѣ околѣвали.
- b) Дикая коза (Antilope rupicapra—Le chamois Die Gemse). Рога стоячіе, крюкообразные, на концахъ гладкіе. Мѣхъ весною бѣловато-сѣрый, лѣтомъ красно-бурый, осенью темно-бурый, зимою черный. Дикая коза во многомъ походить на фомашнюю; встрѣ-

- чается на высокихъ альнахъ Баваріи, Тиродя, Швейцаріи и Савоіи, стадами отъ 5 до 40 штукъ. Лътомъ они нитаются лучшими нагорными растеніями; зимою и осенью листьями, сухою травою, мхомъ и линаями. Онъ сложены совершенно для жизни въ горахъ; перепрыгивають чрезъ разсилны скалъ и пронасти, шириною до 21 фута, съ удивительною ловкостью и увѣренностію; но бѣгають не такъ хорошо; чрезвычайно чутки, и когда усмотрять что-нибудь подозрительное, то производять громкій свисть. Преследование этихъ животныхъ сопряжено съ большими опасностими для охотниковъ. Мясо молодыхъ очень ценится, а шкура даетъ превосходную кожу.
- с) Сайга (А. Dorcas—La gazelle—Die Gazelle). Рога черные, въ видъ лиры, кольцами; спина чалая, подбрюшье бълое; величина одинакова съ серною. Сайга водится несчетными стадами въ Съверной Африкъ, въ Аравіи и въ Сиріи. Ради статнаго ихъ роста и свътлыхъ прекрасныхъ глазъ своихъ, животныя эти почитаются на востокъ эмблемою красоты.

тавлица ххии.

- а) и b) Быкъ (Bos Taurus Le Boeuf Der Stier) и корова (Vacca La Vache Die Kuh). Рога длинные и круглые, расположены на переваль, отдылющемь лобь оть черена головы. Лобь илоскій и длина его больше, нежели ширина. Это животное отличается отвисшею подъ горломь шкурою, называемою подгрудкомь. Оно обрытается но всымь частямь свыта.
- с) Быкъ Мускусовый (Bos Moschatus Le Boeuf Musqué Der Moschus- oder Bisam-Ochs). Рога завиты назадь, какъ у барана, и у самца на лбу соединены между собою, какъ-бы швомъ. У самки они раздѣлены и нѣсколько меньше, у конца носа пучекъ короткихъ волосъ, на подобіе усовъ. Все остальное тѣло покрыто длиннымъ волосомъ, свѣшеннымъ почти до земли. Ноги и хвость коротки. Эта порода быковъ самая малорослая и едва равняется величиною обыкновенной коровѣ; имѣетъ сходство съ бараномъ. Водится на сѣверѣ Америки и встрѣчается еще въ Гренландіи.

d) Зебу— Индѣйскій быкъ двугорбый (Воѕ Іпdicus — Le Zébu — Daѕ Zebu). Этотъ быкъ имѣетъ на снинѣ одинъ или два мясистые горба, достигающіе иногда до 50 фунтовъ вѣса; ростомъ и силою равняется нашему рогатому скоту и водится въ Индіи, Персіи, Аравіи, а также въ Африкѣ; бѣжитъ довольно скоро и потому употребляется для верховой ѣзды.

ТАБЛИЦА XXIV.

а) Буйволъ (Bos Bubalus — Le Buffle — Der Büffel) отличается своими большими рогами, угловатыми въ разръзъ. Шерсть и рога черные. Подгрудка нѣтъ. Длина буйвола простирается до 8 фут., а въсъ свыше 1,000 фунтовъ. Происходя изъ Индіи, это животное распространено теперь по всей Азія и Африкъ, а въ Европейской Турціи, Венгріи и Италіи обратилось въ домашнюю скотину. Буйволъ дикаго и строптиваго нрава и можеть быть укрощень только съ номощью желъзнаго кольца, продътаго сквозь ноздрю. Онъ хорошо илаваеть; голось его — страшное рычаніе. Его употребляють для перевозки большихъ тяжестей, потому что онъ тянеть за двухъ лошадей. Мясо буйвола ъдять, а молоко чрезвычайно вкусно.

Козы.

- b) и с) Козадомашняя (Capra Hircus—La chèvre domestique Die Haus-Ziege). Рога значительно силющены, рубчаты и загнуты назадъ. У подбородка борода, а хвость коротокъ. Самецъ (le bouc der Bock) въ извъстное время издаетъ противный запахъ. Самки бываютъ рогатыя и безрогія. Домашняя коза распространена почти по всей земль. Ея мычащій голосъ и шаловливость извъстны.
- d) Козерогъ (Aegoceros Ibex—Le Bouquetin— Der Steinbock). Рога очень длинны и четырехъ-гранны, спереди плоски и покрыты поперечными поясами. Борода короткая. У старыхъ самцевъ рога выростаютъ до 2½ фут., и вѣсомъ доходятъ до 16 фунтовъ; у самки же длина ихъ не превышаетъ 1½ фут. и бороды у нея нѣтъ. Ноги у козерога относительно довольно толсты. Длина туловища до 4½ фут., а вѣсъ отъ 180 до 200 фунтовъ. Прежде эти животныя води-

лись въ Зальцбургскихъ, Швейцарскихъ и Тирольскихъ Альнахъ; но они почти совершенно истреблены и только изрѣдка попадаются на пространствѣ между горами Монтъ-Бланъ и Роза, откуда, вѣроятно, также скоро изчезнутъ. Въ образѣ жизни козерогъ сходствуеть съ дикою козою. Старый козерогъ живеть одиночно, молодые же остаются при самкахъ и образуютъ стадо, числомъ отъ 10 до 15 головъ.

таблица хху.

- а) Сарга (Сарга Aegagrus La chèvre sauvage Die Bezoar-Ziege) цвѣта темно-рыжаго, съ черною полосою на спинѣ, черною мордою и таковымъ же хвостомъ и рогами, похожими на рога домашней козы, отъ которой, кажется, и происходитъ, судя по сходству съ козами окрестныхъ населенныхъ мѣстностей. Важнѣйшій изъ видовъ этого рода козъ есть такъ называемая Венгерская, дающая тонкую шелковистую шерсть, изъ которой дѣлаютъ гарусъ.
- b) Коза Тибетская (Capra Tibethensis La chèvre de Tibeth Die Kaschmir-Ziege) съ илоскими, спирально-завитыми рогами и длинною блестящею и кудрявою шерстью, подъ которою находится нухъ, употребляемый на дорогія шали. Эта порода вывезена изъ Тибета въ Европу и разведена особенно во Франціи.
- с) Непальская коза (Capra Nepalensis La chèvre de Nepal Die Nepal-Ziege) съ выпуклымъ носомъ, крошечными спиральными рожками, очень короткою бородою, или вовсе безъ нея, высокаго роста; похожа на овцу; имъетъ длинный хвостъ и большія упи. Овцы (Ovis La brébis Das Schaaf) отличаются отъ козы неимъніемъ бороды и улиткообразною завивкою рогъ, у нижняго конца сплющенныхъ. Самки большею частью безроги.
- d) Аргали дикій баранъ (Ovis Argali L'Argali Der Argali). Рога им'єются у обоихъ половъ; у барана они очень велики. Туловище покрыто длиннымъ волосомъ, подъ которымъ находится мягкая шерсть. Цв'єта ржаваго, переходящаго м'єстами въ черный. Нижняя часть ногъ б'єла. Аргали значительно больше нашихъ обыкновенныхъ овецъ.

Онъ держится на всёхъ высокихъ горахъ восточной половины Азіи и на горахъ Рошмаунтскихъ, въ Сѣверной Америкѣ, и живетъ здѣсь небольшими выводками, подобно дикимъ козамъ.

ТАБЛИЦА ХХVІ.

- а) Муфлонъ—степной баранъ (Ovis Musimum—Le Mouflon—Der Muflon) ростомъ меньше предъидущаго. Рога въ полкруга, у самки ихъ нѣтъ; шерсть гладкая, какъ у сернъ; изкрасна-чалый, съ темною полоскою вдоль спины. Родина его острова—Корсика и Сардинія и Греческій Архипелагъ, гдѣ онъ водится большими стадами.
- b) и c) Овца и Баранъ обыкновенные или доmamuie (Ovis Aries-Le mouton domestique-Das gemeine Schaaf) отличается отъ дикихъ-курчавою шерстью и более длиннымъ висячимъ хвостомъ. Наша овца внолит рождена для домашней потребности, и съ незапамятныхъ временъ сроднилась съ человъкомъ. Она, какъ извъстно, кротка, боязлива, не имфетъ никакихъ страстей, отчего и почитается символомъ благочестія. Самцы называются баранами (Beliers — Widder), а самки-матками (la brebis femelle-Das Mutterschaaf). Шерсть, получаемая отъ овецъ, составляетъ главное ихъ значеніе, Породъ этого животнаго очень много. Изъ нихъ замфчательнфйшая:
- d) Испанскія или Мериносы (Le Merinos Das Merino Schaaf) съ большими рогами и густою мягкою, упругою и жирною шерстью, которая очень цёнится.

ТАБЛИЦА XXVII.

Цёльнокопытныя животныя (Mammifera solidungula — Les animaux solipèdes — Einhufer, Einhufige Thiere).

Травоядныя не-жующія жвачки происходять всѣ изъ Стараго Свѣта.

a) Конь или Лошадь (Equus caballus — Le cheval — Das Pferd). Уши короткія, заостренныя, хвость длинноволосый. Самець называется жеребцомъ (étalon — Der Hengst), самка—кобылою (la jument — Die Stute), а молодые — жеребятами (le poulain — Das Fül-

- len). Родина коня—средняя Азія. Съ древнъйшихъ временъ уже лошадь поступила въ услужение къ человъку и очень въроятно, что нынъ-существующія въ дикомъ состояніи лошади произошли уже отъ домашнихъ. Дикія лошади чрезвычайно быстроноги и переносчивы; водятся большими стадами, но далеко уступають домашнимъ въ красотъ склада, им'я ноги толстыя, а голову большую, невзрачную. Лошадь — одно изъ красивъйшихъ, благороднъйшихъ и полезнъйшихъ животныхъ. Гордо и отважно несетъ она вздока, двигаеть колесницу и оказываеть человъку безконечное множество услугъ. Чрезъ укрощение и воспитание образовались въ различныхъ краяхъ различныя породы лошадей, между которыми Арабская, Персидская, Андалузская, Англійская, Мекленбургская, Голштинская, а на съверъ-Финская, Вятская и другія наиболье цънятся. Не прежде, какъ по окончаніи трехъ літь, можно употреблять молодыхъ лошадей въ ъзду и въ упряжь. Многія племена ъдять лошадиное мясо, а Татары и Монголы употребляють въ нищу и молоко кобылье. Ублюдка отъ кобылы и осла называють лошакомъ. а отъ жеребца и ослицы муломъ.
- b) Оселъ (Equus Asinus—L'Ane—Der Esel). Уши длиныя, хвость съ волосами только на концѣ. Цвѣта сѣраго, съ темнымъ крестомъ на плечахъ. Мѣсторожденіе Азія, гдѣ ослы красивы, стройны и быстроноги; вслѣдствіе же переселенія на сѣверъ, животное это потеряло значительную часть эгихъ хорошихъ качествъ и у насъ составляетъ предметъ насмѣшекъ и презрѣнія, хотя, не смотря на то, остается животнымъ весьма полезнымъ, довольствуясь травою, сѣномъ и осетомъ для своего пропитанія. Онъ съ благонадежностью ходитъ по крутымъ горамъ и гладкому льду, будучи навьюченъ значительными грузами.
- с) Зебра (Equus Zebra—Le Zèbre—Das Zebra) масти изжелта-бѣлой, съ чернобурыми поперечными полосами на всемъ тѣлѣ. Имѣетъ складъ и ростъ осла и, въ совершенно дикомъ состояніи, водится преимущественно въ южной части Азіи.
- d) Квагга (Equus Quagga—Le Quagga—Das Quagga) очень походить на Зебру; только на ногахъ не имъеть темныхъ полосъ,

ТАБЛИЦА ХХУПІ.

- а) Тюлень или Фока (Морская собака) (Phoca vitulina — Le chien marin ou Phoque — Der Seehund, die Robbe). Голова округленная; на губахъ длинные щетинистые усы. Вообще она походить на голову тупомордой собаки, отчего происходить и самое название звъря. По короткости ногъ, эти животныя въ состояніи только ползать на брюх'в, хотя и довольно скоро. Тъмъ лучше однакоже тюлень плаваеть, такъ какъ эти же ноги его снабжены плавательными перепонками между пальцевъ. Тюлень одаренъ замъчательными способностями и легко дълается ручнымъ. Онъ водится стадами въ моряхъ холодныхъ полосъ обоихъ полушарій; выходить на берегь для выводки дѣтенышей и для отдыха, но отъ взморья не отдаляется. Въ случав нападенія, тюлени храбро защищаются и стоять другь за друга.
- b) Морской котъ (медвѣдь) (Phoca ursina L'ours marin Der Seebär) бурый, съ наружными ушами, ростомъ побольше обыкновеннаго тюленя; для обитателей полярныхъ странъ столь же важенъ, какъ и верблюдъ для жителей Аравійскихъ и Африканскихъ степей. Съ нимъ связано все существованіе Гренландцевъ и Эскимосовъ, которые употребляють въ пользу всѣ части морскаго кота, или медвѣдя.
- с) Морской левъ (Phoca jubata Le Lion marin Der Seelöwe). Цвѣта желтоватаго, а самецъ имѣетъ у илечъ родъ гривы, походящей на львиную. У него же бываетъ по нѣскольку самокъ, которыхъ онъ наказываетъ, когда онѣ не уберегутъ дѣтей своихъ отъ охотника.
- d) Моржъ (Trichechus—Le morse—Das Wall-ross). Задніе клыки верхней челюсти далеко выступають изъ пасти. Длина такого клыка до 2 футовь, а вѣсъ отъ 10 до 30 фунтовь; масса ихъ одинакова со слоновою костью. Корпусь моржа вытянуть, похожь на тюленій, голова круглая, а рыло надутое. Рость этого животнаго громадный, достигаеть 15 и 20 футь длины, 10-ти до 12 въ окружности, и до 2,000 ф. вѣсу. Оно обитаеть въ Ледовитыхъ моряхъ, гдѣ появляется иногда тысячными стадами, на льдинахъ. Это животныя емирныя и спокойныя, но противъ

- нападеній челов'єка стоять отважно, защищаясь взаимно. Моржей ловять для извлеченія ворвани и добыванія зубовь или клыковь ихъ.
- е) Манатъ или Ламантинъ (Trichechus Manatus—Le Manati ou Lamantin—Der Manati) нѣкоторыми причисляется тоже къ моржамъ, имѣетъ переднія лапы рукообразныя, а сзади все тѣло сходится въ перку овальнаго вида, въ родѣ рыбьяго хвоста. Это смышленое животное водится по берегамъ рѣкъ и морей теплѣйшихъ странъ Америки и питается травою, шишками хвойныхъ деревъ и въ особенности растеніемъ, называемымъ взморникомъ (Zostera).

ТАБЛИЦА ХХІХ.

а) Китъ (Balaena Mysticetus — La Balaine — Der Wallfisch). Шкура толстая, гладкая, безволосая; подъ нею находится жиръ, называемый ворванью, для добыванія котораго и производится ловля китовъ. Ноздри находятся не у носа, а въ значительномъ отъ него разстояніи и служать не только для вдыханія воздуха, но и для выбрасыванія воды. Цвётъ сверху — черный, снизу — бълый; но бывають киты и совершенно черные. Мясо красное, жесткое, сухое и дурнаго запаха; языкъ мягкій, жирный и длиною до 18, а шириною до 10 фут., въсомъ до 600 и 800 фунтовъ. Роть безъ зубовъ. Подъ верхнею челюстью во всякое время висить до 300 роговатыхъ пластинъ, называемыхъ усами, которыя внизу разделяются на волокна и служать къ тому, чтобы перехватывать мелкихъ животныхъ, в попадающихъ киту въ роть вмёстё съ водою и составляющихъ единственную пищу этого великана морей. Эти усы дають ценный товаръ, изв'єстный подъ названіемъ китоваго уса, количество его отъ большаго кита простирается до 3,000 фунтовъ. Длина животнаго отъ 50 до 60 фут., въ томъ числъ голова занимаеть отъ 16 до 20 фут. Пасть растворяется на столько, что можетъ вмѣстить довольно большую лодку. Окружность тъла въ самомъ толстомъ его мъстъ простирается до 35 и 40 фут., а хвостъ имфетъ длину въ 5 и до 6 фут., при широтъ отъ 18 до 24 фут. Въ немъ животное имфетъ такую громадную силу, что ударомъ хвоста раздробляеть шлюпки. Въсь кита, достигшаго полнаго роста, простирается до 200,000 фунтовъ. Морское чудовище это встрѣчается во всѣхъ моряхъ; преимущественно же оно водится въ сѣверномъ полярномъ морѣ. Достойно замѣчанія, что такое громадное животное имѣетъ глотку не шире 4 дюймовъ.

Дѣтенышъ Кита, при рожденіи, бываетъ отъ 10 до 14 футовъ длиною и носится матерью подъ передними двумя перами.

Для ловли кита, пробивають его зазубренными копьями или острогами, называемыми гарпунами, къ которымъ привязаны длинные канаты. Пораженный китъ быстро ныряетъ подъ воду, но для дыханія принужденъ вскорѣ опять вынырнуть, и, получая новыя раны, наконецъ всплываетъ мертвымъ на поверхность воды. Тогда у него вырѣзываютъ полосами жиръ, языкъ и усы; остальное же все предоставляется хищникамъ воднаго царства. Выручка отъ одного Кита можетъ простираться до 5,000 руб.

b) Кашалотъ (Physeter Macrocephalus — Le Cachalot — Der Kaschalot) имфетъ спину синеватую, брюхо бълое; бываеть длиною отъ 60 до 70 футовъ и до 52 футовъ въ окружности. Голова занимаетъ третью часть всей длины этого громаднаго животнаго. Верхняя часть головы представляеть углубленія, наполняющіяся маслянистою жидкостью, тверд'вющею при охлажденіи и называемою спермацетомъ. Чрезъ очищеніе, спермацеть становится бълымъ и въ этомъ видъ употребляется на свъчи, мыло и помаду. Верхняя челюсть зубовъ не имъетъ; нижняя же снабжена крѣпкими зубами. Обѣ ноздри соединены въ одно отверзтіе, для дыханія и выбрызгиванія воды.

Кашалотъ есть самое страшное изъ морскихъ хищныхъ животныхъ. Онъ преслёдуетъ дельфиновъ, тюленей, рыбъ и проглатываетъ саженныхъ акулъ. Онъ обрѣтается по всѣмъ морямъ и его ловятъ для добыванія спермацета, ворвани и амбры, которую находятъ въ кишкахъ шариками. Амбра повидимому, составляетъ произведеніе болѣзненнаго состоянія кашалота, и употребляется, какъ для благовонія, такъ и въ лекарство, для подкрѣпленія нервовъ.

ТАБЛИЦА ХХХ.

- а) Рогозубъ или Нарваль (Monodon Monoceros—Le Narval—Der Narval). Бёлый, съ неправильными сёрыми и черными пятнами. Отъ верхней челюсти горизонтально простирается впередъ длинный прямой клыкъ, назначеніе котораго достов'єрно неизв'єстно, хотя и сказывають, что этимъ клыкомъ рогозубъ нападаетъ на кита. Длина этого животнаго отъ 16 до 20 футовъ; длина клыка 9 футовъ. Ловятъ его для добыванія жира, а клыкъ употребляется на разныя токарныя изд'єлія.
- b) Дельфинъ (Delphinus—Le Dauphin—Der Delphin). Челюсти вооружены острыми зубами; ноздри соединены какъ у Нарваля. Носъ у нѣкоторыхъ бываетъ силющенъ, на подобіе клюва. Цвѣтъ сверху черный, снизубѣлый; длина отъ 8 до 10 футовъ. Дельфины живутъ стадами и, какъ извѣстно, илаваютъ чрезвычайно шибко. Они гоняются за судами, стараясь ловить то, что изъ нихъ выбрасывается въ море. Дельфины обрѣтаются ночти по всѣмъ морямъ и питаются по большей части рыбою.



































































































XV.





























































































ECTECTBEHHAЯ ИСТОРІЯ

ITIII,

ВЪ ИЗОБРАЖЕНІЯХЪ,

СНЯТЫХЪ И РАСКРАШЕННЫХЪ СХОДНО СЪ НАТУРОЮ.

для нагляднаго изученія

ВЪ ОБЩЕСТВЕННЫХЪ ЗАВЕДЕНІЯХЪ И ПРИ ДОМАШНЕМЪ ОБРАЗОВАНІИ ЮНОШЕСТВА.

составлена по пространному учебнику естественной истории профессора

ШУБЕРТА.

какъ вспомогательное дополнение

ко всякому учебному руководству,

СЪ ПРИЛОЖЕНИЕМЪ КРАТКАГО ПОЯСНИТЕЛЬНАГО ТЕКСТА.

СЪ НЪМЕЦКО-ФРАНЦУЗСКАТО ПОДЛИННИКА ПЕРЕВЕЛЪ

Г. И. КОРИ.

ПЯТОЕ ИЗДАНІЕ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. изданіе книгопродавца ф. а. витепажа.

1880.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ. 10 Октября 1879 г.

птицы.

(Aves - Les oiseaux - Die Vögel).

тавлина і.

Хищныя птицы (Oiseaux de proie — Raubvögel).

Коршунъ (Vultur — Le vautour — Der Geyer). Клювъ загнутъ крюкообразно, восковина обнажена. Голова покрыта пухомъ или обнажена вовсе. Главная пища коршуна — падаль. Органы зрѣнія и обонянія чрезвычайно развиты. Птицы эти лѣнивы и боязливы; поднимаются на лету очень высоко. Въ жаркихъ странахъ онѣ водятся стаями и приносятъ большую пользу истребленіемъ всякой падали.

- а) Грифъ египетскій (Vultur или Cathartes percnopterus Le percnopthère d'Egypte Der egyptische Aasgeyer). Весь бѣлый, правильныя перья крыльевъ черныя; голова и шея голая, желтоватаго цвѣта, длина до 2½ футовъ. Птенцы его бураго цвѣта. Въ южной Европъ, въ Африкъ и на востокъ встръчается большими стаями и терпимъ вездѣ въ городахъ, какъ истребитель падали, почему и считается священнымъ животнымъ, въ особенности въ Египтъ.
- b) Большой стрый или обыкновенный коршунъ (Vultur cinereus — Le grand vautour fauve, vautour commun — Der grosse graue Geyer, gemeine Geyer). Темнобураго цвъта, верхняя часть шеи обнажена, съ синеватымъ отливомъ, маковка покрыта пушистымъ чепцомъ. Родина его южная Европа и Африка, но долетаетъ онъ и до Германіи. Длина его 4 фута, а съ распростертыми крыльями до 9 футовъ.
- с) Кондоръ (Vultur gryphus Le condor Der Condor). Черный, съ бълымъ ошейникомъ; у самца мясистый гребень сверху и снизу клюва; между концами распростертыхъ крыльевъ 11 футовъ. Родина Америка, въ Кордильерскихъ горахъ; поднимается необыкновенно высоко и отважно нападаетъ даже на большихъ животныхъ.

Грифъ (Gypaëtus — Le gryphon — Der Geyeradler).

d) Бородатый грифъ (Gryphus barbatus — Le vautour des agneaux — Der Bart- oder Lämmergeyer). Оранжеваго цвъта, съ бурою спиною и крыльями въ бълыя полоски. У

- подбородка щетинистая борода. Обрѣтается въ горахъ Швейцаріи, Тироля и вообще въ южной Европѣ; страшный хищникъ, преслѣдующій дикихъ и домашнихъ козъ, овецъ и даже дѣтей. Съ распростертыми крыльями имѣетъ до 10 ф. въ ширину; летаетъ легко и, поднявшись на изумительную высоту, съ быстротою стрѣлы ударяетъ на свою жертву.
- е) Хохлатая гарпія (Gypogeranus serpentarius Le secretaire, vautour bruyer Der Kranichgeyer, der Secretair). Ноги очень длинныя, пальцы коротки, хвость клинообразный, голени желтыя. Цвъть пера голубовато-сърый, на затылкъ имъеть черный хохоль, глаза въ желтыхъ полосахъ. Длина тъла 3 фута; родина пустынныя степи южной Африки; на быстромъ бъгу ловить змъй, ящерицъ и т. п.; питается и падалью.

таблица п.

Соволы и орлы (Falco — Faucon, aigle — Falken und Adler).

Отличаются короткимъ клювомъ, загнутымъ съ корня, большею частію съ желтою восковиною. Пальцы вооружены крѣпкими, кривыми, острыми когтями.

- а) Царскій орель, Беркуть (Falco fulvus L'aigle doré, impériale Der Steinadler, Goldadler). Бурый, ноги въ перьяхь; по виду, отвагь и силь орель этоть считается царемь птиць, обитаеть въ льсистыхъ горахь Европы, бросается на все, съ чымь можеть управиться, но охотные всего на сернь, зайцевь и на пернатую дичь. Гинь дится на высокихъ деревьяхъ и скалахъ; выводить рыдко болые двухъ птенцовъ, которыхъ обильно кормить. Самка длиною 3 1/2 ф. и нысколько больше самца, но не такъ отважна.
- b) Морской оредъ (Falko albicilla L'aigle pêcheur Der Seeadler). Ноги въ половину обросши перьями, съробураго цвъта, хвостъ бълый. Онъ величиною съ царскаго орла, встръчается во всей Европъ, но общежительнъе, чъмъ тотъ; питается лътомъ плавунами и рыбами, зимою же разною дичью.
- c) Саричь, змѣевикъ (F. brachydactylus Le buse Der Schlangenadler). Пальцы и когти коротки, сверху бурый, снизу бѣловать. Восковина и ноги синеваты. Длина

- его 2¹/₂ ф. Встрѣчается въ южной Европѣ и питается пресмыкающимися.
- d) Каня, красный миланъ (F. milvus Le milan rouge Der rothe Milan, Weihe, Gabelweihe), 2 ф. длины, ржавчатаго цвѣта, голова бѣловатая съ темными полосками, хвостъ вилообразный. Полетъ его плавный, красивый; онъ кружится на большой высотѣ по цѣлымъ часамъ, не ударяя крыльями. Ловитъ куръ, молодыхъ гусей, мышей, лягушекъ, но лѣнивъ и трусливъ. Гнѣздится на высокихъ деревьяхъ.

тавлица III.

- а) Орланъ или бурякъ сѣроватень (Falco pygargus — Le pygargue — Die Kornweihe). Хвостъ полосатый; старый самецъ пепельносѣрый, съ бѣлой грудью и желтымъ брюхомъ; самка и птенецъ сверху темнобурые, снизу бѣловатые. Встрѣчается во всей Европѣ, ловитъ мышей и сидящихъ птицъ.
- b) Лунь (Falko buteo Le busard Der Bussard, Mäusefalk). Ноги голыя, желтыя; перья бурыя, снизу въ бёлыхъ кранинахъ. Принадлежитъ къ нашимъ обыкновеннъйшимъ хищнымъ птицамъ, которыя осенью стаями улетаютъ, а весною возвращаются. Прилетая съ сѣвера, зимуютъ у насъ, если холода не сильны. Хотя лѣнивый и неуклюжій, онъ однако полезенъ, ибо нитается полевыми мышами.
- с) Скона (F. haliaëtos Le huard Der Fischadler). Сверху чернобурый, снизу бълый, ноги и восковина буроваты. Длина 2 ф. Обитая вблизи прудовъ и рѣкъ, онъ питается исключительно рыбою, на которую бросается съ высоты отвѣсно, при чемъ когтями своими вцѣпляется въ свою добычу такъ сильно, что иногда, увлекаемый рыбою, тонетъ. Гнѣздится онъ на высокихъ деревьяхъ.
- d) Кречетъ (F. islandicus Le gerfault faucon d'Islande — Der Edelfalke, Jagdfalke). 2 ф. 2 д. длины. Ноги до половины обросши перьями. Самъ бѣлъ, на спинѣ темныя поперечныя полосы, на груди темный крапъ. Обитаетъ на дальнемъ сѣверѣ Стараго Свѣта; употреблялся преимущественно для соколиной охоты.
- e) Ястребъ (F. palumbarius Le faucon ordinaire — Der gemeine Falke oder Habicht).

2 ф. длины. Въ старости сверху цвѣтомъ синевато-буро-сѣрый, снизу бѣлый съ черными волнистыми чертами. Въ молодости онъ бурый и снизу искрасна-бѣлый, съ темными продольными иятнами. Онъ распространенъ по всей Европѣ и самая вредная изъ хищныхъ птицъ, ибо хватаетъ на-лету и на мѣстѣ куръ, голубей и куропатокъ. Въ старину пріучали его и къ употребленію на охотѣ.

таблица іч.

- а) Соколъ перелетный (F. peregrinus Le faucon voyageur Der Wanderfalke). 1 ½ ф. длиною, подъ глазами черныя нащечныя полосы, спина синевато-сърая съ черными поперечными пятнами, снизу бъловатъ съ черными волнистыми линіями. Этотъ соколь распространенъ по всему съверу; зимою, когда одни отъ насъ улетаютъ на югъ, то другіе съ съвера занимаютъ ихъ мъсто. По отвать, силь и быстроть своей, онъ страшенъ для воронъ, голубей, утокъ и т. д.; однако часто уступаетъ добычу свою менъе отважному луню.
- b) Чеглокъ (F. subbuteo La soubuse Der Baumfalke). Длиною 1 ф. 2 д. Крылья и хвость равной длины; въ старости сверху синевато-буро-черный, съ черною нащечною полосою, снизу свётлый съ продольными иятнами, подбрюшье и культи ржаваго цвёта. Нападаеть стремительно, въ особенности на жаворонковъ.
- с) Пустельга ((F. tinnunculus La cresserelle — Der Thurmfalke). Сверху красиво бурокрасный съ крапинами, у самца голова и хвостъ сърые. Эта извъстная хищная птица гнъздится охотно на башняхъ и скалахъ; питается мышами и мелкими птичками.
- d) Кончикъ перепелятникъ (F. nisus L'épervier — Der Sperber). Восковина нѣсколько зеленовата, брюхо сѣровато-бѣлое, волнисто разрисованное. Хотя не великъ, но отваженъ.
- e) Соколъ пѣвчій (F. musicus Le faucon chanteur Der Singfalke). Живеть въ южной Африкѣ и отличается отъ нашихъ ястребовъ тѣмъ, что, вмѣсто карканья, издаетъ нѣкоторые пріятные звуки. Цвѣту сизаго, съ черными правильными перьями и таковыми же поперечными полосами на хвостѣ.

ТАБЛИЦА V.

Coвы (Strix—L'hibou, chat-huant, chouette — Eule). Голова необыкновенно толста, глаза велики, ушная раковина большая, окаймленная нъсколькими перьями, ноги густо оперены. Голова у совъ похожа на кошачью, глаза не выносять дневнаго свёта, а потому сова-животное ночное, которое днемъ отдыхаетъ, а вылетаетъ на добычу въ сумерки. Полётъ совы чрезвычайно легокъ, по широкости крыльевъ и рыхлости перьевъ. Она нападаетъ на животныхъ ползающихъ и спящихъ и уносить добычу въ свой притонъ, избираемый въ мъстахъ уединенныхъ, въ развалинахъ, на башняхъ и въ дуплахъ. Сильный крикъ совы, по ночамъ, наводитъ страхъ. Всъ дневныя птицы ненавидятъ совъ, но ничего не могуть съ ними подвлать.

- а) Филинъ (Strix hubo Le grand duc, Die Ohr- oder Adlereule, Uhu). Длиною 2 ф., темно-рыжевать, въ черныхъ крапинахъ, зрачекъ оранжеваго цвѣта. Онъ находится по всему сѣверу, преслѣдуетъ мышей, змѣй, лягушекъ, зайцевъ, молодыхъ сернъ и всѣ роды пернатой дичи.
- b) Сова лѣсная (Strix otus La chouette des bois—Die Waldohr-Eule). 14 д. длины, съ длинными перистыми ушами. Встрѣчается часто въ лѣсахъ.
- с) Неясыть (Strix aluco Le chat huant Waldkauz). Глаза темно-коричневые, перо пестрое, иногда сърое, иногда же болъе ржавчатаго цвъта.
- d) Пугачь желтоватый (S. flammea L'effraye — Die Schleier-Eule). Перо сверху сѣроволнистое, съ бѣлымъ и чернымъ краномъ, снизу ржаво - желтое или бѣловатое, съ черными точками. Гнѣздится охотно на высокихъ строеніяхъ.
- е) Канюкъ меньшой (St. passerina La chevêche — Das Todtenkäuzchen). Перо сфробурое въ бѣлыя крапины. Гнѣздится въ старыхъ строеніяхъ, летитъ на свѣчу и, по жалобному ночному крику своему, считается въ простонародіи вѣщуномъ смерти.

ТАБЛИЦА VI.

Сорокопуты (Lauins — Les pies-grièches — Die Würger). Клюбъ толстъ, конецъ верхней челюсти снабженъ остріемъ и зубомъ, крылья коротки. Птицы эти невелики, но смѣлы и хищны, живутъ между собою не дружно. Они ловятъ насѣкомыхъ, мышей и

маленькихъ птичекъ, добычу свою накалываютъ на шины и потомъ ее разрываютъ на части. Поютъ отчасти очень хорошо, и подражаютъ пѣнію другихъ птицъ.

- a) Сорокопутъ сърый (L. excubitor La pie grièche grise—Der grosse Würger, Bergelster). Сверху сърый, снизу бълый, крылья и хвостъ черны, глаза въ черной полосъ.
- b) Балабанъ (L. spinitorquus Le lanier, Der Dorndreher, Neuntödter). Голова сърая, крылья и снина краснобуры, подбрюшіе розовое. Голосомъ своимъ подражаеть пънію другихъ птицъ. Онъ опасенъ хрущамъ и другимъ насъкомымъ, которыхъ накалываеть по нъскольку на шипы и потомъ ихъ пожираеть.
- c) Сорокопутъ малый (L. minor—La petite pie-grièche Der kleine Würger). Походитъ по цвѣту на сѣраго сорокопута, но отличается чернымъ лбомъ.

Древолазы (Certhiadæ — Grimpeurs — Leichtschnäbler).

Попуган (Psittacus — Les perroquets — Die Papageien). Легко отличаются по большому и крѣнкому клюву, одѣтому короткою восковиною; верхняя челюсть согнута крюкомъ, нижняя же короче и будто обръзана. Водятся только въ жаркихъ странахъ, во многихъ видоизмѣненіяхъ, красуясь перьями самыхъ чудныхъ цвътовъ. Питаются плодами и, въ отличіе оть другихъ птицъ, не клюютъ корма, а подносять ее ко рту когтями. Гитвадятся въ дунлахъ, искусно дазять, придерживаясь клювомъ. Голосной органъ ихъ, по устройству своему, способенъ подражать слову человъка. Птицы эти очень понятливы, но своенравны, достигають большой старости, даже и въ неволъ; но у насъ онъ не размножаются.

- d) Арасъ, Макао, Котинга пунцовая (Р. Масао Aras Ara). Называются попуган съ длинными клинообразными хвостами и голыми щеками.
- e) Перрюша Александрова (P. Alexandri— Perruche d'Alexandre — Sittich). Съ длиннымъ клинообразнымъ хвостомъ и оперенными щеками.

Большой Какаду (P. Gigas — Les grands cacatoës — Rüsselpapageien, Kakadu). Тѣ, которые снабжены поднимающимся хохломъ, раздвоеннымъ удлиняющимъ языкомъ и обнаженными шеками.

ТАБЛИЦА VII.

Попугаи съ хвостомъ кровянаго цвѣта называются: а) **Краснох** востые попугаи, самые понятливые и кроткіе; попугаи же съ короткимъ хвостомъ, съ хохломъ на головѣ:

- b) Какаду (P. galleritus—Cacatoës—Kakadu.
- с) Туканъ или Перцеядецъ (Ramphastos Le toucan—Der Pfefferfresser oder Tukan). Клювъ необыкновенно великъ, немного согнутъ и по краямъ зазубренъ; не смотря на величину свою, клювъ очень легокъ. Перо черное, грудь и шея разноцвѣтны. Величиною съ ворону. Родина ихъ Южная Америка, питаются насѣкомыми и плодами, которые подбрасываютъ и потомъ ловятъ клювомъ.

Дятлы (Picus — Les pics — Die Spechte). Съ прямымъ, граненнымъ и твердымъ клювомъ, на ногахъ два пальца впередъ, а два назадъ, слизистый языкъ удлиняется червообразно, хвостовыя перья жестки и служатъ птицѣ подпорою. Дятлы живутъ въ лѣсахъ, лазятъ по деревьямъ отрывисто, питаются насѣкомыми и ихъ личинками, выдалбливая для этого глубокія дырья только въ червоточныхъ деревьяхъ, не трогая здоровыхъ. Дятлы высѣкаютъ гнѣзда свои въ деревьяхъ же, устилая ихъ однѣми древесными щепками и выводятся только по одному разу въ годъ.

- d) Черный дятель (P. viridis Le pic vert Der Grünspecht). Перо зеленое, темя красное.
- e) Большой пестрый дятель (P. major Le grand pic bigarré Der grosse Buntspecht). Спина и гузка черны, подбрюшіе карминноваго цвъта; у самца затылокъ красный.
- f) Малый пестрый дятель (P. minor Le petit pis bigarré Der kleine Buntspecht). Подбрюшіе безь красоты; средина спины черная съ бѣлыми полосками; у самца красное темя.

ТАБЛИЦА VIII.

- a) Средній пестрый дятелъ (P. medius Le pic bigarré moyen Der mittlere Buntspecht). Спина и гузка совершенно черны, брюхо къ хвосту розовое, темя пунцовое.
- b) Вертиголовка (Yunx Le torcol Der Wendehals). Можетъ поворачивать шею во всѣ стороны, величиною съ жаворонка, сверху бурый, съ темно-ржавчатыми и чер-

- ными мелкими крапинами, снизу бѣловатожелтый съ остроконечными пятнами. Прилетаетъ къ намъ только на лѣто, питается лѣсными насѣкомыми и гнѣздится въ дуплахъ.
- с) Поползень (Sitta europaea Le casse noix Blauspecht, Spechtmeise). Сверху сфро-голубой, снизу ржавчатаго цвѣта, глаза въ черной полосѣ. Это очень живая птица, лазитъ гораздо ловче дятла по деревьямъ, прилежно вытаскивая насѣкомыхъ изъ щелей. Гнѣздится въ дуплахъ, гнѣздо замазываетъ глиною, оставляя только входъ для себя.
- d) Зимородокъ (Alcedo L'alcyon Der Eisvogel). Весьма красивая птица; перья синія съ зеленымъ отливомъ, подбрющіе ржавчатое. Онъ пугливъ и дикъ, держится около ручьевъ и рѣкъ, садясь на колья, деревья или камни; стережетъ рыбу, которую съ налета выхватываетъ изъ подъ-воды и поворачиваетъ ее такъ, чтобы проглотить ее съ головы. Въ крутыхъ берегахъ роетъ себѣ нору длиною въ 3 фута, съ расширеніемъ въ концѣ, для помѣщенія гнѣзда, состоящаго изъ рыбьихъ косточекъ, которыя изрыгаетъ, съѣвъ рыбу.

Тонкоклювыя (Tenuirostres—Les tenuirostres— Die Dünnschnäbler).

- е) Щурка, пчеловдъ (Merops apiaster Le guépier Der Immenwolf, Bienenfresser). Длиною 11 д., большею частію сверху бурый, шея желтая съ черной каемкой, подбрюшіе цвіту мідянки. Отечество его Африка, Азія и южная Европа; въ Германію залетають только по-одиночкі, и то рідко. Питается насікомыми и пожираеть много пчель. На берегахъ роеть онъ свое гніздо, подобно зимородку.
- f) Удодъ (Ypupa epops La huppe Der Wiedehopf). Клювъ длинный, тонкій, слегка загнутый, съ хохломъ на головѣ, который взъерошивается. Удодъ птица перелетная, является въ мартѣ или апрѣлѣ, и улетаетъ въ августѣ. Питается насѣкомыми и личинками, вытаскивая ихъ искусно изъ навоза. Гнѣздо его, изъ гнилушекъ и соломенокъ съ примѣсью иногда коровьяго навоза, находятъ въ дуплахъ и расщелинахъ стѣнъ. Извѣстна эта птица по дурному занаху, происходящему оттого, что самецъ

и самка, не вынося помета изъ гнѣзда, оставляють въ немъ дѣтенышей своихъ по шею.

ТАБЛИЦА IX.

- а) Древолазка (Certhia Le grimpereau Das Baumläuferlein). Крошечная птичка; клювъ вытянутый, тонкій, дугообразный, сверху граненный и остроконечный; хвостовыми перьями онъ упирается; сверху бурый съ бѣлыми точками, снизу бѣлый. Лѣто и зиму бѣгаетъ онъ по деревьямъ то вверхъ, то внизъ, питаясь древесными насѣкомыми. Самка высиживаетъ два раза въ дуплахъ.
- b) c) и d) Колибри (Trochilus Les colibris — Der Kolibri). Клювъ тонкій, округленный, ноги коротки. Языкъ состоить изъ двухъ нитей, какъ у бабочекъ, образуя трубочку для высасыванія медоваго сока изъ цвътовъ; питается и насъкомыми. Очаровательныя птички эти блещуть чудными красками, сверкая мъстами какъ драгоцънные камни. Отечество ихъ подъ тропиками Америки; жужжа и порхая по цвътамъ, они высасывають изъ нихъ медъ. Крошечные колибри бойки и постоянно дерутся между собою. Самый меньшій видъ ихъ не больше шмеля. Итенцовъ своихъ колибри искусно укрываеть отъ преследованій змей и мартышекъ, выводя ихъ въ висячемъ гниздъ въ видѣ мѣшка.

Птицы, принадлежащія въ породѣ воронъ (Coraces — Les corbeaux — Die krähenartigen Vögel).

- е) Воронъ, Вранъ (Corvus corax Le corbeau Der Rabe, der eigentliche gemeine Rabe, Kolkrabe). Длиною 2 ф. Черный, съ стальнымъ отливомъ; клювъ и ноги равной длины. Встрвчается во всей Европъ и въ большей части Азіи, съверной Африки и Америки. Онъ боязливъ и остороженъ, дълается очень ручнымъ, охотно крадетъ блестящія вещи, выучивается подражать человъческимъ словамъ, достигаетъ глубокой старости. Любимая пища его падаль, гоняется, однако, и за молодыми зайцами, куропатками и т. п.; выниваетъ охотно яица, и только въ крайней нуждъ употребляетъ злаки и плоды.
- f) Воронъ черный (Corvus corone La

- corneille Die Krähe, die gemeine Rabenkrähe). Цвѣтомъ похожъ на ворона; но меньше. Клювъ короче ногъ. Встрѣчается у насъ весьма часто; онъ очень хитръ и остороженъ. Питается падалью, червями, насѣкомыми, зернами и ягодами; ловитъ молодыхъ птицъ и выпиваетъ яйца. Зимою прилетаютъ они въ города, и питаются, раскапывая всякій соръ. Они преслѣдуютъ всѣхъ хищныхъ птицъ.
- g) Грачь (С. frugilegus La corneille moissonneuse Die Saatkrähe). Одинаковой величины съ предъидущимъ, болѣе красивато голубовато-стальнаго цвѣта. Онъ водится не вездѣ, перелетаетъ стаями изъ сѣверной въ южную Европу. Пища его черви и насѣкомыя. Грачи гнѣздятся общественно на деревьяхъ, такъ что на одномъ встрѣчается до 16 и болѣе гнѣздъ, при чемъ происходитъ постоянная ссора за удобство матеріала для витъя гнѣздъ.

таблица х.

- а) Ворона (С. cornix La corneille cendrée
 Die Nebelkrähe). Голова, шел, крылья и хьость черны, остальное сърое. Ихъ отечество съверная Германія; зимою перелетаеть съ съвера на югъ.
- b) Гайворонъ, галка (С. monedula Le choucas Die Dohle). Черновата съ серебристо-сѣрымъ затылкомъ. Птицы эти водятся большими стаями, безнокойны, вороваты и опасны особенно для вещей блестящихъ (золото, кольца), смышлены, сварливы, легко становятся ручными и гнѣздятся охотно на башняхъ и высокихъ домахъ.
- с) Сойка обыкновенная (С. glandarius Le geai d'Europe Der Nusshäher). Длиною 14 д., сѣро-красный, плечныя перья на крыльяхъ голубыя, съ черными и бѣлыми поперечинами. Живетъ въ лѣсахъ попарно или небольшими стаями, имѣетъ рѣзкій голось, но пріучается подражанію различнымъ звукамъ. Лѣтомъ питается насѣкомыми и червями, осенью и зимою орѣхами, желудями и плодами граба, собирая запасы, похищаемые нерѣдко бѣлками.
- d) Кедровка (C. caryocatactes Le geai des sapins Der Tannenhäher). Клювъ длинный, прямой; перо цвѣта бурой сажи, съ бѣлыми крапинами. Обитаетъ въ высокоствольныхъ лѣсахъ.

- e) Клушица альнійская (С. pirrhocorax Le choucas des Alpes Die Alpendohle). Черная, клювъ слабый и желтый, ноги красныя. Встрвчается только въ баварскихъ, тирольскихъ и швейцарскихъ альнахъ, большими стаями.
- f) Горная ворона (С. graculus—La corneille des rochers Die Steinkrähe). Также черная, клювъ длините и красно-коралловаго цвта, равно какъ и ноги. Встртается только на высокихъ альпахъ.
- g) Сорока (С. ріса Le ріс ordinaire, Die Elster, Atzel). Блестящей черноты. Брюхо и плечи бѣлыя, хвостъ длинный и клинообразный. Итица хищная, хитрая и прожорливая, однако легко дѣлается ручною и выучивается говорить слова. Иитается насѣкомыми, червями, фруктами, ягодами, мышами и птицами, грабитъ весною гнѣзда куропатокъ, утокъ и куръ, пожирая яйца и птенцовъ.

ТАБЛИЦА XI.

- а) Сивоворонка (Coracias Le rollier Die Mandelkrähe). Цвъта мъднаго, спина коричневая, ноги желтыя. Прилетаетъ къ намъ въ концъ апръля и улетаетъ въ августъ. Въ съверныхъ странахъ красивая птица эта встръчается чаще, питается разными мелкими животными и замъчательна тъмъ, что хватаетъ лягушекъ за заднія лапы, бъетъ ихъ объ землю и глотаетъ ихъ потомъ цъликомъ.
- b) Райская птица (Paradisea apoda—L'oiseau de paradis Der Paradiesvogel). Перья чудно разрисованы, съ металлическимъ отблескомъ. Крылья малыя, большая же часть распущенныхъ паховыхъ перьевъ образують далеко-развѣвающіяся метёлки. Обитаетъ въ Южной-Гвинеѣ, стаями отъ 30—40 штукъ, легко ловится, когда въ бурю запутывается въ собственныхъ перьяхъ.
- с) Скалоройка (Pipra rupicola Le coq de roche — Der Felsenhahn). Самецъ оранжевый, съ большимъ хохломъ, питается плодами, роетъ землю какъ курица, гнёздится въ разсёлинахъ скалъ, гдё и высиживаетъ по 2 яйца.
- d) Иволга (Oriolus Le merle doré Die Goldamsel, Der Pirol). Красиво желтый; крылья большею частію черныя. Искусно-свитое гитіздо его, въ видѣ корзинки, висить на

- вилообразномъ концѣ сучка. Предпочитаетъ вишни всякой другой пищѣ; эта прелестная птица является только съ мая по августъ.
- e) Ямайская или Альнійская сорока (Gracula, quiscula La pie de la Jamaïque Der Maisdieb). У самца перо черноватое съ багровымъ отливомъ, самка сѣрая. Питается большею частію насѣкомыми, но во время жатвы придерживается кукурузы.
- f) Гаворонъ священный (Gracula religiosa— Le mino—Der Mino). Черный, позади глазь имѣетъ обнаженную плёнку, клювъ и ноги желтые. Живетъ въ Остъ-Индіи, питается плодами и дѣлается очень ручнымъ и ласковымъ. Выучивается говорить внятнѣе попугая.
- g) Кукушка (Cuculus Le coucou Der Кикик). Темно-пепельно-сърый, клювь округленный, слабый, умъренно загнутый; хвость черный съ бълымъ крапомъ. Эти птицы не сами высиживаютъ свои яйца, а кладутъ ихъ въ гнъзда другихъ птицъ. Кукушка распространена повсюду и извъстна старому и малому.

таблица хи.

Жаворонки (Alauda — Les alouettes — Die Lerchen).

- a) Полевой жавороновъ (A. arvensis La farlouse, alouette des prés—Die Feldlerche).
- b) Лѣсной жаворонокъ (A. arborea L'a-louette des bios—Die Haidelerche).
- с) Хохлатый жаворонокъ (A. cristata L'alouette huppée — Die Haubenlerche). Клювъ прямой, задній ноготь длиннѣе пальцевъ, правильныя перья очень длинны. Виды жаворонковъ сходствують въ цвѣтѣ перьевъ: они почти всѣ сѣрые. Радостное весеннее пѣніе ихъ раздается на-лету.

Изъ перелетныхъ птицъ жаворонокъ является раньше всъхъ, уже въ февралѣ. Въ сентябрѣ собираются они въ большія стаи, улетаютъ медленно, а въ октябрѣ пропадаютъ совершенно. Жаворонокъ гнѣздится на землѣ, и высиживаетъ отъ 3 до 5 яицъ, по два раза въ годъ. Осенью жаворонки очень жирны и ловятся во множествѣ для употребленія въ пищу. Лѣсной жаворонокъ немного меньше полеваго, хвостъ короче, обыкновенно съ бѣлыми кончиками. На щекахъ имѣютъ они трехугольное бѣлое пятно.

Хохлатый жаворонокъ отличается заострен-

нымъ пучкомъ перьевъ на головъ. Жаворонокъ этотъ принадлежитъ къ постояннымъ и отлетнымъ птицамъ; пъніе его еще разнообразнъе, нежели полеваго жаворонка.

- d) Скворецъ (Sturnus L'étourneau Der Staar). Черный съ фіолетовымъ и зеленымъ отблескомъ и бълыми крапинами, клювъ желтый. Встрѣчается во всей Европъ; перелетаеть въ октябръ огромными стаями и возвращается въ началъ марта. Эти веселыя, неспокойныя, забавныя птицы проводять ночь преимущественно въ камышахъ, гдв, въ утренніе и вечерніе сумерки, поднимають необыкновенный шумъ. Скворецъ легко освоивается; любимая пища его насъкомыя. Самка высиживаетъ два раза въ лъто отъ 4 — 7 яицъ, гнъздясь на деревъ.
- e) Оляпка водяная (Cinclus aquaticus Le merle d'eau — Der Wasserstaar). Величиною въ скворца, но голова болве заострена, а грудь и тѣло полнѣе. Сверху черноватый, снизу ржавчатый, на груди бѣлый. Перья его будто обгрызаны. Встрѣчается болье всего въ лъсистыхъ мъстахъ надъ ручьями, питается водяными насѣкомыми, улитками и мелкой рыбой. Остается у насъ въ самыя строгія зимы; въ ясные зимніе дни расп'єваеть простую п'єсню свою на уединенныхъ прогалинахъ въ лъсу.

Дроздъ (Turdus — La grive — Die Drossel). Клювъ продолговатый съ горбикомъ и зарубкою на концѣ, по бокамъ нѣсколько сплющенъ. Принадлежитъ преимущественно къ перелетнымъ птицамъ, питающимся насъкомыми, червяками и ягодами. На рисункъ изображенъ:

f) Првий дроздъ (Т. musicus—La tourde— Die Singdrossel). Спина съробурая; брюхо бёлое, перо подъ крыльями блёдно-оранжевое. Лётомъ встрёчается очень часто въ средней Европъ и отличается прекраснымъ и громкимъ пъніемъ.

ТАБЛИЦА ХІП.

- а) Желтоносый дроздъ *) (Turdus viscivorus - La grive de gui - Mistler oder Ziemer, Misteldrossel). Оливковаго съробураго цвѣта, снизу черныя пятна, 3 крайнія хвостовыя пера съ більми кончиками. Питается преимущественно ягодами омелы.
- b) Рябинникъ (Т. pilaris La litorne —

- Der Krammetsvogel). Сверху каштановый, голова и задняя часть спины пепельно-сърыя, подбрюшіе білое, грудь ржавчатая съ темнымъ краномъ. Водятся въ съверной Европъ, являются у насъ въ октябръ, стаями, и возвращаются въ апреле на родину. У насъ они не гитздятся, выводять въ годъ два раза по 4 — 5 птенцовъ. Питаются осенью и зимою ягодами, именно можжевеловыми, ёдять также червей и насъкомыхъ. Мясо ихъ очень вкусно.
- с) Бѣлогрудый дроздъ или бѣлошейникъ (T. torquatus — Le merle à collier - Die Ringdrossel). Черный, съ свътлыми окраинами у перьевъ, подъ шейкою широкій бёлый полукругь. Живеть на альпахъ Баваріи, Тироля, Швейцаріи, въ Тюрингенскомъ лѣсу и на Гарцъ.
- d) Голубой или уединенный дроздъ (Т. cyanus — Le merle bleu — Die Blauamsel). У самца хвость синевато-черный, у самки темнобурый. Самецъ красиваго аспидносиняго цвъта; самка буросърая, съ черными волнистыми чертами. Водится въ большихъ строеніяхъ и въ скалахъ южной Европы, поетъ превосходно и громко.
- е) Черный дроздъ (Т. merula—Le merle— Die Amsel). Красивая черная пъвчая птица съ желтымъ клювомъ; пѣсни ея раздаются у насъ съ первыхъ весеннихъ дней.
- f) Свиристель (Amphelis garrula Le geai de Bohème — Der Seidenschwanz). Красновато-дымчатый, на голов' хохоль, правильныя перья крыльевъ украшены пунцовыми и желтыми роговыми кончиками. Свиристель обитаеть въ стверныхъ полярныхъ странахъ, гдё онъ гнёздится и выводится, а зимою перелетаеть въ Швецію, Данію и среднюю Россію. Въ иные годы ихъ вовсе не видать, между тёмъ какъ иногда ихъ бываетъ очень много. Птица лѣнивая и довольно глупая, которую легко стралять и ловить.

ТАБЛИНА XIV.

Клестъ (Loxia — Les becs croisés — Der Kreuzschnabel). Клювъ толстъ и крѣнокъ, конпы объихъ челюстей сложены накресть. Живеть въ хвойныхъ лъсахъ и питается съменами шишекъ.

а) Клестъ сосновый (L. curvirostra — Le bec croisé du pin - Der Fichten-Kreuz-

^{*)} По словарю Рейфа.

- schnabel), измѣняется между зелено-желтымъ, сѣро-желтымъ или желто-зеленымъ и красноватымъ цвѣтами. Встрѣчается часто въ нашихъ сосновыхъ лѣсахъ. Искусно раскрываетъ шишки хвойныхъ деревъ, чтобъ выбирать сѣмена. Клесты высиживаютъ во всякое время, большею частію зимою, и холодъ безвреденъ какъ старымъ, такъ и молодымъ. Гнѣздятся на соснахъ и кладутъ 3 яйца въ плотно свитое, теплое гнѣздо.
- b) Клестъ обыкновенный (L. enucleator Le bec croisé à croc Der Haken Kreuzschnabel). Верхняя челюсть согнута на нижнюю крючкомъ, на крыльяхъ бѣлыя полосы. Молодые самцы желты или желтовато-красны, а старые красиваго карминнаго цвѣта. Самки никогда не бываютъ красныя. Водится на отдаленномъ сѣверѣ Стараго Свѣта, питается какъ и предъидущій; зимою иногда залетаеть въ среднюю Европу.
- с) Снигирь (L. pyrrhula Le bouvreuil, Der Gimpel, Dompfaff). Голова, крылья и хвость лоснисто-черные, спина сърая, брюхо и грудь у самца темнокрасныя, у самки же мутно-красновато-съраго цвъта. Обитаеть въ лъсахъ всей Европы и перелетаеть осенью изъ съверныхъ въ южныя страны. Снигирь очень спокойная, довърчивая птица, и изъ всъхъ пъвчихъ наилучше высвистываеть всякіе напѣвы. За ученыхъ снигирей платять очень дорого. Они высиживають отъ 4 5 яицъ по два раза въ годъ.
- d) Вьюрокъ зеленый (L. chloris Le chloris Der Grünling). Желто-зеленый, крылья и хвостъ съ примъсью яркой желтизны.
 У самки цвъта эти съ сърымъ отливомъ. Птица эта не ръдкость.
- e) Дубоносъ (L. coccothraustes—Le gros bec—Der Kernbeisser oder Dickschnabel). Черный, грудь мутно-красноватая, въ остальномъ буроватый и сърый, съ бълою полосою по чернымъ крыльямъ. Птица эта гита-дится въ садахъ и вредитъ вишнямъ, изъ которыхъ вынимаетъ только косточки.
- f) Овсянка, стрепатка желтая (Emberiza citrinella Le bruant Der Goldammer). Голова и подбрюшіе ярко-желтыя, спина ржавчатая, съ черными продольными полосками. Принадлежить къ обыкновеннъйшимъ нашимъ птицамъ, и въ сильные холода залетаетъ въ города и селенія. Гнъз-

- дится по изгородямъ и кустамъ; самка высиживаетъ два раза по 3 5 яицъ.
- g) Овсянка садовая (Е. hortulana L'ortolan — Der Gartenammer, der Ortolan). Клювъ тёлеснаго цвёта, голова и задняя часть шеи зеленовато-сёрые, подшеекъ блёдножелтый, подбрюшіе ржаво-красноватое. Водится болёе въ южной Европе, но встречается вообще въ тёхъ мёстахъ, гдё растеть просо, любимый ею кормъ. Мясо ея съ давняго времени и до сихъ поръ весьма цёнится.

ТАБЛИЦА XV.

- а) Стрепатка плетневая (Emberiza cirlus Le bruant des haies — Der Zaunammer). Какъ предъидущая, грудь сфрая, гузко оливковое, шейка черная съ сфроватою каймою у щекъ.
- b) Подорожникъ снѣжный (Emberiza nivalis L'ortolan de neige Der Schneeammer). Коготь на заднемъ пальцѣ длинный, на крыльяхъ много бѣлаго, концы ихъ черноваты; высиживаетъ на сѣверѣ и прилетаетъ къ намъ только зимою.
- с) Воробей домашній или обыкновенный (Fringilla domestica Le moineau Der Sperling). Грудь искрасна-сѣрая съ черными иятнышками, гузко свѣтло-сѣрое, шейка у самца черная, у самки сѣроватая. Старые воробьи высиживають три раза, молодые же только два. Главная пища ихъ зерна; весною они любять насѣкомыхъ, во время созрѣванія вишень предпочитають эти плоды, а осенью хлѣбное зерно; зимою-же они выбирають зерна изъ навоза, по улицамъ и дорогамъ. Это хитрая и осторожная птица, которая хотя дѣлаеть много убытка, но съ другой стороны полезна, истребляя множество насѣкомыхъ.
- d) Зябликъ (Fringilla caelebs Le pinson ordinaire Der Buchfink). Гузко зеленоватое, крылья съ двумя бѣлыми перевязями. У самца голова пепельно-синяго цвѣта, грудь малиновая; у самки голова сѣробурая, а грудь красно-сѣрая. Зябликъ птица перелетная, удаляющаяся въ октябрѣ и возвращающаяся въ мартѣ и апрѣлѣ. Замѣчательно, что самцы появляются нѣсколько раньше, а самки слѣдуютъ за ними особыми стаями. Зябликъ держится на деревьяхъ, гдѣ по два раза въ лѣто вы-

сиживаеть въ гнѣздышкѣ, имѣющемъ видъ горшечка. Пѣніе его очень пріятно.

- e) Вьюрокъ горный (Fringilla montifringilla Le pinson montain Der Bergfink oder Gägler). Гузка бѣлая, подъ крыльями перо сѣрнаго цвѣта, самецъ сверху черный, грудка и плечи ржаво-желтыя. Водится на дальнемъ сѣверѣ; осенью же перелетаетъ стаями въ среднюю полосу Европы.
- f) Вьюрокъ снѣжный (Fringilla nivalis Le niverau Der Schneefink). Плечныя перья у крыльевъ и боковыя у хвоста бѣлыя. Голова пепельно-сѣрая, спинка бурая, а подбрюшіе сѣровато-бѣлое. Держится въ высокихъ горахъ средней Европы.

ТАВЛИЦА XVI.

- а) Щегленовъ или щеголъ (Fringilla carduelis Le chardonneret Der Distelfink, Stieglitz). Бурый, подбрюшіе бёлое; передняя часть головы пунцовая, крылья и хвость черные, на крыльяхь желтыя пятна, у хвостовыхъ перьевъ кончики бёлые. Любимая комнатная птица, поеть прилежно.
- b) Канарейка (Fringilla canaria Le serin des canaries Canarienvogel). Въ первобытномъ состояніи сёрая съ переливомъ въ зеленый цвётъ на груди и животё. Чрезъ освоеніе птицы, цвётъ этотъ чрезвычайно измёнился. Эта повсюду любимая птица происходить съ Канарскихъ острововъ, ея голосъ и переимчивость всёмъ извёстны.
- c) Коноплянка (Fringilla cannabina La linotte — Der Hänfling). Спинка бурая, у етарыхъ самцовъ маковка и грудь пунцовыя. Держится въ комнатъ ради хорошаго голоса.
- d) Чижикъ (Fringilla spinus Le serin Der Zeisig). Наружныя правильныя перья желтыя, вообще перо мутно-зеленое, грудъ и брюшко желтовато-бёлыя, у самца маковка и шейка черныя. Любимая и ласковая комнатная птичка, живеть лѣтъ по 12-ти и болъ́е.
- e) Итальянскій чижикъ или лимонный (*) (Fringilla citrinella — Le serin d'Italie — Der Citronen-Zeisig). Хвостовыя перья черныя со св'єтлыми краями, перо вообще
- (*) По неотысканію русскаго названія въ словаряхъ, переводчикъ позволиль себъ перевести латинское названіе буквально.

- желто-зеленое, затылокъ и бока шейки сърые; водится въ южной Европъ и ръдко появляется въ южной Германіи.
- f) Сѣрый чижикъ (Emberiza miliaria, l'emberise grise Die Grauammer). Цвѣта жаворонка, длиною 8 д., отлетная птица.

ТАБЛИЦА XVII.

Травнички, славки, варакушки, завирушки (Sylvia — Les fauvettes — Die Grasmücken). Самые лучшіе пѣвцы, имѣютъ частію тонкій и слабый клювъ и по большей части перелетныя, путешествующія по ночамъ и по одиночкѣ, питаясь насѣкомыми, червями и ягодами.

- а) Соловей (Sylvia luscinia Le rossignol Die Nachtigall). Сверху темно-ржаво-свраго, снизу сфровато-бълаго цвъта, хвость ржавый. Появляется въ половинъ апръля и удаляется въ сентябръ. Придерживается низкоствольнаго лъса. Восхишаетъ прелестными мелодіями своими въ тихія весеннія ночи. Перестаеть щелкать около Иванова дня. Пища его червяки, насъкомыя и ихъ личинки, потомъ и ягоды. Гнъздо соловья незатъйливо; самка высиживаеть разъ въ годъ отъ 4 — 6 яицъ. Почти похожъ, но нъсколько побольше ночной соловей (Philomela — Le rossignol nocturne de Vienne - Der Sprosser, Wiener Nachtigall), цвъть пера нъсколько темнъе, встръчается преимущественно въ Польшъ, Венгріи и Австріи.
- b) Синешейка (Sylvia suecica La gorge bleue Das Blaukehlchen). Хвость у начала ржаво-красный, по срединѣ и на концѣ черно-бурый. У самца шея и грудинка прекраснаго синяго цвѣта, иногда съ бѣлымъ пятнышкомъ по срединѣ; у самки синевы этой нѣтъ, только по сторонамъ подшейка черныя полоски. У самца странный голосъ, почти въ два тона.
- c) Черноголовикъ (Sylvia atricapilla La fauvette à tête noire Die Schwarzplatte, der Mönch). Сверху оливково сърый, у самца маковка черная, у самки ржаво-бурая. Пріятный и прилежный пъвецъ.
- d) Малиновка (Sylvia cineraria La fauvette commune Die gemeine Grasmücke, der graue Spötter). Сверху пепельно-сърая, снизу бъловатая, крайнія хвостовыя перья съ свътлыми полосами. Величайшій врагь

- гусеницъ и личинокъ насѣкомыхъ. Пріятный пѣвецъ, подражающій голосу другихъ птицъ.
- e) Травничекъ садовый (Sylvia hortensis La fauvette des jardins Die Garten-Grasmücke). Сверху оливково-сърые, хвостъ и концы крыльевъ буро сърый, подбрюшіе мутно-бълое; одинъ изъ прекраснъйшихъ пъвцовъ.
- f) Каменка (Silvia garrula Le traquet Die Klapp Grasmücke). Отличается отъ предъидущаго болѣе голосомъ, нежели перомъ. Въ ея пѣніи между тихими нотами раздается по временамъ громкое хлопанье.
- g) Желтобрюшка (Sylvia hippolais La fauvette à ventre jaune Die gelbbäuchige Grasmücke oder der grünliche Spötter). Сверху одивково-зеленоватый, снизу съраго цвъта. Устраиваеть искусное гивздышко свое не выше аршина отъ земли, на молодыхъ ёлкахъ и между вилообразными сучьями кустовъ, обкладывая его берестой. Поеть очень хорошо.

ТАБЛИЦА XVIII.

- а) (съ лѣвой стороны) Рѣполовъ, плистовка (Sylvia rubeçula Le rouge-gorge Das Rothkehlchen). Оливково-бурая съ желто-красною шейкою; красивенькій пѣвецъ, отлетаетъ въ октябрѣ и возвращеніемъ своимъ, въ мартѣ, возвѣщаетъ весну. Гнѣздится въ дуплахъ или трещинахъ стѣнъ; высиживаетъ отъ 5 7 яицъ.
- а) (съ правой стороны) Каменьщикъ или чекканъ чернощекій (Sylvia rubetra — Le grand traquet — Das Braunkehlchen).
 Гузка бѣлая, конецъ хвоста и среднія перья буро-черные, шейка и грудь буро-красныя.
- b) (съ правой стороны) Королекъ (Sylvia regulus Le riotelet commun Das Goldhähnchen). Сверху чижиково зеленаго цеѣта, маковка оранжевая. Одна изъ самыхъ крошечныхъ птичекъ здѣшнихъ странъ, чрезвычайно живая; гнѣздится на деревьяхъ, въ хвойныхъ лѣсахъ. Шарообразное гнѣздо снабжено отверстіемъ вверху; са́мка высиживаетъ въ первый разъ отъ 8 до 11, во второй отъ 6 до 9 яицъ, величиною чуть больше горошины.
- b) (съ лѣвой стороны) Болотный дроздъ (Sylvia turdoides La rousserole Die Rohrdrossel). Крылья коротки, хвость длинный и округленный. Держится въ камы-

- шахъ и кустарникахъ, около воды; сверху ржаво - сѣрый, снизу ржаво - желтовато - бѣлый.
- с) (съ лѣвой стороны) Крапивникъ обыкновенный или европейскій (Sylvia troglodytes — Le roitelet — Der Zaunkönig). Крылья и хвостъ коротки и округлены; цвѣтъ пера ржаво-коричневый съ поперечными полосками. Крошечная птичка эта зимуетъ у насъ. Крапивникъ красивый, живой и ловкій півець; питается насікомыми, ихъ личинками и яичками. Гнѣздо его одно изъ искуснъйшихъ; надъ нимъ пара трудится недъли двъ. Какъ для такой крошечной птицы, оно очень велико, имъя до 7 дюймовъ высоты и $5^{1/2}$ дюймовъ ширины. Отверстіе съ боку, ближе къ верху, покрышка гивзда очень плотна. Самка высиживаеть отъ 6 до 8 яицъ, одинъ разъ въ годъ.
- d) (съ лѣвой стороны) Горихвостка (Sylvia phoenicurus Le rouge queue Das Rothschwänzchen). Ноги длинны, шейка черная, подбрюшіе красное.
- d) (съ правой стороны) Плиска бѣлая или трясогузка (Motacilla alba La bergeronette, hoche queue Die weisse Bachstelze). Лобикъ, бока, шейка и брюшко бѣлые, спинка пепельно-сѣрая; затылокъ и подшеекъ черные. Веселыя и проворныя птицы, постоянно кивающія хвостомъ, живутъ дружно и довѣрчивы къ человѣку. Съ наступленіемъ осеннихъ холодовъ отлетаетъ, и возвращается, какъ ранній вѣстникъ весны, въ мартѣ мѣсяцѣ. Гнѣздится по близости воды, въ дуплахъ, береговыхъ норахъ и въ мельничныхъ строеніяхъ. Высиживаетъ два раза: сперва отъ 6—7, а потомъ отъ 4—5 яицъ.
- e) (съ правой стороны) Плистовка желтая (Motacila flava La bergeronette jaune Die gelbe Bachstelze). Коготь задняго пальца очень длиненъ, хвость короче чѣмъ у трясогузки, подбрюшіе красиво-желтое, шея тоже. Держится на равнинахъ.

ТАБЛИЦА XIX.

(съ лѣвой стороны) Синицы, зиньки (Parus — Les mésanges — Die Meisen). Клювъ короткій, крѣпкій, окруженный щетиною, языкъ притупленный, тоже щетинистый, пальцы совсѣмъ раздѣленные. У

- этихъ птицъ густое перо, гладкое. Онъ чрезвычайно вертлявы, питаются насѣкомыми, но ъдятъ также съмена и ягоды.
- а) Кузнечикъ (Parus major La charbonnière — Die Kohlmeise). Сверху оливковозеленый, снизу зеленовато-желтый съ черною продольною полосою; голова и шея черныя, виски бѣлые. Въ клѣткѣ, вмѣстѣ съ другими птицами, кузнечики нападаютъ на нихъ и выѣдаютъ у нихъ мозгъ; гнѣздятся два раза.
- b) Лазоревка (Parus coerulus La mesange bleue Die Blaumeise). Крылья и хвость синіе, спинка оливково-зеленая, грудь и подбрюшіе желтыя.
- c) Черносърая синица (Parus ater La charbonière de pin Die Tannenmeise). Голова и шея черныя, спинка синевато-сърая, щеки бълыя. Обрътается большею частію въ еловыхъ лъсахъ.
- d) Хохлатка (Parus cristatus La mesange huppée Die Haubenmeise). Имѣетъ на маковкѣ заостренный хохолокъ; сверху бурая, снизу бѣловатая, подшеекъ черный.
- e) Камышевка или болотная синица (*) (Parus palustris—La mesange des marais Die Sumpfmeise). Маковка черная, подшеекъ бѣлый; спинка черновато зеленая, крылья и хвостъ тоже, но темнѣе. Держится въ болотистыхъ мѣстахъ.

(Съ правой стороны) Ласточки (Hirundo — Les hirondelles — Die Schwalben). Клювъ маленькій, сплющенный, у корня уширенный; крылья длинны, концами крестообразно другъ на другѣ сложены. Хвостъ большею частію вилообразенъ, ноги коротки, ротъ оканчивается подъ самыми глазами. Ласточки птицы перелетныя; онѣ ловять насѣкомыхъ на лету.

- а) Ласточка обыкновенная или деревенская (Hirundo rustica L'hirondelle des cheminées Die Rauchschwalbe). Перо сверху стальнаго чернаго цвъта, снизу бълое со ржавымъ отливомъ, лобъ и шея красновато-каштановые. Полетъ у нея чрезвычайно быстрый и ловкій; гнъздится у домовъ и повсюду считается домашнимъ другомъ.
- b) Ласточка окошечная (Hirunda urbica L'hirondelle de fenêtre Die Fensterschwalbe). Сверху черная, шея и подбрющіе снѣжно-бѣлыя, ноги по самые когти оперены.

- Лѣпитъ гнѣздо свое изъ грязи и глины, у домовъ, такъ крѣпко, что его не легко разрушить.
- c) Стрыжъ (Hirundo riparia Le martinet Die Uferschwalbe). Шея сѣро-бурая, а брюхо бѣлое; гнѣздится стаями въ норахъ, отрываемыхъ ею самою въ кругизнѣ береговъ.
- d) Козодой (Caprimulgus L'engoulevent Der Ziegenmelker, Nachtschwalbe). Клювъ и крылья какъ у прочихъ ласточекъ, но пасть еще шире прорѣзана и окружена жесткою щетиною. Буро-сѣрое съ бѣлыми крапинами перо густо и мягко. Живетъ въ лѣсахъ, имѣетъ легкій и плавный полетъ, питается насѣкомыми, но летаетъ только по ночамъ. Является въ маѣ и исчезаетъ въ сентябрѣ. Самка кладетъ свои 2 яйца прямо въ верестнякъ, не устраивая гнѣзда.

ТАБЛИЦА ХХ.

Толуби (Columba—Les pigeons—Die Tauben). Клювь тонкій, у корня мягкій, спереди нісколько согнутый; ноздри лежать вь выпуклой восковинів, ноги коротки, крылья длинны и остроконечны. Живуть попарно, гніздятся на деревьяхь или въ разсілинахь скаль, выводять только по 2 яйца вдругь, но по ніскольку разь вь году. Кормять дітей своихь сначала изь своего зоба; пища ихь — сімена. Изъ множества видовь голубей, приводимь только извістнійшіе:

- а) Горный, дикій голубь (Columbia livia Le pigeon fuyard Die Feldtaube, Haustaube). Клювъ черноватый, восковина бѣловата; перо сизо-сѣрое, нижняя часть спинки бѣлая; по крыльямъ проходятъ два черные поперечные пояса, зрачекъ красный. Въ дикомъ состояніи онъ у насъ уже не встрѣчается, но водится въ Южной Европѣ и въ Сѣверной Америкѣ. Искусственное разведеніе домашняго голубя произвело множество видовъ, изъ коихъ замѣчательнѣйшіе:
- b) Голубь воркунъ (Le pigeon tambour—Die Trommeltaube), у котораго ноги покрыты длинными перьями, а голосъ похожъ на барабанную дробь.
- с) Гордица (Le pigeon culbultant—Die Purzeltaube. Tümmler). Съ гладкою головою, большими красными обнаженными кругами у глазъ. Быстро и отвъсно спускаясь съ высоты, безпрерывно кувыркается.

^(*) По словарю Эртеля: синяя болотная синица.

- d) Голубь мохнатогрудый (*) (Le pigeon cravate ou à gorge frisée Das Mövchen). Клювъ короткій, весь бѣлъ и имѣетъ на груди мохнатую манишку.
- e) Трубастый голубь (La queue de paon Die Pfauentaube). Съ распущеннымъ стоячимъ хвостомъ.
- f) Голубь зеленый (**) (Le pigeon à capuchon — Die Perücken- oder Schleiertaube). Перо на голов'я и по сторонамъ обращено впередъ. Цв'ята темно-зеленаго, съ радужнымъ на груди отливомъ.

таблица ххі.

- а) Дикій лѣсной голубь (Columba oenas Le ramier Die Holztaube). Клювъ красноватый, съ желтымъ концомъ. Главный цвѣтъ пера синевато сѣрый (сизый) съ неясною темною полосою на спинѣ; около головы и на груди красноватый отливъ.
- b) Зобастый голубь (Le pigeon grand-gosier — Die Kropftaube). Съ большимъ зобомъ, до того раздувающимся, что равняется съ туловищемъ.
- c) Странствующій голубь (Columba migratoria Le pigeon de passage Die Wandertaube). Хвость длинный, клинообразный. Водится въ Сѣверной Америкѣ, такими громадными стаями, что перелеть ихъ продолжается иногда по нѣскольку часовъ.
- d) Горлица ошейниковая или бѣлозобикъ (Columba risoria La tourterelle à collier gris, ou la tourterelle des Indes Die Lachtaube). Сѣро тѣлеснаго цвѣта, съ узкою черною полоскою на шеѣ; родомъ изъ Африки.
- e) Гордица (Columba turtur—La tourterelle— Die Turteltaube). Покровы крыльевъ ржаваго цвъта, съ темнымъ оттънкомъ отъ стержня каждаго пера; на шев темное пятно, съ кривыми бълыми каемками; гнъздится въ рощахъ.
- f) Увѣнчанный голубь (Columba coronata Le faisan couronné des Indes—Die Kronentaube). Величиною съ индѣйскаго пѣтуха; водится въ жаркихъ странахъ.
- g) Перепелъ (Coturnix La caille Die Wachtel). Ржаво-сърый, съ чернымъ крапомъ,

у самца черно-бурая шел, у самки бъловатая. Между курами перепель единственная перелетная птица. Въ началъ мая онъ является, а въ концъ сентября отлетаетъ. Голосъ самца уподобляютъ различнымъ словамъ: dic-cur-hic и т. п. Самка высиживаетъ отъ 8—14 яицъ, и одна заботится о птенцахъ. Сварливыхъ самцовъ въ нъкоторыхъ странахъ сводятъ на бой.

ТАБЛИЦА ХХП.

- а) Вѣлая куропатка, пардва (Tetrao lagopus La perdrix blanche, la gelinotte blanche— Das Schneehuhn). Пальцы густо обросши, черноватые когти значительно согнуты. Перо зимою бѣлое, съ черными пятнами на концѣ хвоста, лѣтомъ ржаваго цвѣта, съ черными зубчатыми полосами; только крылья, подбрюшіе и ноги остаются бѣлыми. Водится въ горахъ Германіи, Швеціи и вообще въ сѣверныхъ странахъ.
- b) Тетеревъ, косачь (Tetrao tetrix Le coq de bois Der Birkhahn, Spielhahn). Съ вилообразнымъ хвостомъ. Самецъ бываетъ длиною до 2 ф., черный, съ стальнымъ блескомъ; самка номеньше, ржаваго цвѣта, съ сѣрыми ноперечными полосками. Держится преимущественно въ березнякѣ и водится начиная съ средней полосы Европы и до отдаленнаго сѣвера. По образу жизни схожъ съ глухаремъ.
- c) Глухарь (Tetrao urogallus Le coq de bruyère — Der Auerhahn). Хвостъ круго округленъ; самецъ черный, съ бълыми крапинами, на груди съ зеленымъ лоскомъ; крылья переходять въ бурый цвътъ; самка поменьше, ржаваго цвъта, съ черными поперечинами. Самецъ бываетъ отъ 10-18 фунт. въса, летаетъ низко, съ шумомъ и недалеко. Зрвніе и слухъ чрезвычайно развиты. Эти большія лісныя куры у нась постоянны, держатся въ горныхъ, лесныхъ местахъ, днемъ-большею частію на земль, ночьюна деревьяхъ, и питаются ягодами, травами, хлѣбными зернами, почками и листьями. Во время тока, въ мартъ и апрълъ, самецъ ежедневно, съ 2-хъ часовъ утра до разсвѣта, расп'яваеть громко, расхаживая по дереву въ забавномъ положеніи и въ это только время его легко стрълять. У каждаго самца бываеть во время тока отъ 8 до 10 самокъ; но потомъ онъ живетъ уединенно

^(*) За неимѣніемъ въ словаряхъ особаго русскаго названія, переводчикъ назваль этотъ видъ голубя сообразно отличительнымъ его признакамъ.

^(**) Тоже.

- и, въ сосѣдствѣ своемъ, не терпитъ другаго самца. Самка кладетъ отъ 6 16 яицъ, прямо на землю, высиживаетъ ихъ 4 недѣли и водитъ за собою молодыхъ, которые въ ту же осень начинаютъ токовать. У глухаря, какъ и у тетерева, брови мясистыя и багроваго цвѣта.
- d) Сърая куропатка (Perdrix cinerea La perdrix — Das Rebhuhn). Съ лица и горлышка красиваго буро-краснаго цвъта, спинка пепельно-сърая, съ примъсью чернаго и желто-краснаго оттънка. На шеъ тонкія черныя волокнистыя черты. Куропатки шибко бъгають, но тяжело летають. Самцы живуть съ самками неразлучно, последнія въ мав или іюнв мвсяцв высиживають въ ямкѣ отъ 12 — 22 яицъ, а пушистые цынлята, тотчась по выходъ изъ яйца, уже бъгають, иногда еще съ прилипшими скорлупинками; до следующей весны они остаются при старыхъ. Такое семейство охотники называють выводомъ. Отецъ и мать очень заботятся о дётяхъ и, въ дурную погоду, укрывають ихъ подъ своими крыльями. Куронатки легко освоиваются; мясо ихъ очень вкусно.
- е) Кекинъ (Perdrix rubra—La perdrix rouge, la bartavelle—Das Rothhuhn). Щеки и горлышко совершенно бёлыя, окаймленныя черною полоскою; грудинка пепельно-сёрая, съ черными чешуйчатыми пятнами. Брюхо бёловато-сёрое, затылокъ ржаво-красный, клювь и глазное пятно красные. Родина ихъ Франція и Италія. Въ нравахъ они отличаются отъ другихъ видовъ тёмъ, что хотя живутъ выводками, но держатся другъ отъ друга поодаль; сверхъ того, самецъ не заботится о дётяхъ. Къ человёку не привыкаютъ.
- f) Каменная или греческая куропатка (Tetrao saxatilis — La perdrix grecque — Das Steinhuhn). Большею частію пепельносёраго цвёта, шейка бёлая съ рёзко-отдёляющеюся черною каймою. Клювъ и ноги красные, подбрюшіе буро-желтое; широкія боковыя перья обозначены желтовато - бёлымъ пятномъ, окаймленнымъ черною поперечною полосою. Итица эта, принадлежа южной Европё и Востоку, встрёчается до Баварскихъ Альпъ.
- g) Цесарка обыкновенная (Numida meleagris
 —La pintade, poule de Guinée ou d'Afrique

- Das Perlhuhn). Голова лысая, съ мозолистымъ гребнемъ; перо пепельно-сѣрое, съ бѣлымъ крапомъ; подъ щеками мясистая борода, грудина и зобъ красновато - сѣрые, верхняя часть шеи съ синимъ отливомъ; происходитъ изъ Африки, но очень распространена. Эта птица дика и сварлива, голосъ ея невыносимъ, но мясо лучше всякой другой птицы. Въ продолженіе лѣта самка кладетъ до 70 яицъ.
- h) Курица домашняя (Gallus domesticus La poule domestique Das Haushuhn). Происходить изъ Индіи, но распространена по
 всей землів и, чрезъ искусственное разведеніе, разділилась на такое же множество
 видовъ, какъ и голубъ. При пітухів держится нівсколько курицъ, о которыхъ онъ
 очень заботится и жестоко дерется за нихъ
 съ соперниками. Въ Англіи пітушьи бои
 сопровождаются большими закладами. Курица, за исключеніемъ времени линянія,
 несеть яица почти каждый день и даеть въ
 теченіе года отъ 80 до 90 яицъ.

ТАБЛИЦА ХХІІІ.

Фазанъ (Phasianus — Le faisan — Der Fasan). Глазная орбита и щеки голыя, хвость длинный, заостренный, состоить изъ 18 перьевъ, изъ коихъ среднія самыя длинныя, покрывають остальныя.

- а) Фазанъ серебристый (Phasianus nycthemerus Le faisan d'argent, faisan blanc de la Chine Der Silberfasan). Самецъ съ самкою несходный; нервый, сверху бълый, съ тонкими зубчатыми полосками, а снизу фіолетово-черный; послёдняя же ржаво-бурая, съ мелкими велеными крапинами, а снизу съ черными поперечинами.
- b) Фазанъ золотистый (Phasianus pictus Le faisan d'or, faisan rouge Der Goldfasan). У самца волотистый султанъ, багрово-красная грудь и оранжевый воротникъ, съ черною каймою; правильныя перья черныя, съ разноцвътнымъ отливомъ. Самка не такъ раскрашена. Фазанъ этотъ, какъ и предъидущій, происходитъ изъ Китая.
- с) Аргусъ (Phasianus argus L'argus Der Argus). Самецъ длиною 5¹/₄ фута, самка только 2¹/₂ фута; среднія хвостовыя перья и правила крыльевъ очень длинны; посл'ёднія въ крупныхъ пятнахъ, мутно-оливково-

- желтаго цвѣта, съ темными и свѣтлыми каемками. Родина Суматра, Маллака и т. д.
- d) Павлинъ (Pavo Le paon Der Pfau). Хвостъ короткій, зато крестцовыя перья очень длинны, разукрашены разноцвѣтными кругами, распускающіяся колесомъ. Великолѣпное перо его достаточно извѣстно. На ногахъ у самца шпоры, на головѣ хохолъ. Красивое видоизмѣненіе представляютъ бѣлые павлины, съ пятнами бѣлыхъ цвѣтовъ. Павлинъ ежегодно мѣняетъ свои красивыя перья, за исключеніемъ хохла. Живетъ до 25 лѣтъ, происходитъ изъ Остъ-Индіи; крикъ его непріятенъ.
- е) Лофороръ бѣло-черный (Lophophorus Le faisan paon, lophophore Der Glanzfasan). Съ хохломъ, какъ у павлина; перо великолѣно красуется металлическимъ блескомъ: зеленымъ, краснымъ и золотистымъ. Нижняя частъ спинки бѣла, хвостъ красновато-бурый, подбрюшіе черное; одна изъ красивѣйшихъ птицъ на свѣтѣ, но только самецъ. Самка невзрачна: бурая, сѣрая съ желтоватыми жилками.
- f) Индюкъ (Meleagris gallopavo—Le dindon, coq d'Indes—Der Truthahn). Голова и верхняя часть шеи обнажены и покрыты мясистыми бородавками; на лбу мясистый вытяжной хоботь, свёшивающійся съ клюва; хвость ровный и растопыривающійся. Странныя позы самца и его клохтаніе извёстны. Индёйка весьма заботливо высиживаеть свои яйца, а молодые выходять изъ яйца чрезъ 26—28 дней. Индючье мясо чрезвычайно вкусно.

ТАБЛИЦА ХХІУ.

а) Дрохва (Otis tarda—L'outarde—Die Trappe) Ноги длинны, съ тремя только нальцами; въ хвостѣ 20 нерьевъ, крылья коротки, сверху ржаво-красны, енизу красновато-бѣлы. Самецъ украшенъ длиными распущенными усами. Длина дрохвы 4 фута, вѣсъ отъ 25 до 30 фунтовъ. Подъ языкомъ отверстіе къ зобу, глубиною въ 1 футъ. Пугливая и осторожная птица; во время погони спасается бѣгомъ, распустивъ крылья, но можетъ летать легко и далеко. Живетъ общественно, на равнинахъ и степяхъ Европы. Нерѣдко является стаями отъ 50 — 100 штукъ, питается травами, злаками, зелеными всходами и насѣкомыми. Самка кладетъ отъ 2—3

- янцъ, которыя высиживаеть въ 28 дней; мясо молодыхъ вкусно.
- b) Казуаръ (Casuarius Le casoar Der Kasuar). Клювъ узкій и сплюснутый, ноздри далеко напереди, перья всѣ двойныя, а ноги о трехъ пальцахъ. На головъ роговой шлемъ; голова и шея голыя, съ мясистыми висячими наростами, синяго и краснаго цвъта. Небольшія крылья, вмъсто летныхъ перьевъ, снабжены только роговыми стержнями. Перья на тѣлѣ черны и длинны; впереди возвышается на груди большой обнаженный желвакъ; вмъсто хвоста висять жесткія крестцовыя перья. Казуаръ нѣсколько меньше страуса; обрѣтается въ Остъ-Индін и на сосъднихъ островахъ: нища его вообще растительная, но глотаеть и камешки.
- Страусъ (Struthio camelus—L'autruche— Der Strauss). Черный съ бълыми перьями въ хвость и крыльяхъ. Перо состоить изъ мягкихъ гладкихъ перышекъ, которыя на крыльяхъ длиниве чвмъ на туловищв; крылья же облегчають только бъгъ животнаго. Летать оно не можеть. Страусь самое легконогое животное и наибольшая изъ птицъ; рость его достигаеть 7 и даже 8 футовъ, а въсъ переходить за 100 фунтовъ. Крипкими ногами своими онъ опасно лягается и швыряеть ими больше камни. Питается зернами и плодами, но глотаетъ также камешки и другія неудобосваримыя вещи. Страусы живуть дружно между собою, семействами, но во время высиживанія яицъ при самцъ остается только 4 или 5 самокъ; всъ онъ кладуть яйца въ одно общее гнъздо, состоящее изъ ямки, вырытой въ землъ. Яйца высиживаются самками и самцомъ поочередно, безъ участія солнца, какъ разсказываютъ иные. Яйца эти огромны и очень вкусны. Мясо страуса годится въ пищу, а шкура выдълывается на кожу; перья же составляють важный предметь торговли съ Африкой.
- d) Ранду (Rhea americana—Le randou—Der Randu). Сёрый, крылья свётлёе, хвоста не имѣетъ. Перо какъ у страуса; у самца на шеѣ черныя полоски; ростъ 6 футовъ. Водится онъ въ ненаселенныхъ пространствахъ Южной Америки, стаями отъ 20—30 штукъ. Живетъ совершенно какъ страусъ, бѣгаетъ также скоро и также легко укрощается.

таблица хху.

- а) Краснокрылъ (Phoenicopterus La flamingo—Der Flamingo). Клювъ короткій, но срединъ согнутый, по краямъ зазубренный; шея и ноги чрезвычайно длинны, пальцы соединены плавательными перепонками; длина его 5 футовъ. Бледно-розовый, на крыльяхъ карминнаго цевта, правильныя перья черныя, ноги красныя. Дёти мутнобёлыя, съ суроватымъ оттенкомъ и красноватымъ отливомъ на крыльяхъ. Конусообразное гивздо свое краснокрыль вьеть посреди болота, дёлая въ гнёздё этомъ на верхушкъ углубление для яицъ, которыя высиживають какъ-бы верхомъ-сидя. Питается рыбою, слизняками и насъкомыми; водится стаями по берегамъ Средиземнаго моря, а въ жаркое лъто залетаетъ иногда и въ Гер-
- b) Анстъ бѣлый (Ciconia alba—La cigogne-Der weisse Storch). Ростомъ 3 1/4 фута, бълый, съ черными крыльями, клювъ и ноги красны. Аистъ водится на всемъ свътъ и вездъ принимается охотно. Въ среднюю Европу онъ прилетаетъ въ февралъ и мартѣ, сперва самецъ, потомъ онъ же приводить и самку. Въ августъ и сентябръ онъ опять покидаеть нась и зимуеть въ Африкъ или въ Испаніи. Питается лягушками, зм'ями, ящерицами, полевыми мышами, молодыми птицами, червями и насѣкомыми. Гнѣздится большею частію на крышахъ или на деревьяхъ, по близости деревень. Ширина гнъзда отъ 4-6 футъ, а высота его въ н \dot{b} сколько леть увеличивается до 10 футовъ. Самка кладеть оть 3-5 яиць и высиживаеть ихъ въ 28-30 дней, впродолжение которыхъ самецъ заботится о кормъ.
- с) Анстъ черный (Ciconia nigra— La cigogne noire — Der schwarze Storch). Буро-черный съ металлическимъ блескомъ, грудь и животъ бѣлые; ростъ и образъ жизни одинаковый съ предъидущимъ, но питается большею частію рыбою и гнѣздится по высокоствольнымъ лѣсамъ.
- d) Марабутъ (Ciconia marabu, argala—Le marabu Der Marabu). Два вида аистовъвеликановъ: одинъ на берегахъ Сенегала, другой въ Остъ-Индіи; голова и шея покрыты рѣдкимъ пухомъ, подъ шеею кожаный мѣшокъ.
- e) Сфрая цанля, Чапура (Ardea cineraria—

- Le héron commun Der Fischreiher). Pocтомъ въ 3 фута, на затылкъ черноватый висячій хохоль, спина пепельно-сфрая; передняя сторона шеи бълая, съ черными пятнами, подбрющіе большею частію бѣлое. Цапля встрѣчается по всей Европѣ; къ намъ она прилетаетъ въ мартъ и, если не остается на зиму, то отлетаеть въ октябръ. Это осторожная, путливая и лѣнивая птица; пищу ея составляеть рыба, для ловли которой цапля становится въ прудахъ и рекахъ, съ подкорченнымъ клювомъ и, увидавъ рыбу, мигомъ вытягиваетъ шею, чтобъ схватить добычу свою безъ промаха. Гифздится на высокихъ деревьяхъ; самка высиживаеть отъ 3-4 птенцовъ, которые долго остаются въ гивздв.
- f) Красная цапля (Ardea purpurea Le héron pourpré Der Purpurreiher). Ростомъ 3³/4 фута, клювъ и ноги желтые, шея снизу бёлая, сверху оранжевая въ черныя крапинки, на затылкё хохоль; спина, хвость и крылья пепельно сёрые, съ примёсью желтыхъ полосокъ; подбрющіе и бедра красныя. Водится преимущественно въ южновосточной Европъ.

ТАБЛИЦА ХХУІ.

- а) Чепура, кваква (Ardea nycticorax Le bihoreau — Der Nachtrabe). Длиною 1 футь 8 дюймовъ, темно-дымчатая, снизу бѣловатая; маковка и спина сѣрно-сѣрыя. У затылка хохоль изъ трехъ длинныхъ перьевъ.
- b) Вынь малая (Ardea minuta Le petit butor—Die kleine Rohrdommel). Длиною 13 дюймовъ, желто-бураго цвѣта; маковка и спинка черныя, съ зеленымъ лоскомъ; хохла не имѣетъ.
- с) Выпь или водяной быкъ (Ardea stellaris Le butor Die Rohrdommel). Цвъта темной охры, съ черными пятнами и краномъ, голова черновата; водится часто у насъ въ камышахъ, гдъ издаетъ громкое мычаніе.
- d) Журавль обыкновенный (Grus cinereus— La grue — Der Kranich). Рость 4 фута, пепельно-сѣрый, крылья черноваты. Заднія плечныя перья крыльевъ мохнаты и взъерошиваются; затылокъ обнаженный и красный. Журавль лѣтомъ живетъ въ южной Европѣ и въ Азіи, но выводить дѣтей по болотамъ сѣверной Германіи и Россіи. Это птицы

перелетныя, отправляющіяся въ позднюю осень, огромными стаями, въ болве теплыя страны. Они летять въ два ряда, образующіе острый, выдающійся уголь, и притомъ такъ высоко, что можно только слышать ихъ крикъ, недосягая окомъ пролетающаго стада. Журавли изв'єстны по своей чуткости и осторожности; звонкій и громкій голосъ ихъ на полетъ не умолкаетъ. — Питаются они водорослями и всходами повѣсовъ, но охотнъе всего горохомъ; ъдятъ также и насъкомыхъ, слизняковъ и лягушекъ. Самка кладетъ 2 яйца, въ гнѣздо, состоящее изъ тростниковой подстилки, посреди обширныхъ болоть и трясинъ. Молодые такъ шибко бъгаютъ, что человъку едва возможно ихъ догнать.

- е) Ивинъ, ивисъ (Ibis religiosa L'ibis Der Ibis). Клювъ, ноги, правильныя перья, обнаженная часть головы и шеи черные; величиною онъ съ курицу. Древніе Египтяне ему поклонялись и послѣ смерти бальзамировали. Такіе экземпляры открываются и теперь еще въ древнихъ гробницахъ, и между прочимъ можно ихъ видѣть въ Парижскомъ музеумѣ.
- f) Бекасъ (Scolopax La bécasse Die Schnepfe). Имѣетъ въ хвостѣ 12 перьевъ, голени покрыты перьями; туловище краснобурое, съ тонкими черными поперечинами; подбрюшіе желтовато-білое, съ мелкими темнобурыми волнами. Прилетають въ мартв и апрвлв, отлетають стаями въ октябрѣ. Въ средней Европѣ однакоже многіе зимують, питаются между прочимъ хрущами, которыхъ въ сумерки отыскиваютъ клювомъ въ навозѣ. Самка высиживаетъ свои 3 или 4 яйца 16 дней; мясо превосходно, а обжоры угощаются даже потрохами, вмёстё съ каломъ, въ которомъ заключается много кишечныхъ именно ціненей (плоскихъ глистовъ).
- g) Барашекъ, бекассинъ (Scolopax gallinago — La bécassine — Die Becassine). Первое правильное перо съ бурымъ стержнемъ и бѣлымъ наружнымъ опахаломъ. Въ хвостѣ 14 перьевъ, спинка и грудъ бурыя, подбрюшіе и голени бѣлыя.
- h) Пигалица (Trynga vanellus Le Vanneau — Der Kibitz). Ноги красныя, на затылк висячій хохоль, спинка темно-зеленая съ багровымъ отливомъ; грудь черная,

брюхо снѣжно-бѣлое. Пигалицы водятся по всей Европѣ, по низменнымъ лугамъ и влажнымъ полямъ. Пестрыя яица ихъ считаются лакомствомъ. Са́мка высиживаетъ одна, по два раза въ лѣто.

ТАБЛИЦА ХХУП.

- а) Турухтанъ (Trynga pugnax Le combattant Der Kampfhahn). Желто-бурый, среднія хвостовыя перья темно-полосатыя, ноги длинныя. У самца лѣтомъ выростаетъ большой пернатый воротникъ; щеки обнажены. Перо длинно и разнообразно. У самокъ и птенцовъ такого воротника не бываетъ. Птицы эти держатся около озеръ и по берегамъ моря. Весною самцы безпрерывно дерутся между собою; тѣмъ не менѣе они дружно летаютъ вмѣстѣ, возобновляя драку, какъ только опустятся на землю.
- b) Лысуха, водяная курочка (Fulica atra— La poule d'eau— Das Wasserhuhn). Черноватая птица, съ лысинкою на лбу. Обрътается вездъ, надъ озерами и прудами.
- с) Коростель, дергачь (Gallinula crex Le râle de terre Der Wachtelkönig). Цвѣтомъ похожъ на жаворонка, крылья спереди бурокрасныя; держится низменностей, въ высокой травѣ и въ хлѣбахъ, гдѣ, во время жатвы, встрѣчается вмѣстѣ съ перепеломъ. Бѣгаетъ очень скоро и голосомъ часто обманываетъ охотника.
- d) Ясана или жакана (Parra Le jacanas Der Spornflügler). Имъетъ у изгиба крыльевъ шноры, а нальцы у ногъ длинные и тонкіе, съ такими же остроконечными когтями. Водится по болотамъ, озерамъ и прудамъ жаркихъ странъ; шибко и съ большимъ шумомъ перебъгаетъ по водорослямъ.

Чайка (Larus — La mouette — Die Möve). Клювь крыпкій, къ концу загнутый, хвость прямой. Бываеть обыкновенно облая, съ синеватою или черновато-сфрою спиною; голова буроватая. Чайки водятся преимущественно по морскимь берегамъ сфверной Европы и осенью переселяются южнфе. Плавають онф рфдко, а болфе летають около берега, стаями, издавая громкій крикъ.

е) Чайка хохотливая (La mouette rieuse — Die Lachmöve). Крылья бёлыя съ черными краями, стержни крыльевъ бёлые съ черными кончиками. Спинка сребристо-сёрая, подбрюшіе бёлое, клювъ и ноги красные;

- голова и подшеекъ лѣтомъ—дымчато-бурые, вимою—бѣлые, съ темнымъ значкомъ около уха.
- f) Морская чайка (Larus marinus—Le goëland à manteau noir Die Mantelmöve). Спина, плечи и крылья аспидно-сърыя, концы крыльевъ бълые, ноги свътло тълеснаго цвъта.
- g) Серебристая чайка (Larus argentatus Le goëland argenté — Die Silbermöve). Спинка и плечи сѣрыя, крылья черныя съ бѣлыми концами; стержни перьевъ черноваты.

ТАБЛИЦА XXVIII.

- а) Чеграва (Sterna L'hirondelle de mer Die Seeschwalbe). Клювъ красный, прямой и заостренный, хвостъ вилообразный; обыкновенно бѣлая, съ сѣро-пепельною спинкою и крыльями, маковка черная. Птицы эти летаютъ цѣлый день и рѣдко плаваютъ. Живутъ онѣ по берегамъ моря, но встрѣчаются и надъ рѣками и озерами, питаются рыбою, насѣкомыми и червями.
- b) Поморникъ (Lestris Le stercoraire Der Struntjäger). Въ родѣ чайки, съ клювомъ, загнутымъ на концѣ крюкомъ. Кормится рыбами, насѣкомыми, червями и падалью, но самъ рыбу не ловитъ, а отбиваетъ добычу у чаекъ и чегровъ.
- с) Буревѣстникъ (Procellaria Le pétrel Der Sturmvogel). Клювъ на концѣ загнутъ крюкомъ, ноздри расположены въ горбикѣ; длиною 6 дюймовъ, черный какъ сажа. Крестецъ и гузка бѣлые; такая же имѣется полоса на крыльяхъ. Буревѣстникъ встрѣчается на большихъ разстояніяхъ отъ морскаго берега, что доказываетъ его выдержку въ полетѣ, потому что почти онъ никогда не плаваетъ. Передъ бурею ищетъ убѣжища на кораблахъ или на скалахъ, почему и служитъ дурнымъ предзнаменованіемъ для моряковъ. Встрѣчается какъ въ южныхъ, такъ и въ сѣверныхъ моряхъ.
- d) Альбатросъ (Diomedea L'albatros Der Albatros), клювъ длинный и крѣпкій, верхняя челюсть оканчивается толстымъ крюкомъ, нижняя укорочена, ноги трехпалыя, съ большими плавательными перепонками; цвѣтъ бѣлый, съ красноватымъ отливомъ. Величиною съ лебедя; между распростертыми крыльями отъ 11 до 12 футовъ.

- Водится въ южныхъ моряхъ, гнѣздится на пригоркахъ; яица велики и вкусны, но мясо негодно. Питается рыбою.
- е) Пеликанъ или баба-птипа (Pelecanus onocratalus — Le pélican — Der Pelican, Die Kropfgans). Клювъ очень длинный, прямой, сплющенный, съ крюкообразнымъ когтемъ на концѣ; подъ нижнею челюстью и глоткою большой обнаженный и растяжимый мінокъ. Молодой біловать, старый — розоваго цвъта. Длина въ 6 футовъ, въсъ отъ 20 — 25 фунтовъ. Встръчается въ Средиземномъ моръ, летаетъ удивительно высоко; голось его уподобляется ослиному. Рыбу въ нѣсколько фунтовъ пеликанъ глотаетъ разомъ; прочую добычу онъ хранить въ глоточномъ мѣшкв. Самка кладеть оть 2 — 5 яицъ и высиживаеть ихъ по болотистымъ островамъ.

Лебедь (Cygnus—Le cygne—Der Schwan). Клювъ по обоимъ концамъ одинаковой ширины, шея очень длинна. Лебеди охотнъе остаются на водъ, чъмъ на сушъ; питаются водяными растеніями и насъкомыми.

- f) Домашній лебедь (Cygnus olor Le cygne à bosse Der Höckerschwan). Клювь красно-желтый, у корня черный, горбомъ; перо бёлое, ноги черныя. Въ дикомъ состояніи лебеди встрёчаются во всей Европё, по берегамъ морей, рёкъ и озеръ; осенью лебеди отлетають на югъ, стаями отъ 40 60 штукъ; иные же зимують на мёстё. Освоенный лебедь величаво плаваеть по рёкамъ и прудамъ; летаеть онъ легко и ловко. Самка высиживаеть отъ 6 8 яицъ, въ плохо-устроенномъ гнёздё, которое служить ей изъ году въ годъ.
- g) Лебедь гласный (Cygnus musicus Le cygne chanteur Der Singschwan). Клювъ у корни желтый, напереди черный, безъ горба; перо и ноги какъ у предъидущаго. Этотъ видъ лебедей живетъ на сѣверѣ Европы, Америки и Сибири, во множествѣ выводится надъ озерами Лапландіи, и только зимою перелетаетъ южнѣе. При помощи трубчатаго устройства дыхательнаго горла своего, птица эта производитъ громкій звукъ, подавшій поводъ къ сказкѣ о лебединой пѣснѣ.
- h) Гусь (Anser L'oie Die Gans). Клювъ оранжевый, кръпкій, напереди съуженный;

ноги находятся посрединѣ туловища, вслѣдствіе чего гусю удобнѣе ходить, нежели уткѣ и лебедю. Держится какъ на водѣ, такъ и на сушѣ, питаясь водорослями и злаками. Дикій гусь водится во всей Европѣ, по озерамъ и прудамъ, за исключеніемъ дальняго сѣвера. Въ сентябрѣ и октябрѣ

переселяются на югъ и возвращаются въ мартъ. На перелетъ они тянутъ подъ угломъ. Отъ этой породы гусей происходитъ и домашній гусь, который достаточно извъстенъ.

таблица ххіх.

- а) Дикій гусь, гусь полевой (Anser segetum L'oie sauvage Die Saat- oder Schneegans). Одинаковой всличины съ предъидущимъ; клювъ черный, посрединъ оранжевый, крылья длиниъе хвоста. Водится на съверъ Европы, Азіи и Америки; у насътолько зимуетъ, являясь въ сентябръ и отлетая въ мартъ. Онъ очень остороженъ и чутокъ, зимою наноситъ много вреда озимымъ всходамъ. Въ средней Германіи есть мъстность (Тюрингія), гдъ гуси эти собираются въ безчисленномъ множествъ.
- b) Казарка (Anser bernicla La gravaut Die Ringelgans). Голова, шел, клювъ, крылья и ноги черны; на шев бълое кольцо. Выводится въ полярныхъ странахъ, къ намъ же залетаетъ случайно.
- с) Утка (Anas Le canard Die Ente) отличается отъ гуся плоскимъ клювомъ равномѣрной широты, покрытымъ роговою пленкою языкомъ и короткою шеею. Утка питается растеніями, но предпочитаетъ животную пищу, какъ-то: рыбу, слизняковъ, червей и водяныхъ насѣкомыхъ. Приводимъ слѣдующіе виды:
 - а) Гоголь, гагачъ (Anser molissima L'eider Die Eidergans). Отъ клюва идуть двѣ обнаженныя полосы по лбу; самецъ бѣлый, брюхо, хвостъ и крылья черные, шея по сторонамъ зеленоватая. Птица эта обитаетъ на дальнемъ сѣверѣ Европы, Азіи, Америки и только въ суровыя зимы залетаетъ южнѣе. Гоголь летаетъ, плаваетъ и ныряетъ хорошо; весьма цѣнится по достоинству яицъ и въ особенности пуха, котораго 5-ти фунтовъ достаточно для наполненія перины.

- b) Самка бурая, съ черными волнистыми иятнышками.
- d) Турпанъ (Anas histrionica La tadorne Die Kragenente). У самца зеркальце крыла темно-фіолетовое и черное (у самки его нѣтъ). По синевато-сърому грунту причудливый — бѣлый, черный и бурый — узоръ.
- е) Свирьёкъ (Anas fusea La macreuse Die Sammetente). Зеркальце и глазное пятно бѣлые; самецъ совершенно черный, самка съ бурымъ отливомъ.
- f) Утка матерая, дикая и домашняя (Anas boschos La canard ordinaire Die gemeine wilde Ente). Имбеть на крыльяхь зеркальце съ синимъ и зеленымъ отливомъ; среднія хвостовыя перья кудряво закручены. Распространена по всей Европѣ, водится вездѣ по озерамъ; отъ нее происходитъ наша домашняя утка.
- g) Утка турпанъ (Anas tadorna La grande macreuse — Die Brandente). Зеркальце зеленое съ красными каемками, перо пестрое въ разные цвѣта: бѣлый, зеленовато-черный и красноватый; клювъ красный. Самецъ и самка между собою очень сходны.
- h) Шилохвость (Anas acuta Le canard à longue queue Die Spiessente). Сверху и по бокамъ пепельно-сърый, съ нъжнымъ волнистымъ отливомъ; снизу бълый, голова темно-бурая, зеркальце зеленое, ржаное, бълое и синее. Самецъ ръзко отличается отъ самки.


ТАБЛИЦА ХХХ.

- а) Нырокъ (Mergus La harle Der Säger). Клювъ очень узкій, зазубренный, съ крюкообразнымъ когтемъ на концѣ. Зеркальце бѣлое; у самца короткій чепецъ, голова, верхняя часть шей и плечныя перья черныя, съ зеленымъ отливомъ; подбрюшіе бѣлое, съ блѣдно-красновато-желтымъ отливомъ.
- b) Паганка, чомга (Podiceps La grèbe Der Steissfuss). Клювъ прямой, заостренный; пальцы раздёлены и снабжены пластинчатою плавательною перепонкою. Хвоста нётъ, перо сверху темное, снизу блестящей сребристой бёлизны. Шкурку употребляютъ на мёха. У старыхъ бываетъ большой хохолъ и воротникъ, ржавчатаго цвёта. Питается лягушками и насёкомыми.
- c) Туникъ (Colympus Le macareux Der Seetaucher). Величиною съ гуся, клювъ


- длиною 4 дюйма, очень высокій. Голова и предобрати по блестяще-черныя; задняя часть шей съ бълою полосою, въ черныхъ крапинахъ. Спина черная съ бълыми пятнами, подбрющіе бълое. Тупикъ водится въ съверныхъ шіе бълое. Тупикъ водится въ съверныхъ шіе бълое жатъ и у старыхъ онъ покрытъ поперечными рубцами. Верхъ туловища черный, низъ бълый. Щеки свътло-сърыя, клювъ у
- d) Кайра или пыжикъ (Uria Le guillemot Die Lumme). Клювъ прямой, заостренный, ноги трехналыя; шибко плаваетъ и ныряетъ. Водится въ сѣверныхъ моряхъ, питаясь рыбою. Самка кладетъ только одно, но очень большое яйцо. Кайра высиживаетъ такъ рачительно, что даетъ себя поймать на гнѣздѣ. Мясомъ, яйцами и перьями пользуются въ особенности жители Фарэерскихъ острововъ. Все перо черное, кромѣ бѣлаго зеркальца на крыльяхъ. Ноги красныя, трехпалыя.
- e) Чистикъ безкрылый (Alca impennis L'algue Der grosse Alk). Длина 2 1/2 фута, шейка и спина черныя, подбрюшіе и бровь бѣлыя; крылышки недостаточно велики для летанія; клювъ высокій, въ поперечныхъ рубцахъ. Водится подъ полярнымъ кругомъ, но встрѣчается весьма рѣдко.
- f) Тупикъ обыкновенный или морской попугай (Mormon fratercula—Le macareux guillemot Der Papageitaucher). Высота клюва превышаеть его длину; съ боковъ онъ сжатъ и у старыхъ онъ покрытъ поперечными рубцами. Верхъ туловища черный, низъ бѣлый. Щеки свѣтло-сѣрыя, клювъ у корня синевато-сѣрый, а дальше въ оранжевыхъ полоскахъ. Водится во множествѣ въ Гренландіи и Исландіи, отрываетъ для себя въ песчаномъ грунтѣ норы, глубиною до б футовъ, или отыскиваетъ пещеры, въ которыхъ вьетъ свое большое гнѣздо. Мясо и яйца употребляются въ пищу, а шкурка—на мѣха.
- g) Пингвинъ (Aptenodytes Le pingouin Der Pinguin). Клювъ прямой, верхняя челюсть у самой головы согнута, нижняя укорочена; крылья безъ перьевъ для полета, на ногахъ четыре пальца, хвостъ короткій и жесткій. Птица эта водится въ южныхъ моряхъ, почти постоянно плаваетъ, гребя крыльями; выходитъ на берегъ только для высиживанія и съ трудомъ добирается до своего гиѣзда. Кладетъ по два вкусныхъ яйца, но мясо пингвина не годится.


tribute and the deliver he sales



















































































































































































ECTECTBEHHAЯ ИСТОРІЯ

ЗЕМНОВОДНЫХЪ, РЫБЪ, ЧЕРЕПОКОЖНЫХЪ,

СЛИЗНЯКОВЪ, НАСѢКОМЫХЪ, ЧЕРВЕЙ И ЛУЧИСТЫХЪ ЖИВОТНЫХЪ,

ВЪ ИЗОБРАЖЕНІЯХЪ.

СНЯТЫХЪ И РАСКРАШЕННЫХЪ СЪ НАТУРЫ И СЪ ОТЛИЧНЪЙШИХЪ ЗООЛОГИЧЕСКИХЪ СОБРАНІЙ РИСУНКОВЪ.

для нагляднаго обученія

ВЪ ОБЩЕСТВЕННЫХЪ ЗАВЕДЕНІЯХЪ И ПРИ ДОМАШНЕМЪ ОБРАЗОВАНІИ ЮНОШЕСТВА.

составлена по пространному учебнику естественной истории профессора

ШУБЕРТА.

КАКЪ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНІЕ

ко всякому учебному руководству;

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ КРАТКАГО ПОЯСНИТЕЛЬНАГО ТЕКСТА.

съ намецко-французскаго подлинника перевелъ

Г. И. КОРИ.

ПЯТОЕ ИЗДАНІЕ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. изданіе книгопродавца ф. а. витепажа. Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 10 Октября 1879 г.

земноводныя.

(Bestiae quasi ancipites — Les amphibies — Die Amphibien).

ТАБЛИЦА І.

Змъи (Serpentes — Les serpens — Die Schlangen).

Змѣи имѣютъ длинное, цилиндрическое (валообразное) твло, безъ шеи, и покрыты по большей части чешуею, которая, на брюхъ, представляеть щиты большихъ размъровъ. Не имъя ногъ, они однако двигаются съ быстротою стрълы, поперемънно сгибая и выпрямляя тёло, съ большою силою и скоростію. Позвоночный столбъ состоить изъ многихъ, часто болъе 200 позвонковъ; ребра начинаются отъ самой головы и доходять до задняго прохода; легкія образують большею частію одинъ, простирающійся до задняго прохода мѣшокъ, а сердце снабжено двумя предсердіями. Языкъ обыкновенно длинный, мягкій. зам'тно раздвоенный и далеко высовывающійся, но совершенно безвредный. Голось только шиптніе. Пасть чрезвычайно растяжима, такъ что змён могуть глотать животныхъ, которыя гораздо толще ихъ самихъ. Во время крайне-медленнаго пищеваренія, животныя эти погружаются какъ-бы въ оцепененіе. Оне линяють нёсколько разъ и живуть очень долго. Самки частью несуть яйца съ мягкою кожеобразною скорлуной, кладя ихъ въ песокъ или въ навозъ, частію же онѣ рожають живыхь дѣтей. Змён холодных в странъ зимою цёненёють. Он' вообще очень опасны для челов' ка, частію по величинѣ и хищности своей, частію страшнымъ ядомъ, заключающимся въ особыхъ жедезистыхъ нузырькахъ, расположенныхъ позади зубовъ или надъ ними; зубы же у змъй, внутри пустые и загнутые, высовываются и втягиваются подобно кошачымы когтямы. Есть однакоже и неядовитыя породы зміви, которыхъ вдять. Большая часть змый водится на суш'ь; живущихъ же въ вод'в немного.

а) Удавъ, Боа (Boa constrictor — Le boa — Die Riesenschlange, Schlinger, Königsschlange). Голова явственно - отдъляющаяся, хвость хваткій, съ небольшими отростками ногь по сторонамъ прохода. Самая страшная изъ всёхъ змѣй, бываеть длиною отъ 30—40 ф.; нападаетъ не только на людей, но даже на буйволовъ и тигровъ, обвиваетъ и обслюниваетъ свою добычу, размазживаеть ее

и, превративъ какъ-бы въ колбасу, проглатываетъ. Насытившись, это животное впадаетъ въ изнеможеніе, и въ этомъ состояніи его легко убить. Удавъ имѣетъ красивую разноцвѣтно-пеструю кожу; онъ обитаетъ въ жаркихъ поясахъ Стараго и Новаго Свѣта.

b) Гремучникъ, гремучій змѣй (Crotalus — Le scrpent à sonnettes, crotales — Die Klapperschlange). Конецъ хвоста снабженъ гремушкою изъ шатко-соединенныхъ между собою роговыхъ колецъ. Эта ядовитая змѣя, длиною 6 ф., обитаетъ въ Америкѣ, но не такъ опасна, какъ иногда разсказываютъ путешественники. Это животное лѣнивое; не бывъ раздражено, оно робко уходитъ отъ человѣка. Питается оно зайцами, морскими свинками, птицами и водными животными, которыхъ, умѣя плавать, ловитъ по рѣкамъ и прудамъ. Свиньи пожираютъ гремучихъ змѣй безъ всякаго для себя вреда; ѣдятъ ихъ и индѣйцы, отрубивъ сперва голову.

таблица и.

Гадюки, змъи ядовитыя (Viperae—Serpens venimeux ou vipères—Giftige Schlangen oder Vipern).

Пасть большая, широко-растяжимая, съ ядовитыми зубами.

- а) Змѣя или Наія очковая (Haja tripudians Serpent à lunettes — Die Brillenschlange). Самая ядовитая въ Старомъ Свѣтѣ; имѣетъ на затылкѣ темный узоръ, похожій на очки. Достигаетъ 2 — 4 ф. длины и водится въ Остъ-Индіи.
- b) Гадюка обыкновенная или козулька (Vipera Berus—La vipère—Die Otter). Буроватая, съ черною зубчатою лентою вдоль спины и крапинами, того же цвѣта, по сторонамъ; на головѣ черныя же, дугообразныя полосы. Наибольшая величина ея 2 ф. Встрѣчается во всей Европѣ, преимущественно въ мѣстностяхъ гористыхъ и лѣсистыхъ. Укушеніе этой змѣи наиопаснѣе въ знойное время, и бываетъ иногда смертельнымъ; но не будучи задѣта, козулька не жалитъ.

Ужи или неядовитыя змёй (Couleuvres non venimeuses — Ungiftige Nattern).

c) Кольчатый ужъ (Coluber natrix—Le serpent à collier—Die Ringelnatter). Стальнаго цвѣта; у самца голова окаймлена желтоватымь ошейникомъ; вдоль брюха рядь четырехугольныхъ желтоватыхъ пятенъ. Дости-

гаетъ длины 3 — 4 ф. Питается кротами, мышами, лягушками, саламандрами и мелкою рыбою; водится во всей Европф, хорошо плаваетъ, долго выдерживаетъ подъводою, ползаетъ иногда по деревьямъ, а зимнюю спячку проводитъ въ норахъ.

d) Гадюка Эскулапъ (С. Aesculapii—La couleuvre d'Esculape — Die Aesculapnatter). Сверху коричневатая, снизу желтоватая, достигаеть длины до 5 ф. и освоивается. Встрвчается въ южной Европв.

ТАБЛИЦА III.

- а) Гладкая гадюка (С. Levis—La couleuvre lisse Die glatte Natter). Спинная чешуя гладкая, безъ стержня; верхняя половина тёла красновато-бурая или зеленая, съ 2-мя продольными рядами неправильныхъ, темныхъ пятенъ. Этотъ неядовитый, но весьма раздражительный и кусливый ужъ встрёчается мъстами въ Германіи.
- b) Желтоватый ужъ (C. flavescens—La couleuvre jaunâtre—Die gelbliche Natter). Длиною 5 ф., сверху съро-бурый, снизу изжелта-бълый, спинная чешуя гладкая или съ малозамътнымъ стержнемъ, брюшные щиты по краямъ загнуты. Водится въ южной и западной Германіи (напр. въ Шлангенбадъ).
- c) Морская змѣя (Hydrus Pelamys L'hydre Die Wasserschlange). Встрѣчается только въ жаркихъ странахъ, водится по рѣкамъ и въ морѣ, чрезвычайно ядовита. Хвостъ у нея силюснутый.
- d) Мѣдяница ломкая (Anguis fragilis L'orvet Die Blindschleiche, Der Haselwurm). Тѣло цилиндрическое, покрытое чешуею, на подобіе черепицы. Хвостъ очень длиненъ, кожа лоснящаяся, краснобураго цвѣта, съ черными продольными полосами на спинѣ. Достигаетъ 1½ ф. длины и встрѣчается особенно на мѣстахъ, обращенныхъ къ солнцу. Питаясь насѣкомыми, улитками и червями, она полезна, и ее бы не слѣдовало истреблять. Въ новѣйшее время змѣю эту стали причислять къ ящерицамъ, потому что у нее развиты грудина и вѣки.

ТАБЛИЦА IV.

Ящерицы (Saurii—Les sauriens—Die Eidechsen).

Туловище, о четырехъ или двухъ ногахъ, оканчивается хвостомъ, составляющимъ его про-

- долженіе; оно покрыто плоскою или зернистою чешуею. Чешуя эта расположена на спинѣ подобно черепицѣ, на брюхѣ же она образуеть поперечные ряды. (Крупнѣйшимъ чешуйкамъ даютъ названіе плитокъ или щитовъ). Пасть у ящерицъ вооружена зубами. Дѣтеныши ихъ выходятъ уже совершенно сложившимися изъ яйца, покрытаго тонкою известковою скорлупою. Большая часть ящерицъ живетъ на сушѣ и только крокодилы остаются больше въ водѣ.
- а) Кайманъ (Alligator—Le caïman—Der Kaiman). Рыло короткое и широкое, заднія ноги снабжены половинною плавательною перепонкою, между глазами находится выдающаяся поперечная связь. Цвѣтъ его темножелтобурый, снизу переходить въ яркожелтый, съ отдѣльными темнобурыми пятнами и полосами. Кайманы водятся во множествѣ въ Гвіанѣ и Бразиліи; достигають они длины въ 8—14 ф. и бывають опасны для человѣка, нападая на плывущіе по рѣкамъ челноки. (Здѣсь кайманъ изображенъ застающимъ змѣю, истребляющую его яйца).
- b) Крокодилъ (Crocodilus vulgaris, niloticus— Le crocodil—Das Krokodil). Цвѣта зеленаго, съ черными поперечными полосами; полный рость отъ 20 — 30 ф. въ длину. Спинные щиты такъ тверды, что косвенно-попадающія въ крокодила пули отскакивають; но въ брюхо, гдъ чешуя мягка, легко его ранить. Животныя эти водятся въ Нилѣ и другихъ большихъ рѣкахъ Африки. Скрываясь въ камышахъ, онъ подстерегають у водопоя всякихъ животныхъ, бросаются на овецъ и антилопъ, нападаютъ даже на людей. Сколько отваженъ крокодилъ въ водъ, столько же онъ трусливъ на сушъ. Яйца крокодила величиною съ гусиное, и дътеныши выползають изъ нихъ черезъ мъсяцъ. Къ-счастью, они истребляются во множествъ ихневмономъ (фараоновою мышью) и этимъ останавливается чрезм'врное размножение крокодиловъ. Достигають они 100 лѣтъ и растутъ медленно. На второмъ году длина ихъ не больше 2-хъ футовъ.

ТАБЛИЦА V.

а) Хамелеонъ (Chamaeleo—Le caméléon—Das Chamäleon). Странное животное съ длинными ногами, угловатой головой, большими глазами и длиннымъ, свертывающимся хвостомъ. Легкія у него очень велики и мо-

гуть чрезвычайно разширяться, при чемъ кровь, приступая болже или менже къ кожж, просвъчиваеть красноватымъ цвътомъ, и отъ этого измѣняется наружный цвѣтъ самаго животнаго; оно является то желтымъ, то чернымъ или же въ пятнахъ. Глаза могуть двигаться независимо одинъ отъ другаго, такъ что, когда одинъ глядить кверху — другой можеть глядьть внизъ. Хамелеонъ животное неповоротливое и лънивое, большею частію сидить неподвижно питается насѣкомыми, котона деревъ; рыхъ ловитъ своимъ длиннымъ, клейкимъ, чрезвычайно подвижнымъ языкомъ. водится во множествъ по берегамъ Нила, но встрвчается и въ южной Испаніи.

- b) Обыкновенная ящерица (Lacerta Le lézard proprement-dit Die eigentliche Eidechse). Спина коричневая или красноватосёрая, съ продольными пятнами, брюхо зеленовато-желтое. Эта ящерица встрѣчается во всей Европѣ, подъ заборами и кучами каменьевъ, на мѣстахъ, обращенныхъ къ солнцу. Это живое, проворное и совершенно невинное животное легко освоивается и приноситъ большую пользу истребленіемъ множества насѣкомыхъ. Въ первые теплые весенніе дни оно пробуждается отъ зимняго сна.
- с) Сѣрая или стѣнная ящерица (L. muralis—Le lézard des murailles Die Mauereidechse). Спинка черновато-сѣрая, буроватая или зеленая, съ продольными рядами черныхъ неправильныхъ крапинъ; брюхо бѣлое или красноватое, иногда въ черныхъ крапинахъ. Водится вообще въ южной Европѣ, но встрѣчается и въ средней.
- d) Игуана (Ідиапа—L'iguane—Der Leguan). Туловище и хвость покрыты мелкою чешуею, а вдоль спины высокій чешуйчатый гребень. Зобъ ввидѣ висячаго мѣшка; голова покрыта пластинками; хвостъ длинный и свертывающійся; цвѣтъ желтоватозеленый, въ узоръ мрамора. Длина 4 5 ф. Водится въ теплыхъ полосахъ Америки. Игуаны быстры и проворны, держатся обыкновенно на деревьяхъ и питаются плодами и насѣкомыми. Мясо и яйца ихъ весьма вкусны.
- e) Базилискъ (Basiliscus Le basilic Der Basilisk). Весь покрыть чешуею, спина снабжена острымъ чешуйчатымъ гребнемъ.

Это животное, не им'я ничего общаго съ баснословнымъ базилискомъ, водится на деревьяхъ, но пускается также въ воду и совершенно безвредно.

f) Драконъ (Draco—Le dragon—Der Drache). Крылатая ящерица, которой крылья служать однакоже не для полета, а только въ видѣ парашюта, при скаканіи. Хвость длиненъ, туловище и хвость зеленые, крылья буроватыя, съ темно-бурыми поперечными полосами. Это маленькое, невинное животное водится въ Ость-Индіи, на деревьяхъ, и ловить насѣкомыхъ, дѣлая при этомъ, съ помощью своей летательной перепонки, скачки шаговъ на 20 и на 30.

ТАБЛИЦА VI.

Cаламандра (Salamandra—La Salamandre—Der Salamander oder Molch).

О четырехъ пятипалыхъ ногахъ, безъ когтей, имъетъ языкъ приросшій и зубы, не только въ верхней и нижней челюстяхъ, но и въ нёбъ. Саламандра питается насъкомыми, червяками и улитками.

- а) Саламандра земная (Salamandra terrestris—La salamandre terrestre—Der Erdsalamander). Тёло покрыто бородавками, хвость круглый, за ушами двё большія ноздреватыя железы. Цвёта чернаго, съ большими желтыми пятнами. Длина 6 7 дюймовъ. Это животное встрёчается въ умёренной полосё Европы, въ темныхъ, сырыхъ мёстахъ, особенно по гористымъ лёсамъ; оно копотливо и, подобно жабё, выходитъ только по ночамъ. Самка рождаеть живыхъ дётей.
- b) Укола, водяная саламандра (Triton—La salamandre aquatique - Der Wassersalamander). Безъ ушныхъ железъ, хвостъ сплюснутый въ ширину. Эти саламандры менъе бородавчаты, чъмъ предъидущія; плавая проонъ держатся больше въ водъ, осенью же выходять изъ нея и прячутся въ щели и норы, для зимней спячки. Онъ удивительно живучи, замерзають даже во льду, безъ вреда для себя, и одарены свойствомъ отрастанія утраченныхъ членовъ. Саламандры кладуть по одному яйцу, изъ котораго является головастикъ, переобразовывающійся, подобно лягушкамъ, въ водъ. Жабры у нихъ свободно-висячія, безъ наружнаго покрова; переднія ноги образуются раньше заднихъ, а хвостъ остается

навсегда, между тѣмъ какъ жабры мѣняются. На рисункѣ показано постепенное развитіе головастика.

- с) Протей (Proteus—Le protée—Der Olm, Proteus, Höhlensalamander). Тёло подобное угрю, четыре короткія ноги далеко между собою разставлены— переднія съ 3-мя, заднія съ 2-мя пальцами; длиною въ добрую пядю; цвётомъ блёдно-красенъ, рыло гладкое и тупое, обё челюсти снабжены зубами. Крошечныя ноздри будто наколоты. Глаза, въ видё точекъ, лежатъ подъ кожею. Позади головы находятся, съ обёихъ сторонъ, по два пучка жабръ, ярко-краснаго цвёта, къ которымъ кровь притекаетъ изъ сердца. Это странное животное встрёчается въ подземныхъ водоемахъ Циркницкаго и Зитлихскаго озеръ, а также въ Адельсбергской пещерё.
- d) Спрена ящеричная (Siren lacertina—La sirène Die aalförmige Sirene). Тѣлосложенія угреобразнаго, о двухъ только переднихъ ногахъ, цвѣта чернаго. Имѣетъ, подобно протею, съ каждой стороны по 3 жаберныхъ отверстія и по стольку же жаберныхъ пучковъ. Ноздри и глаза крошечныя. Животное это достигаетъ длины почти въ 3 ф. и водится въ Сѣверной Америкъ, въ болотахъ Каролины; питается червями и насѣкомыми.

ТАБЛИНА VII.

Лягушки и жабы (Rana et Bufo — Les grenouilles et les crapauds — Die Frösche und Kröten).

Замѣчательны превращенія, которымъ подвергаются эти животныя, до совершеннаго своего развитія. Самка мечеть икру только въ водѣ и всю за одинъ разъ, въ видѣ нитей или глыбокъ (см. фиг. a, b и d 1). Зерно икры представляеть слизистый шарикь, съ черною точкою въ срединѣ, которая и есть настоящій зародышъ. Изъ него развивается дътенышъ, называемый головастикомъ. Головастикъ, съ длиннымъ хвостомъ, не имъя ногъ, походитъ на рыбу; позади же головы у него 3 выдающихся жаберныхъ пучка, чрезъ которые обращается вся кровь. Вода принимается ртомъ и выпускается чрезъ жаберныя скважины. Въ нѣсколько дней жабры проростають кожею, и только на левой стороне остается небольшое отверстіе, для выхода втянутой воды. Посл'я окончательнаго образованія жаберной полости высовываются заднія лапы, головастики хватаютъ воздухъ, и тогда, кромѣ вдыханія воды, наступаетъ и вдыханіе воздуха, посредствомъ легкихъ. По истеченіи 14 дней являются также переднія лапы, хвостъ укорачивается, жабры изчезають, и молодая лягушка выходитъ на берегъ. Съ этихъ поръ дышетъ она только воздухомъ. Жаберные сосуды съеживаются и наконецъ совершенно теряются; маленькій хвостъ пропадаетъ и этимъ довершается все превращеніе, изображенное на рисункахъ (а, b и d 1. 2. 3. 4. е 1).

Жаба (Bufo — Le crapaud — Die Kröte). Тёло толстое, округленное, снина вся въ бородавкахъ, за ушами вздутыя железы. Заднія ланы короче чёмъ у лягушки, поэтому жабы скачуть тяжело. Видъ этого ночнаго животнаго отвратителенъ. Въ жаркихъ странахъ встрёчаются породы, достигающія величины 8—10 дюймовъ.

- а) Жаба обыкновенная (Bufo cinereus Le crapaud commun—Die gemeine Kröte). Грязно-сёрая, съ большими бурыми бородавками. Совершенно выросшая жаба величиною 5 — 6 дюймовъ и чрезвычайно толстопуза. Водится въ сырыхъ, темныхъ мъстахъ, по огородамъ, старымъ строеніямъ, погребамъ и выходить ночью для отысканія пищи, состоящей изъ насъкомыхъ и червей. Зимою она цъпенъетъ не совсъмъ, а будучи затронута — уползаетъ. Она появляется въ болотахъ еще до таянія снѣга и льда, пускаеть икру двумя нитями (см. а b 1), длиною до 40 ф., содержащими въ себѣ до 1,200 зеренъ. Раздраженная жаба брызжеть мочею, вредность которой для человѣка обнаружена многими опытами. Жабы очень долговъчны; ихъ не разъ находили живыми, плотно заключенными въ масст камня и строительнаго раствора.
- b) Жаба вонючая (В. calamita—Le crapaud des maisons Die Hausunke). Длиною въ 2 дюйма, спина оливково-бурая съ бурокрасными бородавками, вдоль хребта желтая полоса. За исключеніемъ времени метанія икры она держится въ темныхъ мѣстахъ, отчасти также въ домахъ и погребахъ и издаетъ унылое кваканье.
- с) Пипа хребтородная (Ріра Le ріра Die Ріра). Съ весьма длинными, округленными ровными пальцами переднихъ лапъ и плавательною перепонкою между пальцами заднихъ ногъ. Тъло покрыто шеро-

ховатыми бородавками. Пипа, длиною въ 6 дюймовъ, живетъ въ Бразиліи и Гвіанѣ; негры ѣдятъ ея мясо. Только-что выпущенную икру самецъ намазываетъ самкѣ на спину; распухающая кожа образуетъ кругомъ зеренъ ячейки, въ которыхъ развиваются головастики, оставляющіе свои келіи только по истеченіи 3 мѣсяцевъ, т. е. совершивъ уже свое превращеніе. Во все это время самка остается подъ водою.

- d) Водяная зеленая лягушка или ядомая (Rana esculenta-La grenouille commune-Der gemeine Frosch). Спина свътло- или темно-зеленая, брюхо бѣлое; на обоихъ черныя пятна, а вдоль спины три желтыя полосы. Эти цвъта наикрасивъе бывають весьною; посл'я они переходять въ синеватый. Обыкновенныя лягушки водятся большею частію только въ прудахъ, стаями въ нѣсколько тысячь; онъ удаляются отъ берега лишь на нѣсколько шаговъ, и при малѣйшей опасности бросаются въ воду. Передъ концомъ апръля пробуждаются онъ отъ зимней спячки, которую проводять въ тинъ. Въ теплыя весеннія ночи кваканье ихъ раздается далеко. Икру онъ мечутъ въ іюнъ, а дътеныши достигають полнаго развитія лишь осенью. Питаются живыми насъкомыми.
- е) Квакша зеленая (Hyla arborea La rainette Der gemeine Laubfrosch). Спинка красивозеленая, брюхо бёловато и усѣяно бородавками. Верхняя сторона отдѣлена отъ нижней желтою полосою съ черною каемкой. Громкій голосъ самцовъ въ особенности раздается въ маё и въ іюнѣ, во время метанія икры и передъ перемѣною погоды, почему ихъ и содержать въ банкахъ, какъ вѣстниковъ погоды. При кваканіи горло раздувается въ большой шаръ.

ТАБЛИЦА VIII.

Черепахи (Cheloniæ, testudæ—Les tortues—Die Schildkröten),

Отличается отъ всёхъ пресмыкающихся тёмъ, что тёло ихъ заключено между двумя щитами — спиннымъ и брюшнымъ, изъ подъ которыхъ торчатъ только подвижныя части — голова, ноги и хвостъ. Щитъ окружаетъ это животное подобно крёпкой бронё и многія совершенно подъ нимъ укрываются. Спинной щитъ покрытъ нёсколькими рогообразными пластинами, образующими обыкновенно 3 про-

дольныхъ ряда. Роть беззубый, взамёнъ чего челюсти покрыты роговыми оболочками. Черенахи чрезвычайно живучи, особенно нечувствительны къ ранамъ и могутъ долго оставаться безъ пищи. Онё ростутъ и двигаются медленно, но очень долговечны и достигаютъ вёса до 20 пудовъ. Самки кладутъ большія яйца въ песокъ, и тутъ они выпложаются солнечною теплотой. Яйца и мясо черепахъ большею частію вкусны; ихъ пища состоитъ изъ улитокъ, червей, насёкомыхъ, мелкой рыбы; нёкоторыя питаются и растеніями. Водятся частью въ морё, частью въ рёкахъ, частью-же на сушё; обитаютъ преимущественно въ странахъ жаркихъ.

- а) Черепаха-великанъ (Chelonia Midas-La tortue de mer - Die Riesenschildkröte). Спинной щить состоить изъ 13 пластинь; она достигаеть длины въ 6-7 ф. и въса въ 20 пудовъ. Эта черенаха расхаживаетъ большими стаями по дну моря, питаясь морскими травами. Самка кладеть свои яйца на берегу, въ песокъ; изъ нихъ, послъ 20-25 дней, выходять д'втеныши, величиною не больше 5 дюймовъ въ длину, которые, спустя дней 8, отправляются въ море. Такъ какъ мясо и яйца этой черепахи весьма вкусны, то на нее охотятся преимущественно во время носки лицъ, когда она выходить стадами на берегь. Убивать ихъ тутъ не трудно. Отечество этихъ черенахъ подъ тропиками, особливо въ Америкъ.
- b) Земная черепаха (Testudo-La tortue de terre — Die Landschildkröte). Пальцы коротки, щить значительно выпуклый, голова и ноги могуть подъ нимъ укладываться. Водится на сухомъ пути и питается растеніями, насѣкомыми и червями. Щиты желтаго цвъта, съ чернымъ узоромъ. Весьма лѣнивое животное, и до такой степени живучее, что, лишенное головы, живеть еще 12 дней. Освоеннымъ оно держится въ садахъ. Въ концъ іюня земная черепаха кладеть 30-40 яйць, въ ямку, вырытую въ пескѣ, откуда къ концу сентября выходятъ молодыя, величиною въ оржхъ. Эта порода черенахъ встръчается по всъмъ прибрежьямъ Средиземнаго моря.
- c) Каретта (Ch. imbricata Le caret Die Karettschildkröte). Пластины спиннаго щита лежать другь на другѣ черепицеобраз-

но, весьма тонки и прозрачны, красивыхъ цвѣтовъ — красно-бураго и желтаго, въ мраморный узоръ, и представляютъ матеріалъ для извѣстныхъ черепаховыхъ издѣлій. Каретта меньше черепахи-великана и обитаетъ въ моряхъ жаркихъ странъ. Яйца вкусны, но мясо считается нездоровымъ.

d) Рфчная черепаха (Emys — La tortue d'eau douce — Die Flussschildkröte). Пальцы, явственно развитые, соединены плавательною перепонкою и снабжены острыми когтями. Спинной щить черновать, пластины его съ желтыми, лучеобразно-расположенными точками. Щить достигаеть величины 7—8 дюймовь и животное имфеть способность совершенно подъ него спрятаться. Эту черепаху находять въ рфкахь и прудахъ умфренной полосы Европы, напр. въ Германіи и на Дунаф.

РЫБЫ.

(Pisces - Poissons - Fische).

Рыбы имѣють красную, холодную кровь; легкихъ не имѣють и дышать жабрами.

Различіе формъ этого класса животныхълучше всего видно по рисункамъ. Шеи нътъ, тъло большею частью покрыто чешуею, у иныхъ же заключено въ костяной панцырь; совершенно обнаженныхъ немного. Вмѣсто всѣхъ членовъ, данныхъ животнымъ высшихъ классовъ, рыбы им'ть только плавательныя перья, служащія имъ орудіемъ для движенія; изъ органовъ чувствъ зам'ятны только глаза и ноздри: последнія въ виде простыхъ впадинъ. Слуховой органъ совмъщается съ мозгомъ въ одной полости. Языкъ обыкновенно неподвижный, большею частію хрящеватый, обтянутый твердою кожею или вооруженный зубами, а потому едвали можно его считать органомъ вкуса. Пищеварительные органы устроены какъ у высшихъ животныхъ. Ротъ, нёбо и языкъ обыкновенно снабжены зубами, служащими не для жеванія, а только для хватанія добычи. Самки имѣютъ въ себѣ два продолговатые кожанные м'вшка, наполняющіеся ко времени распложенія множествомъ яичекъ (икрой); у самцевъ подобные мѣшки заключають въ себѣ такъ - называемое молоко. Самка выдъляеть заразъ всю свою икру, которая пристаетъ къ камнямъ и водорослямъ, и тогда уже оплодотворяется молокомъ самца. Одна самка можеть произвести сотни тысячь, нѣкоторыя даже милліоны яиць.

обыкновенно, съ каждой стороны, изъ четырехъ

Жабры лежать позади головы и состоять

красныхъ листовъ, которые приводятся въ движение подъ прикрытиемъ твердаго округленнаго щита, могущаго закрывать все жаберное отверзтіе. Рыба забираеть воду ртомь, пропускаеть ее по жабернымъ листамъ, способнымъ подниматься, и выпускаеть ее потомъ изъ жабернаго отверзтія. Заключающійся въ водѣ воздухъ разлагается кровеносно-сосудною съткою жабръ, кислородъ принимается, и такимъ образомъ кровь делается снова годною для поддержанія жизненныхъ отправленій. На суш'в рыбы умирають не оть недостатка воздуха, а оттого, что жабры высыхають и кровь въ нихъ не можеть больше обращаться. За неимъніемъ легкихъ, рыбы не имъють и голоса. Значеніе свойственнаго рыбамъ плавательнаго пузыря еще не совстмъ приведено въ извъстность. Рыбій остовъ является не у всёхъ твердымъ тёломъ; у нёкоторыхъ онъ только хрящевать - твердветь, однако, въ старости и у посл'яднихъ. М'ястопребываніе рыбъ: моря, рѣки, озера и пруды; многія поднимаются изъ морей въ рѣки, для метанія икры. Он' большею частію прожорливы и шлотоядны, немногія питаются одними растеніями. Рыбы весьма важны въ экономическомъ отношеніи. Повсюду ихъ ѣдять; рыбная ловля у нѣкоторыхъ обитателей прибрежій и острововь составляеть главный промысель; цёлыя племена питаются исключительно рыбою. Почти всв виды рыбъ съв-

Ихъ раздѣляють на *хрящеватыя*, не имѣющія спинной и вообще твердой кости и рѣдко чешую, и на рыбы *костистыя*.

Хрящеватыя рыбы (Chondracanthi, Chondroplerygii — Cartilagineux -- Knorpelfische).

Акулы имѣють жаберныя отверзтія, снабженныя наружнымь покровомь; достигають длины въ 20—30 ф. У большей части акуль верхняя челюсть выдается впередъ надъ пастью, въ видѣ рыла. Икра мечется ими не за одинъ разъ, какъ это бываеть у другихъ животныхъ этой породы, а самки испускають отдѣльно большія, заключенныя въ роговую оболочку, яйца, изъ которыхъ молодые выходятъ черезъ нѣсколько времени, или же молодые прямо родятся живыми.

ТАБЛИЦА ІХ.

- а) Акула людовдъ ((Squalus carcharias—Le requin Der Riesenhai). О пяти жаберныхъ прорвахь съ каждой стороны. Твло продолговато и валообразно. Кожа шероховата, какъ терпугъ или напилокъ. Позади глазъ расположены водометныя скважины, а пастъ вооружена шестью рядами большихъ, острыхъ, пилообразныхъ зубовъ. Эта акула одинъ изъ самыхъ опасныхъ хищниковъ, потому что хватаетъ не только рыбъ, но и людей, почему и гонится за кораблями. Ловятъ акулу ради ея шкуры и печени; первая, по шероховатости и прочности своей, употребляется на обивку сундуковъ, а последняя даетъ превосходную ворвань.
- b) Куша молотокъ (S. Zygaena—Le marteau— Der Hammerfisch). Голова имѣетъ два боковыхъ удлиненія, по концамъ которыхъ расположены глаза. Эта, причудливо, на подобіе молотка созданная рыба достигаетъ 12 ф. длины, обрѣтается въ Средиземномъ морѣ и Атлантическомъ океанѣ, весьма прожорлива и нападаетъ даже на людей.
- с) Пилоносъ (S. pristis La scie Der Sägefisch). На продолжении верхней челюсти
 имъетъ жесткую полосу, вооруженную по
 объ стороны твердыми зубами. Пила служитъ этимъ акуламъ страшнымъ оружіемъ,
 посредствомъ котораго онъ, нападая даже
 на китовъ, распарываютъ имъ животъ.

ТАБЛИЦА Х.

Скатъ (Raja — La raie — Der Rochen).

Тѣло сплюснутое, щитообразное, окруженное плавательными перьями, почти до рыла. Глаза, ноздри, ротъ и жаберныя скважины находятся снизу. Хвостъ какъ будто вставленъ стеблемъ, а ротъ снабженъ зубами. Скаты держатся на днѣ морскомъ и питаются другими животными; вѣсъ ихъ доходитъ отъ 3 до 6 пудовъ. Мясо ихъ ѣдятъ, а изъ печени добывается ворвань. Икра коричневая, четырехугольно-плоская, съ заостренными углами.

- а) Скатъ щитковый, морской орелъ (R. aquila La raie bouclée Der Meeradler). Хвость объ одномъ плавательномъ перѣ, зубы бугорчатые. Встрѣчается преимущественно въ Средиземномъ морѣ и достигаетъ большихъ размѣровъ.
- b) Гнюсь (R. torpedo La torpille Der Zitterrochen). Гладкій, грязножелтый, въ пятнахъ.

- Эта рыба бываеть вѣсомь въ 15—20 фунтовь и замѣчательна удивительнымъ электрическимъ свойствомъ своимъ. Прикоснувшаяся къ нему рука на нѣкоторое время нѣмѣеть отъ электрическаго удара. Гнюсь водится на берегахъ Европы, именно въ Средиземномъ морѣ.
- c) Морской котъ колючехвостый (R. rubus La pastenague Der Dornrochen). Снабженъ кривыми колючками; встрѣчается въ сѣверныхъ моряхъ.

Минога (Petromyzon — La lamproie — Die Neunauge). Имѣеть на каждой сторонѣ шен по семи круглыхъ жаберныхъ отверзтій, хребтовая кость мягка, едва хрящевата. Роть похожъ на кровопускательную банку и снабженъ зубами. Миноги присасываются къ камнямъ и животнымъ; онѣ даже втачиваются въ тѣло большихъ рыбъ.

- d) Минога морская (Р. marimes La lamproie de mer — Die Lamprete). Во рту нѣсколько кругообразныхъ рядовъ зубовъ. Бываетъ 2 — З фут. длины, цвѣтъ ея по зеленому полю коричневый крапъ. Водится въ европейскихъ моряхъ, особенно въ Сѣверномъ; въ весеннее время заходитъ въ рѣки. Мясо очень лакомо, но неудобосваримо.
- е) Минога рѣчная (Р. fluviatilis—La lamproie des rivières Die Pricke). Роть съ однимь рядомь зубовь. На спинѣ два отдѣльныя спинныя плавательныя пера; длина не больше 12 15 дюйм.; спина черновата, бока желтоваты. Водится въ европейскихъ рѣкахъ и годится въ пищу только зимою.
- f) Минога ручейная (P. planeri—La lamproie des ruisseaux—Das Bauchneunauge). Длиною 8—10 дюйм.; спинныя плавательныя перья соединяются; встрѣчается и въ нашихъ рѣкахъ.
- g) Голецъ (Cobitis Le cobite Die Uhle, Der Kieferwurm). Сходенъ съ предъидущимъ, но водится болъе въ тинистыхъ ручьяхъ.

ТАБЛИЦА XI.

а) Пинагоръ (Cyclopterus lumpus — Le cycloptère — Der Seeball, Lump- oder Klumpfisch). Брюшныя плавательныя перья представляють чашеобразную пластину, посредствомъ которой эта рыба, подобно улиткѣ, присасывается къ камнямъ и другимъ предметамъ. Пинагоръ водится въ Балтійскомъ

- и Нѣмецкомъ моряхъ. Нѣсколько костливыхъ возвышеній придають его тѣлу почти угловатую форму.
- b) Лягва (Lophius piscatorius La lophie Der Seeteufel). Голова очень широка, сплюснута, сходна съ лягушечьею. Вся рыба кажется какъ-бы состоящею только изъ головы и хвоста; роть очень великъ, вверху снабженъ тремя, а внизу двумя рядами зубовъ; у нижней челюсти множество волосъ, образующихъ какъ-бы рѣдкую бороду. Цвѣтомъ сверху коричневая, снизу бѣловатая. Лягва водится въ Сѣверномъ и Средиземномъ моряхъ; длина ея отъ 2 до 6 фут. Въ пищу употребляется рѣдко.

Осетръ (Acipenser — L'esturgeon — Der Stör). Роть, небольшой и беззубый, расположень ближе къ нижней сторонѣ головы, рыло надъ нимъ выдается далеко впередъ. Осетры похожи на акуль, но тѣло ихъ покрыто рядами отдѣльныхъ рогообразныхъ щитовъ. Водятся въ моряхъ, заходять однакоже далеко въ рѣки, подобно лосо́сямъ. Они достигаютъ большихъ размѣровъ, вѣсъ ихъ доходитъ до 25 пуд. Мясо чрезвычайно вкусно, а икра, въ соленомъ видѣ—извѣстна; изъ большаго плавательнаго пузыря этой рыбы приготовляется извѣстный рыбій клей. Ловля осетра и торгъ его икрой и клеемъ составляютъ въ Россіи предметь обширнаго промысла.

- с) Осетръ нѣмецкій или штеръ (A. Sturio L'esturgeon ordinaire Der gemeine Stör). Кожа жесткая, по хребту нять рядовь пирамидальныхъ щитовъ. Эта рыба встрѣчается во всѣхъ европейскихъ моряхъ, весною заходить въ рѣки, для метанія икры. Мясо похоже на телятину; ѣдятъ его въ свѣжемъ, въ соленомъ и въ маринованномъ видѣ.
- d) Бѣлуга (А. Huso Le hurio, grand esturgeon Der Hausen). Кожа гладкая, съ рядами щитовъ, изъ коихъ боковые помельче. Бока синеваты, спина темная, а брюхо оѣловатое. Бѣлуга водится въ Черномъ, Каспійскомъ и Средиземномъ моряхъ, откуда заходить въ рѣки (по Волгѣ до Рыбинска). Бѣлуга достигаетъ длины до 24 фут. и вѣса до 70 пуд. Въ Россіи ловля оѣлуги составляетъ также весьма важную промышленность.
- e) Стерлядь (A. Ruthenus Le sterlet Der Sterlett). Длиною не больше 3-хъ фут., во-

дится особенно въ Каспійскомъ морѣ, но встрѣчается во всѣхъ большихъ рѣкахъ.

Кузовка (Ostracion—Le coffre—Der Kofferfisch). Туловище заключено въ твердую броню, изъ которой торчать, какъ подвижные члены, только хвость и плавательныя перья. Изображенный здёсь видь:

- f) Кузовка рогатая, морской быкъ (О. cornutus—L'ostracion cornu—Der Seestier). Вида почти четырехугольнаго; впереди глазъ и подъ хвостомъ по два длинныхъ жала. Бываетъ 8—10 дюйм. длины и водится вътеплыхъ моряхъ.
- g) Ежерыбъ (Diodon Le diodon Der Stachelbauch oder Igelfisch). Кругловатое тѣло обсажено жесткими колючками; имѣетъ способность, чрезъ вбираніе въ себя воздуха, раздуваться почти шарообразно, и дѣлаетъ это въ случаяхъ опасности, для своей защиты, причемъ колючки взъерошиваются. Водится въ моряхъ жаркихъ странъ и достигаетъ до 2 фут. длины.
- h) Четырезубецъ (Tetrodon Le tetrodon Der Seekröpfer). Брюхо такъ велико, что выдается впередъ, дальше рта. Голова коротка, и когда рыба надувается, то можно сказать, что она вся состоить изъ одного пуза. Водится въ Средиземномъ и Остъиндскомъ моряхъ.

ТАБЛИЦА ХИ.

- a) Златикъ лунный или королевская рыба (Diodon, Orthagoriscus Mola La lune de mer, la meule Der Mondfisch, Mühlsteinfisch). Сзади будто усъченный и окаймленный лентою. Бываеть въсомь въ нъсколько соть фунтовъ и ночью издаеть свътъ. Обрътается въ Средиземномъ моръ.
- b) Иглица острая (Syngnathus L'aiguille de mer Die Meernadel, Der Nadelfisch). Рыло оканчивается длинною иглою, подъ которою находится небольшой беззубый роть. Размноженіе этой рыбы происходить особенно-замѣчательнымъ образомъ, а именно: икра принимается самцомъ въ особые брюшные карманы, образуемые распуханіемъ кожи. Дѣтеныши и молодые, уже совершенно развившіеся, выходятъ при разрывѣ этихъ мѣшковъ.
- c) Конекъ (S. Hippocampus L'hippocampe ou cheval marin Das Seepferdchen). Тъло семигранное, покрытое мелкими горбиками;

- встрѣчается часто въ Средиземномъ морѣ. Покуда живъ тѣло остается вытянутымъ, но мертвое принимаетъ изгибъ буквы S.
- d) Пегаска драконова (Pegasus Draconis Le pégase — Der Seedrache). Отличается отъ предъидущаго расположеніемъ рта подъ далеко-выдающимся рыломъ, грудныя же плавательныя перья образуютъ большія крылья, а брюшныя — тонкія нити. Рыба эта бываетъ не больше 1 ½ ф. въ длину и встрѣчается въ остиндскихъ моряхъ.

Костистыя рыбы (Ossei—Poissons osseux— Knochen- oder Grätenfische).

A. Голобрюшныя (Apodies — Apodes — Kahlbäuche), вовсе неимъющія брюшныхъ плавательныхъ перьевъ.

- е) Гимнотъ или угорь электрическій (Gymnotus Le gymnote électrique Der Zitteraal). Тѣло угреобразное, заднее плавательное перо простирается до оконечности хвоста, верхняя челюсть нѣсколько длиннѣе нижней, цвѣтъ темно-красноватый, длина 4 6 ф. Замѣчательная рыба эта водится въ рѣкахъ и озерахъ южной Америки, и имѣетъ способность производить сильные электрическіе удары, такъ что иногда опасно изувѣчиваетъ вошедшихъ въ воду лошадей и людей.
- f) Угорь (Muraena anguilla L'anguille Der Aal). Тѣло валообразное, почти голое, со спинными и грудными плавательными перьями. Чешуя у него мелкая и совсѣмъ сросшаяся со слизистою кожею. Цвѣтъ темнозеленый, по бокамъ свѣтлѣе, на брюхѣ желтоватый или серебристый. Обыкновенная величина отъ 1 до 3 ф., но бываетъ и болѣе. Угорь водится въ большей части европейскихъ рѣкъ, питается насѣкомыми, червями и рыбьею икрою; выходитъ и на берегъ, на засѣянное горохомъ поле. Чрезвычайно живучъ. Мясо его вкусно, но тяжело для пищеваренія.
- g) Мурена (Gymnothorax muraena La murène Die Muräne). Имъетъ только одно спинное плавательное перо, цвътъ коричневый, желто-испещренный. Рыба эта водится въ Средиземномъ моръ, выростаетъ до 3-хъ и болъе фут. и очень прожорлива. Вкусное мясо ея считалось большимъ лакомствомъ у древнихъ римлянъ.
- h) Зубатка алчная (Anarchichas lupus Le loup marin Der Seewolf, Meerwolf). Тъло

- гладко и слизисто, роть широкъ и вооружень множествомъ зубовъ. Питается раками и слизняками. Достигаетъ отъ 5 до 7 ф. длины и обитаетъ въ Сѣверномъ морѣ; мясо ея употребляется какъ въ свѣжемъ, такъ и въ сушеномъ или соленомъ видахъ, а кожа служитъ жителямъ Исландіи на обувь.
- i) Саблянка или острорылъ обыкновенный (Xiphias gladius L'espadon Der Schwertfisch, Kaiserfisch). Спина фіолетовая, брюхо и бока бѣлые, тѣло веретенообразное, съ едва замѣтною чешуей, ротъ безъ зубовъ, но очень шероховатъ; верхняя челюсть оканчивается длиннымъ, мечеобразнымъ остріемъ, служащимъ для отсѣканія морскихъ растеній, которыми рыба эта большею частію питается. Водится въ Средиземномъ морѣ, но появляется иногда и въ Балтійскомъ. Достигаетъ до 20 фут. въ длину и 12 пуд. вѣсу. Мясо вкусно, а плавательныя перья, въ просоленномъ видѣ, считаются лакомствомъ.

ТАБЛИЦА ХШ.

- B. Горлоперыя рыбы (Jugulares Poissons jugulaires Halsflosser oder Kehlflosser).
- а) Верхоглядъ (Uranoscopus scaber L'uranoscope — Der Sternseher). Имветь бородавчатую, плоскую голову съ косымъ, кверху закривленнымъ ртомъ и кверху же обращенными глазами. Двв пары втяжныхъ жаль служать этой рыбѣ оружіемъ; тѣло сходится клиномъ. Водится также въ Средиземномъ морв, достигаетъ не болве 10-14 дюймовъ длины и годна въ пищу. Tpecka (Gadus—la morue—Der Schellfisch, Nutzfisch oder Stockfisch). По нъжности мяса, называется также мягкою рыбою. Брюшныя плавательныя перья узки и заострены; долговязое, округлое тёло покрыто легко-онадающею чешуею и заключается, вмъстъ съ плавательными перьями, въ одной общей кожѣ.
- b) Дортъ или мердузъ (G. merlucius—La morue commune, la merluche—der kleine oder gemeine Stockfisch). Похожъ на щуку, почему и называется морскою щукою. Нижняя челюсть больше верхней, на спинъ два плавательныхъ пера. Его ловятъ въ Средиземномъ и Съверномъ моряхъ; высушенный дортъ принимаетъ названіе трески.
- с) Лохъ, усатая треска (G. molva, barba-

- tus La molve, le tacaud Der Leng). Длиною до трехъ аршинъ, имѣетъ подбородочныя перья; верхняя челюсть длиннѣе нижней. Ловится и употребляется преимущественно въ Норвегіи, какъ обыкновенная треска.
- d) Треска настоящая (G. morrhua—Le cabliau — Der Kabeljau, grosse Stockfisch). Съ тремя спинными плавательными перьями и съ усами. Бываетъ отъ 2 до 3 ф. длины, въсить отъ 14 до 20 фунтовъ, но попадается и больше. Водится въ Съверномъ океанъ, между 40 и 75° съверной широты, въ неимовърномъ множествъ; ее ловятъ милліонами, но истощенія не предвидится, такъ какъ одна самка выпускаеть оть 4 до 9 милліоновъ зеренъ икры. Въ сушеномъ видъ рыба эта называется штокфишемъ, въ соленомъ — лабарданомъ, высушенная же послѣ соленія носить названіе мерлана (Klippfisch). Она составляетъ предметъ обширнаго промысла. Изъ ея печени приготовляется печеночная ворвань.
- e) Вахня, слоистая треска (G. Aeglefinus— L'aigrefin — Der Schellfisch). Спина бурая, брюхо и бока серебристы; также цѣнная рыба.
- f) Доршъ (G. gallarias Le dorche Der Dorsch). Боковая полоса широка, искривлена и въ крапины, голова и спина буры, бока серебристы. Попадается во множествъ въ Балтійскомъ и Съверномъ моряхъ и, по вкусу мяса, считается лучшимъ сортомъ трески.
- g) Мелкій доршъ (G. minutus -- La pétite morue Der Zwergdorsch). Менѣе ¹/₄ аршина, сверху желтовато-бурый. Появленіе его у береговъ предвѣщаетъ скорое прибытіе огромными стаями всѣхъ выше-упомянутыхъ видовъ трески.
- h) Налимъ обыкновенный (G. Lota La lotte Die Aalraupe, Rutte, Quappe, Aalputte auch Trusche). Съ двумя только спинными плавательными перьями; челюсти ровны; покрытое слизью тёло испещрено чернымъ крапомъ, по бурому, желтому и сёроватому полю; голова большая и плоская. Налимъ единственный, живущій въ прёсной водё видъ, изъ породы рыбъ, къ которой онъ принадлежитъ, распространенъ по всей Европё. Длина его отъ 2 до 3 ф., вёсъ отъ 10 до 12 фунтовъ.

Мясо вкусно, безъ костей и удобосваримо; ъъ особенности цѣнится печень.

ТАБЛИЦА XIV.

а) Живородка живородная (Blennius viviparus—Lablenne vivipare—Der Schleimfisch, die Groppe, Aalmutter). Бываеть часто въ полъ-аршина длины, съ трубчатыми ноздрями и скользка какъ угорь. Водится въ Балтійскомъ и Сѣверномъ моряхъ; мясо ея не цѣнится. Въ утробѣ находятъ до 300 живыхъ дѣтей.

C. Грудоперыя рыбы (Thoracici — Les thoraciques — Brustflosser)

- у которыхъ заднія или брюшныя плавательныя перья находятся спереди, на груди, прямо подъ передними или грудными плавательными перьями.
- b) Воронка, колбень (Gobius niger Le boutereau noir Die Meergrundel, Der Kühling). Желтоватый, съ черно-бурыми иятнами, держится на днё моря и питается червями и икрою. Мечетъ икру свою въ устьяхъ рёкъ. Мясо его вкусно.
- с) Прилипало (Echenëis L'echène Der Schiffhalter). Хвостовое плавательное перо съ дугообразною вырѣзкою. Спина черная, бока свѣтлѣе, голова покрыта особаго вида щитами, сдвигающимися подобно рѣшетчатымъ оконнымъ ставнямъ (жалюзи), съ помощью которыхъ рыба эта цѣпляется къ кораблямъ и акуламъ. Водится въ Средиземномъ морѣ и въ Атлантическомъ океанѣ и бываетъ длиною отъ 1 до 2 фут.; мясо не хорошо.
- d) Скорпена (Scorpena La scorpène Der Drachenkopf, Meerscorpion, Die Dornsau, Stachelsau). Голова окружена колючками, на спинъ только одно плавательное перо, грудныя же перья широки, а между ними, внизу, находится брюшное. Голова съ зазубренными нитями и страннаго вида. Водится въ Средиземномъ и Съверномъ моряхъ; длиною бываетъ болъе 3 футовъ. Мясо тощее и жесткое, однако съъдомо.
- e) Обыкновенная макрель (Scomber scomber Le maquereau Die Makrele). Сверху и снизу хвоста по пяти маленькихъ плавательныхъ перышекъ. Спина синяя, съ черными поперечными полосками, брюхо серебристое. Длина отъ 1 до 2 фут., а въсъ

оть 1 до 3 фунтовъ. Макрель водится стаями, по берегамъ Европы. Мясо вкусно, употребляется въ свѣжемъ и въ просоленномъ видахъ. Ловля макрели составляетъ значительный промыселъ прибрежнаго населенія. Хищность макрели опасна для сельдей.

- f) Тунецъ или тумакъ (S. thynus—Le thou— Der Thunfisch oder die Riesenmakrele). Kpom's главныхъ плавательныхъ перьевъ, на спинѣ и груди, имѣетъ сверху и снизу хвоста по 7 до 9-ти мелкихъ перышекъ. Спина стальнаго цвъта, бока серебристы, а грудныя плавательныя перья желтоваты. Обыкновенная длина отъ 1 до 2 фут., но бывають и 8-футовые тунцы, въсомъ до 12 пудовъ. Тунецъ, сильный хищникъ, водится въ Сѣверномъ, преимущественно же въ Средиземномъ и Черномъ моряхъ. На время метанія икры, въ мав и въ іюнв, тунцы собираются въ большія стаи и направляются къ берегамъ. Ловля ихъ на островъ Сициліи сопровождается особымъ празднествомъ и, вмъсть съ тъмъ, составляетъ значительный промысель. Для этой ловли употребляются большія стти, съ нісколькими отдъльными матнями. Красное мясо питательно и употребляется въ свѣжемъ и въ просоленномъ видахъ.
- g) Хахалча иглистая (Gasterosteus Le gasterastée Der Stichling). Вмѣсто перваго спиннаго плавательнаго пера торчать три колючки. Тѣло, серебристо-металлическаго блеска, до хвоста покрыто щитиками. На брюхѣ также имѣется одна колючка. Рыбка эта водится по всѣмъ рѣкамъ; колючки избавляють ее отъ нападенія хищныхъ рыбъ; гдѣ ее много, тамъ изъ нея добывають жиръ, а выжимками кормятъ утокъ и свиней.
- h) Анабасъ (Anabas scansor L'anabas Der Kletterfisch). Продолговатый, съ плоскою головой. Обрътается въ Остиндіи. Утверждають, что рыба эта лазаеть по кустарникамъ и деревьямъ.
- i) Рявца бычокъ (Cottus Le chabot Der Kaulkopf, Groppe, Rotzkolbe). Имѣетъ толстую голову, тѣло слизистое, покрытое мелкими бородавками, сверху бурое, снизу желтоватое; на спинѣ два плавательныхъ пера, а брюшныя находятся подъ грудными. Водится въ Европѣ, по чистымъ ручь-

ямъ; наибольшая длина его въ 7 дюймовъ; илаваетъ съ быстротою стрѣлы; мясо его превосходнаго вкуса и здорово.

Тригла (Trigla — La trigle — Der fliegende Seehahn). Грудныя плавательныя перья, состоя изъ лучей не соединенныхъ между собой кожею, уподобляются отдёльнымъ пальцамъ.

- k) Ластовица (Т. Gurnardus La trigle hirondelle — Der Knurrhahn). Голова въ костяной бронѣ, на спинѣ два плавательныхъ пера; водится въ Сѣверномъ и Балтійскомъ моряхъ, питается черепокожными, имѣетъ хорошее съѣдомое мясо.
- 1) Тригла летучая (Т. volitans La trigle volante Der fliegende Seehahn Seeschwalbe). Грудныя плавательныя перья красивыхь, зеленаго и синяго, цвётовь, длиною равняются длинё тёла, цвёть котораго оть головы фіолетовый, а къ хвосту розовый, снизу же серебристый. Встрёчается стаями въ моряхъ жаркихъ странъ. Оть преслёдованій хищныхъ рыбъ, на нёкоторое пространство, спасается полетомъ.

таблица ху.

- а) Блестунъ (Zeus faber La dorée poisson de St. Pierre Der St.-Petersfisch, Häringskönig, Sonnenfisch). Тѣло его плоское, округленное; первое спинное плавательное перо съ роговыми ребрами; цвѣтъ золотистый спинка темнѣе; лобъ заостренный и крутой, ротъ съ мелкими зубами. Блестунъ встрѣчается въ Сѣверномъ и Средиземномъ моряхъ, мясо его тѣмъ вкуснѣе, чѣмъ рыба больше.
- b) Камбала (Pleuronectes Le pleuronecte Die Scholle oder Butte). Страннаго вида рыба единственное изъ позвоночныхъ животныхъ, котораго тѣло сложено несимметрично: глаза находятся большею частію сверху, на правой сторонѣ, все тѣло сплющено, а если на камбалу смотрѣть съ головы, то по одну сторону видно спинное, а по другую заднее плавательное перо; задній проходъ находится близъ головы. Камбала сѣробураго цвѣта, съ оранжевыми пятнами.

Въ Балтійскомъ и Сѣверномъ моряхъ водится нѣсколько видовъ ея; у всѣхъ мясо превосходнаго вкуса; употребляется въ свѣжемъ и въ сушеномъ видахъ.

c) Флетанъ (P. hippoglossus – Le flétan — Die Heiligenbutte, Der Heilbutt). Хвость полумъ-

- сяцемъ, тѣло гладкое, боковая черта съ значительнымъ выгибомъ надъ груднымъ плавательнымъ перомъ. Достигаетъ вѣсу до 20 пудовъ.
- d) Окунь рѣчной (Perca fluviatilis La perche—Der Flussbarsch, Bürschling). Чешуя шероховата, голова голая, спинка желтая, съ зеленоватымъ отливомъ и черными по-перечинами, брюхо бѣлое, нижнія плавательныя перья красны. Окунь водится въ прѣсныхъ водахъ, по всей Европѣ; вѣсъ его отъ 2 до 4 фунт.; онъ чрезвычайно хищенъ и не щадитъ даже собственной своей породы. Мясо его вкусно и здорово.
- e) Судакъ (P. lucioperca Le sandre Das Amaul, Der Sander) зеленоватый, съ буроватыми поперечинами.
- f) Ершъ (Р. cernua La petite perche de rivière Der schwarzpunktirte Kaulbarsch, Der Schroll). Голова толстая, спина зеленоватая съ чернымъ крапомъ, бока желтоваты, брюхо бѣловатое; длина не больше 6 8 дюйм. Очень вкусенъ, но костлявъ, почему и употребляется преимущественно только на уху.
- g) Султанская рыба (Mullus, Surmuletus, Barbatus Le rouget Der Rothbart, Seebarbe). Подъ нижнею челюстью два толстыхъ уса, голова круго-закруглена, цвётъ красиво-розовый, у вида Surmuletus съ золотистыми полосами. Эта рыба водится по всёмъ берегамъ Европы, преимущественно въ Средиземномъ морѣ. Ея длина въ 1 футъ, мясо чрезвычайно вкусно и высоко цёнилось древними римлянами.
- h) Губанъ (Labrus Julius—Le poisson gourmand—Der Meerjunker). Рыбка длиною въ налецъ, съ выдвижными толстыми губами, по бокамъ туловища на синеватомъ полѣ двѣ оранжевыя ленты. Водится въ Средиземномъ морѣ и присасывается иногда къ ногамъ купающихся.
- D. Брюхоперыя рыбы (Abdominales—Poissons abdominaux—Bauchflosser).
- i) Толавль (Mugil cephalus Le mulet Die Meeräsche, Multe, Meeralant). Жаберная покрышка, какъ и все остальное тѣло, покрыта крупною чешуей. Водится въ Европейскихъ моряхъ и бываетъ длиною до 1 фута.

ТАБЛИЦА XVI.

- а) Голецъ настоящій (Cobitis barbatula La franche barbotte Die Schmerle, Bartgrundel). У рта 6 усиковъ, голова гладкая, тѣло валообразное, узорчатое, сверху сѣрое, снизу бѣловатое. Голецъ бываетъ только отъ 3 до 4 дюйм. длины и водится вездѣ въ чистыхъ ручьяхъ, по каменистому дну. Мясо этой довольно цѣнной рыбки весьма нѣжно и вкусно.
- b) Вьюнъ, пискарь (C. fossilis La loche d'étang Der Schlammpeizger). Имъетъ у рта 10 усиковъ, тъло черное, съ желтыми продольными полосами, брюхо оранжевое, съ чернымъ крапомъ. Бываетъ длиною отъ 10 12 дюймовъ; держится въ тинъ ръкъ и озеръ; мясо у него дрянное. Вьюнъ можетъ прожить цълые годы безъ всякой пищи.
- с) Подкамешникъ, малявка (С. taenia La loche — Die Dorngrundel, Steinschmerle). Имѣетъ подъ глазомъ вилообразное жало, вдоль по желтоватымъ бокамъ ряды черныхъ крапинъ; бываетъ длиною до 5 дюймовъ; мясо его жестко.
- d) Сомъ (Silurus Le silure Der Wels, Waller). У верхней челюсти два, у нижней четыре короткіе уса; голова, похожан на лягушечью, сплюснута; спина округленная, зеленовато-чернаго цвѣта; брюхо блѣднозеленое; все тѣло въ черныхъ пятнахъ. Сомъ бываетъ величиною въ человѣческій ростъ, вѣсомъ до 100 фунтовъ и болѣе, мясо у него бѣлое, жирное и сладковатое. Принадлежитъ къ вреднымъ хищникамъ.
- e) Долгоперъ (Exocoetus L'exocete, poisson volant Die Meerwachtel). Съ весьма длинными грудными плавательными перьями, величиною съ сельдя, встрѣчается большими стаями въ моряхъ теплыхъ странъ. Имѣетъ способность летать; мясо его вкусно.
- f) Сельдь (Clupea harengus Le hareng Der Häring). Голова небольшая, нижняя челюсть выдается, туловище съ боковъ силющено; съ серебристымъ блескомъ, спинка черновата. Длина сельдя 10 дюймовъ. Обитаетъ въ сѣверныхъ моряхъ Европы; выходя изъ глубины, частью весною, частью лѣтомъ и осенью, направляется къ берегамъ, для метанія икры. На ловлю сельдей отправляются цѣлые флоты и ежегодно ловится ихъ до 1,000 милліоновъ; еще болѣе этого становится добычею хищ-

- ныхъ рыбъ, преслѣдующихъ стаи сельдей. Сельди вообще солятся частью же, послѣ соленія, ихъ коптятъ. Голландцы наиболѣе искусны въ этомъ дѣлѣ, почему голландскія сельди и цѣнятся выше другихъ.
- g) Сардель или сардинка (С. Encrasicolus La sardine Die Sardelle 1). Верхняя челюсть выдается, тёло вытянутое, длиною въ иядю и шириною до 2-хъ дюймовъ серебристо. Рыба эта водится въ несмѣтномъ количествѣ въ Сѣверномъ и Средиземномъ моряхъ и разсылается, приготовленною особеннымъ образомъ, въ герметически-задѣланныхъ жестянкахъ.

Карпы (Cyprinus — Les carpes — Die Karpfen). Изъ множества видовъ карпей замѣчательны слѣдующіе:

- h) Обыкновенный карпъ (Cyprinus carpio La carpe commune - Der gemeine Karpfen). Роть совершенно беззубый, съ усиками; тѣло покрыто крупною, полосатою чешуей, спина темнозеленая, бока желтоватые, брюхо бѣлое. Карпы водятся въ южной Европѣ, откуда перевезли ихъ въ 1514 г. въ Англію, а въ 1560 г. въ Данію. Чёмъ далёе къ съверу, тъмъ карпъ становится мельче. Рѣчные карпы лучше озерныхъ, но лучше всёхъ тё, которые разводятся въ прудахъ съ проточною водою. Будучи перенесены въ текучую воду, озерные карпы теряютъ свойственный имъ затхлый вкусъ. Они очень живучи; вѣсъ ихъ бываеть оть 20 до 40 фунтовъ.
- i) Линъ (С. tinca—La tanche—Die Schleie). Съ короткими усиками; плавательныя перья толсты и непрозрачны, тъло продолговато и покрыто мелкою, сколзкою чешуей. Цвѣтъ бываетъ различенъ: сверху темнѣе, снизу переходитъ болѣе въ желтый, а плавательныя перья темно-фіолетовы. Линъ предпочитаетъ стоячую воду, бываетъ вѣсомъ въ 7 и 8 фунтовъ; мясо его мягко и вкусно. Красивое видоизмѣненіе лина представляетъ золотистымъ отливомъ и бѣловатыми, прозрачными плавательными перьями.

ТАБЛИЦА ХУП.

а) Чебакъ, лещь (С. brama — Le brème — Der Brachsen). Бываетъ очень широкъ и довольно толстъ, вѣсомъ отъ 12 до 20 фунт. и длиною до 3 ф.; чешуя его крупна,

- спина темнозелена, бока серебристы, хвостовое плавательное перо желтое; встрфчается преимущественно въ сѣверныхъ водахъ.
- b) Орфа или чебакъ золотистый (С. orfus— L'orfe — Der Orf). Оранжево-красный, съ серебристымъ брюхомъ; содержится въ прудахъ, для красы; мясо же его негодно.
- c) Карась (C. carassius La carassine Die Karausche, Gareisel). Длиною около пяди, но относительно очень широкъ. Рыба очень вкусная, но костлявая; водится вътинистой водъ.
- d) Плотица (С. erytrophthalmus Le gardon Die Plötze, Rothfeder). Имъетъ красныя плавательныя перья и ярко-оранжевые глаза.
- e) Плотва (С. rutilus—La sarve—Rothauge). Также съ красными плавательными перыями, но глаза блёдно-красны.
- f) Язь (C. idus L'Ide Der Kühling, Frauenfisch, Nerfling). Туловище толстое, брюхо и нижнее плавательное перо краснаго цвъта.
- g) Шерешперъ (С. Jeses Le meunier Der Alant, Göse, Gengling). Съ толстымъ округленнымъ рыломъ. Чешуя фіолетовая, съ голубоватою каемкою; плавательныя перья съры; мясо его вкусно.
- h) Голавль или голубель (С. dobula Le meulenard Der Hässling, Hasel, Aitl). Сверху темно оливковый, брюхо бѣлое, брюшныя плавательныя перья красны, съ желтою каемкой.

ТАБЛИЦА ХУШ.

- a) Чебакъ елецъ (С. leuciscis L'able Der Lauben, der Weissfisch). Туловище вытянутое, плавательныя перья сѣрыя; водится въ прѣсныхъ водахъ средней Европы.
- b) Подустъ (С. nasus Le nase Die Nase, Der Schnätzer). Спинка горбомъ, верхняя челюсть длиннѣе нижней; синеватъ, плавательныя перья блѣдно-красны; водится въ южной Германіи.
- c) Пискозобъ (C. phoxinus Le veron Die Ellritze, Pfrille). Тѣло валообразное, пестрое; жаберная крышка желтая, спина темно-синяя, брюхо бѣлое. Мясо этой красивой рыбки очень вкусно.
- d) Таранъ (C. vimba La vimbe Der Seerüssling, Die Zärthe). Верхняя челюсть вы-

- дающаяся, длина не больше фута, цвѣтъ дымчатый.
- e) Пискарь (C. amarus La bouvière Der Bitterling). Самая мелкая порода карпей, длиною въ 2 дюйма и шириной ¹/₂ дюйм., прозраченъ, вкуса горькаго, держится въ проточной водѣ.
- f) Колбень (С. Gobio Le goujon Der Gründling, Kressling). Длина 6 дюймовъ, тѣло похоже на щучье, но голова короче, плавательныя перья тѣлеснаго цвѣта съ чернымъ краномъ; водится въ рѣкахъ и озерахъ съ песчанымъ дномъ; мясо его вкусно.
- g) Усачь или миронъ (С. barbus Le barbeau Die Barbe). Съ четырьмя усиками у рта, верхняя челюсть выдающаяся, тёлосложеніемъ похожъ на щуку; спинка оливковая, бока свётлёе, плавательныя перья красноваты; питается преимущественно животными; держится въ быстрыхъ водахъ и достигаетъ до 15 фунтовъ вёсу; мясо вкусно.
- h) Калинка или уклейка (C. blicca L'ablette Der Güster). Грудныя и брюшныя плавательныя перья красны, остальныя сёры. Тёлосложеніемъ похожа на леща; мелкая рыбка эта водится повсюду.

Къ породъ карией принадлежатъ еще:

- i) Чебакъ золотой или золотая рыбка (С. auratus—La dorade de la Chine—Der chinesische Goldkarpfen). Водится въ водахъ Китая и Японіи и бываетъ прелестивищихъ цвётовъ. У насъ держатъ эту рыбку для красы въ фонтанахъ и въ стеклянныхъ сосудахъ, въ комнатъ.
- к) Лосось или семта (Salmo salar—Le saumon Der Salm oder Lachs). Верхняя челюсть нѣсколько выдается; имѣетъ зубы. Спинка черная, бока синеватые, брюхо серебристое, большею частію съ чернымъ крапомъ. У самца конецъ нижней челюсти загнутъ кверху, хрящеватымъ крюкомъ. Водится въ сѣверныхъ моряхъ и для метанія икры заходитъ стаями въ рѣки. Перезимовавъ въ морѣ, лосось на весну возвращается всегда въ одну и ту же рѣку. Питается мелкою рыбою и червями, бываетъ вѣсомъ отъ 25 до 50 фунтовъ, и даже болѣе; превосходное мясо его приготовляется впрокъ, разными способами.
- l) Форель крошица (S. fario—La truite Die Forelle). Бываетъ разныхъ цвѣтовъ: чѣмъ

холоднѣе вода, тѣмъ цвѣтъ форели темнѣе. Бока золотисты въ кранины. Плаваетъ чрезвычайно быстро, питается мелкою рыбою и насѣкомыми; мечетъ икру осенью. Изъ всѣхъ рѣчныхъ рыбъ у форели самое вкусное мясо.

ТАБЛИЦА XIX.

- а) Пеструшка лаксфорель (Salmo trutta La truite Die Lachsforelle). Свътло-фіолетовая, съ бурою спинкою и чернымъ крапомъ. Въсъ отъ 8 до 10 фунтовъ.
- b) Лосось красный (S. hucho—Le huch— Der Huchen). Спинка оливковая, бока желтые, брюхо блёдно-розовое, съ красноватымъ крапомъ; плавательныя перья и хвостъ съ чернымъ крапомъ. Голова болёе заострена, нежели у предъидущей; длина отъ 3 до 5 фут. Водится преимущественно въ Дунав и въ южныхъ его притокахъ. Вкуса превосходнаго.
- c) Лосось серебристый (S. lacustris, s. Schiefermülleri—Le saumon argenté—Der Silberlachs, Rheinanken). Спинка темная, бока свътло-синіе, брюхо серебристое; водится въ Боденскомъ, Хіемскомъ и въ нѣкоторыхъ другихъ озерахъ нижней Австріи; имѣетъ желтое, весьма вкусное мясо и бываетъ до 50 фунтовъ вѣсомъ.
- d) Форельчикъ блѣдный или сальвелинъ (S. salvelinus Der Salbling, geräuchert, Schwarzreuter). Спинка коричневая, бока синеватые, въ оранжевыхъ пятнахъ, съ бѣлыми окраинками; брюхо красное, съ желтымъ оттѣнкомъ; грудныя и брюшныя плавательныя перья красны; вкусъ превосходенъ.
- e) Харіусъ (S. thymallus—Le thymale—Die Aesche, Der Asch). Плавательныя перья желтоваты, съ красными стержнями; спинка темносиняя, бока и брюхо въ синія и бізлыя продольныя полосы. Водится во всіхъ боліве холодныхъ водахъ и очень вкусенъ.
- f) Сигъ (S. Wartmanni Le lavaret Die Renke, Das Blaufellchen). Спинка синеватая, брюхо серебристое, безъ пятенъ. Водится какъ въ соленыхъ, такъ и въ пръсныхъ водахъ. Употребляется свъжимъ, маринованнымъ и копченымъ; вкусенъ и удобоваримъ.
- g) Корюшка (S. eperlanus L'éperlan Der Stint). Серебристая мелкая рыба, съ зеленоватою спинкой, почти прозрачная, водится въ морѣ и при устьяхъ рѣкъ. Въ

кондѣ іюня и въ началѣ іюля употребленіе ея вредно, что приписывается питанію ея, въ это время, нѣкоторыми водорослями.

| A) Морской желудь, тюльпанчикъ, баланъ (Balanus tintinnabulum—Le balane ou gland de mer—Die Meereichel, Seetulpe). Имѣетъ

Примпчаніе. Особый, болье мелкій видь той же рыбы, сиятокь, водится въ огромномъ количествь по нашимь озерамъ, и, въ сушеномъ видь, составляеть значительный предметь торговли.

- h) Щука (Esoflucius Le brochet Der Hecht). Голова сплюснута, подобно утиному носу, пасть вся усажена острыми зубами; цвѣта бываеть различнаго: спина черновато-землистая, бока въ сѣрыхъ и желтыхъ пятнахъ, брюхо бѣлое, съ чернымъ крапомъ. Рыба эта выростаеть очень скоро одногодки, совершенно зеленаго цвѣта, бываютъ ужъ до 20 дюймовъ длины. Полный ростъ щуки доходитъ до 6 и даже 8 ф., а вѣсъ до 2 пудовъ. Щука жадный хищникъ, пожираеть не только рыбу, но и птицъ, лягушекъ и водяныхъ крысъ. Водится почти во всѣхъ прѣсныхъ водахъ Европы. Другая порода:
- i) Белона (E. belone—L'orphie—Der Hornfisch). Водится во всёхъ моряхъ; въ Средиземномъ ловять ее тысячами. Отличается особенною длиною рыла и зеленымъ цвётомъ костей.

ТАБЛИЦА ХХ.

Кистеногіе моллюски (Cirrhepedia — Les cirrhopodes — Ranken und Lockenfüssler). Составляють подраздёленіе черепокожихь, изображенныхъ на таблицё XXVII. Пом'єщаются здёсь по ихъ сходству съ раковинами.

Этотъ замвчательный разрядъ животныхъ занимаеть средину между членосуставчатыми животными и черепокожными, къ которымъ иногда причисляются подъ названіемъ многочерепных раковинь (Multivalves — Les multivalves - Vielschanlige Muscheln). Головы не им'вють, а только губы; по сторонамъ верхней, роговой губы находится родъ суставчатыхъ щупальцевъ, двѣ пары зазубренныхъ челюстей: нижняя губа кожиста. Вдоль суставчатаго тела отъ 10 до 12 наръ завитыхъ реснистыхъ рукъ. Известковый ихъ покровъ состоить большею частію изъ крѣнко-сроснихся кусковъ раковинъ. Приростають къ скаламъ и другимъ предметамъ своимъ покровомъ или особымъ кожистымъ стеблемъ. Сюда относятся:

- а) Морской желудь, тюльпанчикъ, баланъ (Balanus tintinnabulum—Le balane ou gland de mer—Die Meereichel, Seetulpe). Имѣетъ шесть, на подобіе лепестковъ тюльпана, кверху стоячихъ раковинныхъ щитовъ, приросшихъ къ нижней, полосатой и тонкой скорлупѣ. Животное выглядываетъ изъ верхняго отверзтія; нижнею стороною раковина приростаетъ къ скаламъ и къ днищамъ кораблей. Самые красивые водятся въ Индѣйскомъ морѣ.
- b) Китовая оспа (Coronula balaenaris La coronule Die Kroneneichel, Wallfischeichel). Сходствуеть съ предъидущимъ, но имѣетъ внутри раздѣленія, подобно маковой головкѣ. Встрѣчается въ жирѣ кита.
- с) Уткородка (Lepas anatifera L'anative Die Entenmuschel). Имѣетъ внизу кожистый стебель, которымъ прикрѣпляется, въ большомъ числѣ, ко дну моря и къ кораблямъ; у нее двѣ большихъ, широкихъ, и одна меньшая, узкая скорлупа.

Слизняки мягкотѣлыя и раковины (Mollusca, Helices, Testacea — Mollusques, nus et testacées — Mollusken, Weich- und Schaalenthiere).

Слизняки — животныя безпозвоночныя, съ мягкимъ теломъ, безъ суставовъ, съ неразветвленною нервною системою, но съ полными органами для питанія, кровообращенія и дыханія. Тѣло, безъ опредѣленной формы, состоитъ изъ мягкой массы; у половины этихъ животныхъ не достаеть даже головы и органовъ чувствъ; меньшая часть ихъ имъетъ члены, почему и движенія этихъ слизняковъ медленны. Тёло заключено въ мускулистую, слизистую оболочку. Наружный покровъ состоить изъ известковой раковины, объ одномъ или о двухъ затворахъ. Кровообращение полное, ибо кровь переходить изъ дыхательныхъ органовъ въ сердце, а отсюда, по тълу обратно, къ тъмъ же органамъ. Сердце бываеть простое или двойное, или же съ тремя раздёльными желудочками; кровь бёлая и холодная. Вдыхають воду жабрами, или воздухъ легочными полостями. Полъ раздъленъ или соединенъ въ одномъ животномъ, или же существуеть только женскій. Слизняки распространены по всему земному шару; водятся обыкновенно въ моръ, нъкоторые въ ръкахъ, озерахъ и прудахъ, иные же и на сушъ.

Раковины вообще (Conchæ — Les coquilles — Die Muscheln). Головы не имѣютъ, дышатъ жаберными развѣтвленіями и заключены въ двухстворчатую скорлупу; имѣютъ только два отверзтія: одно для питанія, другое для изверженія. Въ животѣ находится большая печень; ближе къ спинѣ расположено сердце, о двухъ полостяхъ, и два уха. Заднее отверзтіе служитъ для дыханія и удлинняется, у нѣкоторыхъ, въ видѣ двухъ трубокъ, чрезъ которыя вода втягивается и выбрасывается. Передняя, мясистая часть живота удлинняется, у многихъ, подобно загнутой ногѣ, посредствомъ которой эти животныя ползаютъ и втачиваются.

- d) Тридакна исполинская (Tridacna Gigas Le grand bénitier Die Riesenmuschel). Съ желобками и черепицеобразною чешуею, по сплошному покрову. Въсъ объихъ половинъ этой раковины, вмъстъ, достигаетъ 15 пудовъ. Во многихъ церквахъ Парижа такія раковины служатъ сосудами для святой воды.
- e) Гребнецъ большой (Pecten maximus—La peigne—Die Kamm-Muschel, Pilgermuschel).
- f) Сверлуша (Terebratula La térébratule Die Lochmuschel). Половинки неравной величины, выпуклы; выдающійся позвонокъ нижняго черепа имъетъ диру, для выпусканія мускула, которымъ сверлуша прикръпляется къ другимъ предметамъ.
- g) Устрица (Ostrea L'huitre Die Auster). Раковина эта, неправильнаго вида, но безъ зубцовъ, приростаєть къ подводнымъ скаламъ; она употребляется въ пищу.

(Ловля устрицъ составляетъ немаловажный промыселъ въ нѣкоторыхъ странахъ. Замѣтное истощеніе естественныхъ мѣсторожденій устрицъ заставило, въ новѣйшее время, обратиться къ искусственному ихъ разведенію).

- h) Позвонокъ Лазаревъ (Spondylus—L'huitre epineuse ou le claquet de Lazare—Die Lazarsklappe). Раковины иглистыя или шершавыя, съ двумя зубьями.
- і) Жемчужная матка (Mytilus margaritiferus—La mèr perle, la moule d'huitre perlière Die Perlmuttermuschel). Раковины полукруглыя, безъ зазубринъ, внутри красиво перламутровыя, около 8 дюймовъ въ поперечникъ. Раковины эти встръчаются преммущественно въ моряхъ Остъ-Индіи, Австраліи и Средней Америки и добываются водолазами, съ опасностію жизни. Находятъ ихъ однакоже и въ нъкоторыхъ ръкахъ средней Германіи. Наиболъе цънится

жемчугъ восточный, добываемый въ Остъ-Индіи.

ТАБЛИЦА ХХІ.

- а) Ноевъ ковчежекъ (Arca Noae L'arche de Noé Die Noah's-Arche). Раковины продолговаты, неравносторонны, створка представляетъ прямую линію со множествомъ мелкихъ зазубринъ; походитъ на корабликъ.
- b) Перистка (Pinna La pinne marine Die Steckmuschel, Schneckenmuschel). Раковина клинообразная, острымъ концомъ втыкается въ морской песокъ, а на верхнемъ, толстомъ концѣ лежитъ пукъ шелковистыхъ волосъ, изъ которыхъ въ Индіи выдѣлываютъ перчатки и чулки.
- c) Ракушка снѣдная (Mytilus edulis La moule Miesmuschel, Blaubart). Водится во всѣхъ моряхъ.
- d) Беззубикъ (Anodonta cygnea L'anodonte ou moule d'étangs Teichmuschel). Водится въ нашихъ озерахъ.
- е) Мія или разинка (Муа—La mye Klaffoder Malermuschel). Съ большою зазубриною при затворѣ раковинъ. Ее употребляютъ для храненія красокъ.
- f) Сердцевидка (Cardium La cardiacée Die Herzmuschel). Въ видѣ сердца, въ каждой половинкѣ по четыре зазубрины. Встрѣчается во всѣхъ моряхъ и во множествѣ чрезвычайно красивыхъ видоизмѣненій.
- g) Циклада (Cyclas cornea La cyclade Die Kreismuschel). Водится по канавамъ, въ тинѣ.
- h) Теллина (Tellina La telline Tellmuschel). Плоскія половинки ея представляють пестрый узорь, изъ концентрическихъ бѣлыхъ эллипсовъ, пересѣкаемыхъ красноватыми радіусами, по зеленому полю.
- Beнерка (Venus La venus Die Venusmuschel). Раковины кругловаты или овальны, имѣютъ подъ позвонкомъ затвора нѣсколько зубцовъ, ввидѣ колючекъ.
- k) Черенецъ (Solen Le manche de couteau ou solens Die Messerscheidenmuschel). Длинныя раковины ея походять на ножны и имѣють по концамъ широкія отверстія, изъкоторыхъ высовываются длинные хоботы.
- 1) Фолада (Pholas La pholade Die Dattelbohrmuschel). Главныя раковины не плотно смыкаются, им'ёютъ еще н'ёсколько мень-

иль, даже въ скалы; събдома.

m) Шашень корабельный (Teredo navalistaret — Der Schiffsbohrwurm). Подъ водою втачиваясь въ дерево береговыхъ построекъ и кораблей, покрываетъ гнъздо свое известковою корой. Этотъ шашень производить большія опустошенія въ портахъ Европы, куда завезенъ изъ Индійскаго моря. Для защиты отъ этихъ животныхъ корабли снизу общиваются мёдью.

ТАБЛИЦА ХХИ.

Улитка (Cochleae — Les escargots — Die Schnecken).

Улитки имѣютъ ясно-различимую голову съ втягивающимися щупальцами и маленькими глазами; органовъ движенія у нихъ нътъ; онъ или обнажены, или заключены въ раковину, большею частью скрученную; роть бываеть устроенъ для жеванія или, ввидѣ хобота, для сосанія. Морскія улитки дышать жабрами, земныя же или живущія въ прѣсной водѣ-легочными полостями. Полы раздълены или соединены въ одномъ животномъ. Для ползанія служить мясистый покровъ на животъ, или же имъются удлиненія, въ вид'я плавательныхъ перьевъ.

- а) Кегля (Conus La cône Kegelschnecke). Коническая; бываетъ очень красивыхъ цвътовъ, которые любителями очень дорого оплачиваются.
- b) Ужовка (Cyprea La porcelaine Porzellanschnecke). Раковина яйцеобразная, съ узкою продольною скважиной.
- с) Янка (Ovula moneta—La petite raphidie— Das Otternköpfchen). Употребляется для украшенія сбруи, а въ Африкѣ и Ость-Индіи служить разм'внною монетою, что однако неудобно, ибо милліонъ такихъ раковинъ считается только за 120 руб. сер.
- d) Mutpa (Mitra—La mitre—Bischofsmütze). Раковина коническая, бѣлая, съ ржавыми нятнами. Мясо этой улитки ядовито, а острымъ языкомъ своимъ она можетъ наносить мучительныя раны. Водится въ Индійскихъ моряхъ.
- e) Свитокъ (Voluta aethiopica La volute Die Kronenwalze). Очень большая съвдомая улитка; красновато - бурая раковина ея употребляется, въ Остъ-Индіи, вм'всто посуды.

- шихъ, побочныхъ щитовъ. Втачивается въ f) Діанино ушко (Strombus auris Dianae L'oreille de Diane — Das Dianenohr).
 - g) Крыловикъ (Strombus pugille—Le strombe — Die Fechtschnecke). Имветь хоботь, которымъ втачивается въ тѣло другихъ морскихъ животныхъ, даже въ черепокожныхъ.
 - h) Багрянка (Murex-Le murex ou rocher-Die Stachelschnecke). Раковина покрыта бородавками и колючками, большею частію буроватаго или дымчатаго цвътовъ. Изъ сока этихъ улитокъ древніе приготовляли багровую краску.
 - i) Тритонія (Tritonium tuba Tritonie Tritonshorn, Kinkhorn). Раковина гладкая, въ бурыхъ пятнахъ, скважины съ зазубринами. Отломивъ верхушку, можно въ нее трубить. Длина больше фута, мясо събдомо.
 - k) Шлемница (Cassis La cassidaire Helmschnecke). Похожа на ужовку, но задній конецъ ея шире усѣченъ.
 - Арфа (Harpa La harpe Die Harfe). Пузатая раковина съ широкою раструбою вверху и съ зубцами ввидъ коронки по краямъ извилинъ. Находится въ моряхъ объихъ Инлій.
 - m) Бочечка (Dolium — La tonne — Die Fassschnecke). Раковина тонкая, широко выпуклая съ кругловатыми обручиками.
 - n) Курганчикъ (Trochus La toupie ou trochus — Kräuselschnecke). Внизу, у послъдняго завитка очень широкъ, кверху заостренъ.
 - o) Кубарка (Turbo Le sabot ou turbot Die Mondschnecke). Багроваго цвъта, въ широкомъ конц'в разд'вляется на нівсколько вѣтвей, посреди которыхъ обнаруживается круглое отверзтіе.
 - р) Ребрушка (Scalaria Clathrus La fausse scalaire - Die gemeine Wendeltreppe). Бѣлая раковина съ множествомъ навивокъ. Скважина совершенно круглая. Этотъ видъ часто попадается въ Средиземномъ моръ.
 - q) Настоящая Ость индская ребрушка (Scalaria vera — La vraie Scalaire — Die ächte ostindische Wendeltreppe). Встръчается рѣже и навивки ея рѣзче отдѣлены, нежели у предъидущей.
 - r) Hерита (Nerita La nérite Schwimmschnecke). Маленькая раковинка, полушарнаго вида, съ большимъ дунообразнымъ от-

- верзтіемъ. Встрѣчается какъ въ моряхъ, такъ и въ рѣкахъ.
- s) Куколка (Pupa uva Le poupon Das Püppchen, Bienenkörbchen). Продолговатая, съ широкою навивкою и круглымъ отверзтіемъ.

Земная улитка (Helix — La hélice — Die Schnirkelschnecke). Самая извъстная у насъ порода, одинъ изъ видовъ коей:

t) Улитка травяная или садовая (Helix pomatia — La pomacie — Die Weinbergschnecke). Раковина желтовато-сёраго или сёровато-бёлаго цвёта. На зиму прячется, замыкая свою крышку. Употребляется въ нищу.

ТАБЛИЦА ХХІП.

- a) Улитка рощевая (H. nemoralis—La livrée —Die Busch- oder Gartenschnecke). Всёмъ извёстная, желтая съ коричневыми полосками, любимая игрушка дётей.
- b) Булимъ или алчникъ (Bulimus decollatus La bulime Vielfrassschnecke). Продолговатъ, верхушка будто отломана.
- c) Озерникъ прудовой (Limnaea stagnalis La limnée Sumpf- oder Teichschnecke). Раковина тонкая, вверху съ тонкимъ заостреніемъ, внизу съ широкимъ отверзтіемъ. Водится въ нашихъ стоячихъ водахъ.
- d) Катушка (Planorbus vortex—Le planorbe— Das Posthörnchen). Свита въ одной плоскости.
- e) Морское ушко (Halyotis L'haliotide ou oreille de mer Das Seeohr). Раковина ухообразная, имѣетъ продольный рядъ отверзтій; на внутренней поверхности играетъ прелестнѣйшими радужными цвѣтами.
- f) Блюдечко (Patella La patelle Die Napfschnecke). Раковина эта встрѣчается часто по всѣмъ морямъ, ползающею по скаламъ или къ нимъ приросшею.
- g) Улитка жукъ (Chiton L'aveline Die Käferschnecke). Овальная, полая, похожая на суставчатое тъло жука.

Голые слизни безъ раковинъ (Limaces — Limaçons, sans coquilles — Nackte Schnecken ohne Schaale).

h) Слизень (Limax — La limace — Die Erdschnecke). Отдёляеть много слизи. Посредствомъ рта, им'вющаго роговую верхнюю челюсть, улитка эта проворно грызеть

- листья и плоды, нанося этимъ большой вредъ садамъ, огородамъ и полямъ.
- i) Зайка или морской заяцъ (Aplysia L'aplysia ou le lièvre de mer Der Seehase). Голова съ четырьмя щупальцами, изъ нихъ 2 большія, ввидѣ ушей. Водится въ морѣ.

Крылоногіе (Alipedes — Les ptéropodes — Die Flügelfüssler. Настоящей головы не имбють, но съ крыльями, на подобіе плавательныхъ перьевъ. Сюда принадлежать:

k) Кліонъ или шиловатка (Clio borealis — Le clios — Das Wallfischaas). Тѣло обнаженное, часто съ 2 плавательными перьями; водится въ несмѣтномъ количествѣ въ сѣверныхъ моряхъ и составляетъ обыкновенную пищу китовъ.

Тлавоногіе моллюски или чернильныя рыбы (Cephalopodes — Les céphalopodes ou poissons à encre—Die Kopffüssler oder Tintenfische). Имѣють ясно-видимую голову, съ глазами, а между ними роть, вокругь котораго расположены длинныя щупальцы (ноги), снабженныя множествомъ сосцовъ, посредствомъ которыхъ животныя присасываются къ своей добычѣ.

У большей части имѣется такъ - называемый чернильный мѣшокъ, отдѣляющій коричневую жидкость, и посредствомъ которой животное это мутить воду, когда чуеть опасность. Жидкость эта въ живописи извѣстна подъ названіемъ сепіи. Чернильныя рыбы водятся только въ морѣ; щупальцы служать имъ для хватанія, ходьбы и плаванія, при чемъ голова обращена книзу, а тѣло кверху. Онѣ чрезвычайно хищны, обжорливы и жестоки. Утверждаютъ, что на большихъ глубинахъ въ морѣ эти животныя водятся громадной величины. Сюда принадлежать:

- Корабликъ (Nautilus Le nautile Das Schiffsboot). Живетъ въ красивой раковинѣ, со многими внутренними отдѣленіями. Животное это имѣетъ 20 паръ полыхъ щупальцевъ. Водится въ Индійскихъ моряхъ.
- m) Ботикъ корабельный (Argonauta L'argonaute Das Papierboot). Эта чернильная рыба им'веть 8 щупальцевъ, живетъ въ тонкой, полой, улиткообразно-навитой раковин'в, которою пользуется какъ лодкою, поднимая два растяжимыя щупальца кверху, въ вид'в парусовъ, и гребя остальными, какъ бы веслами. Въ тихую погоду видны бываютъ ц'елыя стаи такихъ

искусныхъ мореплавателей. Съ приближеніемъ бури, или другой опасности, животное складываетъ паруса и весла свои и погружается.

п) Каракатица (Sepia — Le sèche — Der Tintenfisch). Покровъ ея съ длинными плавунами, на спинѣ большая продолговатая известковая пластина, которая, въ порошкѣ, подъ названіемъ Оз Sepiæ, служитъ для полированія, для чищенія зубовъ и т. д.

ТАБЛИЦА ХХІУ.

Hасъкомыя (Insecta — Insectes — Insecten).

Насѣкомыя — безпозвоночныя, суставчатыя животныя, съ колѣнчатыми ногами и нервными узлами и съ особыми дыхательными каналами.

Тело обыкновенно заключено въ жесткую, рѣже въ мягкую кожу, и состоить изъ головы, груди и тыльной части. Голова съ простыми или сложными глазами (последніе состоять изъ множества выпуклыхъ шестиугольныхъ щитиковъ); имфетъ щупальцы и ротъ, состоящій изъ верхней губы, двухъ верхнихъ и двухъ нижнихъ челюстей, языка и нижней губы. Грудина состоить изъ трехъ частей, у каждой части по одной пар'в ногъ; у грудины же находятся и крылья. Задняя часть тьла обыкновенно кольчатая. Лыхательный организмъ состоитъ изъ трубочекъ, которыя, простираясь по объимъ бокамъ и раздъляясь постепенно на болъе тонкія вътви, сообщаются со всѣми органами. Система кровеносныхъ сосудовъ хотя мало развита, потому что оживляющій воздухъ имфеть свободный доступь по трубочкамъ ко всёмъ частямъ, но тёмъ не менъе ихъ холодная, бъловатая кровь имъетъ обращение, посредствомъ такъ называемаго спиннаго сосуда, состоящаго изъ нъсколькихъ полостей, соединенныхъ между собою клапанами.

Нервная система состоить изъ суставчатаго желудочнаго узла. Полы раздёлены и самки частью рожають живыхъ дётей, частью кладутъ яйца, въ небольшомъ числё (нёкоторыя же однако и въ огромномъ, такъ напр. оса до—50,000, а ичелиная матка отъ 40—50,000).

Замѣчательны превращенія, которымъ подвержена большая часть насѣкомыхъ. Немногія выходять изъ яйца вполнѣ образовавшимися; у нѣкоторыхъ первоначальный видъ червеобразный и называется личинкою, у бабочекъ гусеницею; безногія личинки именуются червячками. Личинки измѣняются нѣсколько разъ и выростають скоро; въ этомъ видѣ остаются онѣ болѣе или менѣе продолжительно, пока не превратятся въ куколку, для которой онѣ же сами готовять особую ячейку, какъ-бы гробикъ. По истеченіи извѣстнаго времени куколочный покровъ разрывается и совершеннообразовавшееся насѣкомое выходить для новаго бытія. Уже древніе видѣли въ этомъ превращеніи символь безсмертія души. Столь же замѣчательно, какъ и превращенія насѣкомыхъ, является у нѣкоторыхъ врожденная смышленость и искусство.

Обыкновенное подраздѣленіе насѣкомыхъ:

І. Жесткокрылыя насѣкомыя или жуки (Coleoptera — Coleoptéres, scarabées — Käfer). Имѣютъ кусательныя части рта, 6 ногъ и 4 крыла, изъ коихъ верхнія образуютъ роговые покровы, нижнія же кожисты и, въ состояніи покоя, складываются поперегъ. Жуки подвержены совершенному превращенію. Личинки, какъ и развитые жуки, питаются животными и растительными веществами. Куколка неподвижна, но обнаруживаетъ уже всѣ части животнаго въ развитомъ состояніи.

Съ лѣвой стороны.

- а) Дублякъ, рогоносъ (Geotrupes, nasicornis Le scarabé nasicorne Der Nashornkäfer). Каштановаго цвѣта, съ загнутымъ назадъ рогомъ на головномъ щитикѣ. Водится въ средней полосѣ Европы.
- b) Дублякъ навозный (Scarabeus stercararius—La stercoraire—Der Rosskäfer). Синевато-черный. Встрѣчается часто у конскаго навоза.
- с) Коприсъ (Copris lunaria Le scarabé lunaire — Der Mondhornkäfer). Является и въ коровьемъ навозѣ; красивый жукъ съ довольно-большимъ рогомъ на лункообразномъ головномъ щитикѣ; почти одинаковой величины съ предъидущимъ.
- d) Большая пилюлянка (Ateuchus sacer Le grand pilulaire Der grosse Pillenkäfer). Головной щить о 6 зубцахъ.
- e) Афодій (Aphodius Le bédau Der kleine Mistkäfer). Тёло овальное, обыкновенно не больше яблочнаго сёмяни, краснаго и чернаго цвётовъ.
- f) Хрущъ (Melolonthe vulgaris Le hanneton ou melolontha Der Maikäfer). Въ состояніи личинки, въ теченіи четырехъ лѣтъ, обгрызаетъ корни растеній, превращается потомъ

- въ куколку и выходить на нятомъ году изъ вемли, вполнъ развитымъ жукомъ.
- g) Хрущъ сосновый (М. fullo Le foulon Der Walker). Большая порода хрущовъ, съ красивыми, бурыми и бъловато - испещренными крыльями; объъдаетъ вершины тополей и дубовъ; летая высоко, ръдко ловится.
- h) Ketoнiя (Cetonia aurata—Le scarabé doré— Der Goldkäfer). Зеленый, съ золотистымъ отливомъ. Въ состояніи личинки живеть по муравейникамъ; вредить особенно розамъ.
- i) Туръ рогачъ (Lucanus cervus Le lucane ou cerf volant — Hirschkäfer). Весьма красивый, темнобурый или черноватый-жукъ. Самецъ имъетъ рога́, похожіе на оленьи, которыми крѣпко щиплетъ.
- j) Сосновый типографщикъ (Bostrichus typographus — Der Fichtenkäfer). Съ зазубренными надкрыльями и крѣпкими, клинообразными щупальцами. Онъ величиною едва съ пшеничное зерно, но въ состояніи личинки, подъ корою деревъ, причиняетъ лѣсу огромный вредъ.
- к) Могильщикъ (Necrophorus vespillio Le nécrophore ou enterreur Der Todtengräber). Замѣчательный жукъ. Онъ хоронитъ мертвыхъ животныхъ, напр. мышей или кротовъ, а самка кладетъ свои яица въ мясо похороненныхъ. Изъ яицъ являются красивыя, нестрыя личинки, которыя уже черезъ 6 дней превращаются въ жуковъ.
- 1) Жужелица золотая (Carabus auratus—Le carabus doré Der Goldläufer). Надкрылья красиваго, золотисто-зеленаго цвѣта; полезенъ истребленіемъ множества вредныхъ червей и насѣкомыхъ. (У всѣхъ описанныхъ до сихъ поръ жуковъ щупальцы перистыя, листоватыя или булавовидныя).
- m) Красотѣлъ пахучій (Calosoma sycophanta—Le calosome—Der Schönleib oder Spürkäfer). Надкрылья зеленыя, съ металлическимъ отблескомъ; умерщвляетъ вредныхъ насѣкомыхъ, въ особенности гусеницъ, но рѣдко встрѣчается.
- n) Скакунъ (Cicindela Le cicindelle Der Sandläufer). Встръчается почти вездѣ, на песчаныхъ мъстахъ; бъгаетъ скоро, а полетъ его еще быстръе.
- o) Хрущакъ мучной (Tenebrio Molitor Le tenebrion Der Mehlkäfer). Продолговать,

- темнаго цвѣта; въ состояніи личинки извѣстенъ подъ названіемъ мучнаго червяка.
- p) Водолюбъ (Hydrophilus L'hydrophile Der Wasserkäfer). Ровнаго чернобураго цвѣта, гладокъ; щупальцы булавовидныя.
- q) Щелкунъ (Elater—Le scarabé à ressort— Der Springkäfer). Положенный на спину, подскакиваеть и становится на ноги.
- r) Долгоносикъ (Curculio Le scarabé à trompe Der Rüsselkäfer). Зеленый, имъ́етъ впереди длинный хоботъ. Вредитъ хлъ́бамъ.
- s) Древоточецъ, сверлило упрямое (Anobium—L'horloge de la mort—Die Todtenuhr). Этотъ видъ жуковъ, какъ и нѣкоторые другіе, въ состояніи личинки прогрызаетъ дерево, книги и т. п., при чемъ, сильно ударяя въ дерево, производитъ звукъ, похожій на стучаніе часоваго маятника.
- t) Ивановъ червячокъ, свѣтлякъ (Lampyris noctiluca Le lampyre Das Johannis-würmchen). Мягкая задняя оконечность тѣла, у самца, издаетъ ночью свѣтъ. Самка безъ крыльевъ.
- u) Шпанская муха (Lytta vesicatoria La cantharide vèsicante ou mouche d'Espagne Pflasterkäfer, die spanische Fliege). Длинное тёло красиво-зеленаго цвёта, съ металлическимъ блескомъ. Жукъ этотъ содержитъ острое, возбуждающее и даже ядовитое вещество, употребляемое для приготовленія пластыря, называемаго шпанской мушкой.
- v) Майка черная или обыкновенная (Meloë proscarabaeus Le proscarabé Der Maiwurm, Oelkäfer). Черносиній, съ металлическимъ блескомъ; надкрылья коротки и совершенно мягки. Щупальцы составлены изъкруглыхъ суставовъ.
- w) Усачъ (Lamia aedilis—Le capricorne—Der Langhorn- oder Widderkäfer). Сърый, щу- пальцы втрое длиннъе самаго насъкомаго.
- x) Пилогрудка кожевенная (Prionus coriaceus Le prionien Der grosse Holzkäfer). Темно-каштановый, съ тремя зубцами по краямъ груднаго щита, щупальцы пилообразно зазубрены; водится въ лиственныхъ лѣсахъ.
- у) Крикуша или коровка красная или лилейная (Lema — Le scarabé de lis — Der Lilienkäfer). Багроваго цвѣта, голова черная. Попадается между листьями лилій, ландыша и ириса (радужника); взятый въ руку громко пищить.
- г) Коровка семиточечная или Божья ко-

ровка (Coccinella septempunctata — La coccinelle ou bête à Dieu — Das Sonnenkäferlein). Полуяйцевидная, съ 7-ю черными точками на красныхъ надкрыльяхъ. Личинка ея истребляетъ множество вредныхъ лиственныхъ вшей.

II. Прямокрылыя насѣкомыя (Orthoptera — Les Orthoptères — Geradflügler).

Имѣютъ 6 ногъ, а у рта кусательныя части; надкрылья мягки, кожисты и въ жилкахъ, подкрылья же прямыя и сложены поперегъ. Они не подвержены полному превращенію, а у молодаго животнаго недостаетъ только крыльевъ, которыя выростаютъ мало по малу.

Съ правой стороны.

- а) Клещица (Forficula Le forficule ou perce-oreille—Das Ohrwürmchen). Съ двумя клещами у хвоста. Водится большею частію въ древесной корѣ и въ старомъ деревѣ; са́мка покрываетъ свои яйца, какъ бы высиживая ихъ, и такимъ же образомъ охраняетъ еще нѣжныхъ дѣтенышей своихъ.
- b) Тараканъ (Blatta—La blatte—Die Schabe). Бурый, надкрылья длинны, голова прикрыта грудными щитами. Тараканы извѣстны, какъ прожорливые чужеядники, пожирающіе не только муку, хлѣбъ и другіе съѣстные припасы, но грызущіе даже кожу и шерстяныя ткани.
- c) Богомолъ или мантисъ умоляющій (Mantis religiosa—La mante—Das wandelnde Blatt). Похожъ на кузнечика, но держитъ голову, съ большими глазами, всегда кверху. Кровожадныя животныя эти пожираютъ другъ друга.
- d) Кузнечикъ зеленый (Locusta viridissima— La sauterelle—Die Säbelheuschrecke). Зеленый, щупальцы очень длинны; самка имъетъ длинную, искривленную ввидъ сабли трубку, для клади яицъ. При помощи длинныхъ ногъ своихъ кузнечикъ дълаетъ больше прыжки.
- e) Медвѣдка обыкновенная (Gryllotalpa vulgaris La courtilière ou taupe-grillon Die Werre, Maulwurfsgrille). Переднія ноги похожи на руки, заднія короче; передними ногами она, подобно кроту, вырываеть себѣ норы. Подъѣдая корни травь, очень вредить лугамъ, на которыхъ преимущественно водится.
- f) Сверчокъ домашній (Acheta domestica— Le cricri—Die Hausgrille, Das Heimchen). Блёдно-желтый, съ длинными щупальцами у

- кругловатой головы. Водится общественно въ домахъ, по теплымъ уголкамъ. По ночамъ, отыскивая себъ пищу, издаетъ громкое чириканіе.
- g) Сверчокъ полевой (A. campestris Le grillon Die Feldgrille). Чернобурый. Въ жаркое время года, сидя на солнцѣ у своихъ норокъ, весь день чирикаетъ.
- h) Акридка странствующая, шрикъ саранча (Acridium migratorium—L'acridie Die Wanderheuschrecke). Надкрылья сфроваты или въ бурыхъ и черныхъ пятнахъ; крылья зелены и безъ пятенъ. Видъ этотъ водится на востокъ и въ Африкъ, изръдка же появляется и у насъ. Саранча величайшій бичъ тъхъ странъ, гдъ иногда появляется въ такомъ страшномъ количествъ, что тучи ея помрачаютъ день. Гдъ саранча опускается, тамъ она истребляетъ всякую растительность.
- i) Шрикъ трескучій (A. stridulum Le criquet Die Schnarrheuschrecke). Крылья красныя, съ черными жилками; встрѣчается часто и у насъ, подъ осень, по опушкамъ лѣса.

III. Сѣтчатокрылыя насѣкомыя (Neuroptera — Les Néroptères — Netzflügler).

Имѣютъ 6 ногъ, ротъ съ кусательными органами, и 4 обнаженныхъ, кожистыхъ крыла, и сѣтчатыми жилками. Однѣ изъ нихъ подвержены полному, другія же неполному превращенію. Большая часть изъ нихъ, въ первые неріоды превращенія, держится въ водѣ; окрыленное же насѣкомое живетъ на сушѣ.

- j) Стрекоза (Libellula—La libellule ou démoiselle — Die Wasserjungfer). Задняя часть тѣла длинная, тонкая, оканчивается щипчиками. Длинныя крылья красиво-узорчаты, блестящи и стекловато-прозрачны. Летаетъ быстро и питается другими насѣкомыми, которыхъ ловитъ на лету.
- к) Поденка (Ephemera L'éphémère Das Haft, Tagthierchen, Uferaas). Съ трехъколѣнчатыми щупальцами и двумя или тремя щетининами, образующими хвостъ. Личинка живетъ нѣсколько лѣтъ, въ тинѣ или въ водѣ, и милліонами выходитъ крылатымъ насѣкомымъ, которое умираетъ, спустя нѣсколько часовъ.
- Веснянки (Phryganeæ—Les friganes Die Frühlingsfliegen). Встрѣчаемые на нашихъ озерахъ и прудахъ виды этого насѣкомаго

представляются какъ-бы въ состояніи, не 3) Солдаты (Les so'dat — Die Soldaten). Совполн'в еще развитомъ.

- m) Крепка вонючая (Hemerobius perla— La mouche puante — Die Florfliege, Stinkfliege). Зеленая, довольно красивая, но пахнетъ человъческимъ пометомъ. Личинка питается лиственными вшами.
- n) Мурашанъ (Myrmeleon Le myrmeléon Die Ameisenjungfer). Похожъ на стрекозу, но не такъ проворенъ; подверженъ полному превращенію. Извъстная подъ названіемъ муравьева личинка его искусно ловитъ муравьевъ, вырывая въ мелкомъ пескъ воронку. Подойдя къ краю ямки, муравей обрушивается вмъстъ съ пескомъ и старается вылъзть, но въ это время хищникъ-забрасываетъ муравья пескомъ до тъхъ поръ, пока тотъ не упадетъ на дно воронки, гдъ мурашанъ обхватываетъ жертву своими клещеобразными челюстями и высасываетъ.
- o) Панорна или муха-скорніонъ (Panorpa— La mouche scorpion ou la panorpe — Die Scorpionfliege). Имѣетъ названіе свое отъ того, что у самца на хвостѣ находится наростъ, подобный клешнѣ скорпіона.
- p) Велблюдка (Raphidia La raphidie Die Langhalsjungfer). Отличается продолговатою грудинкою.
- q) Бѣлый муравей или термитъ (Termes— La termitée ou fourmi blanche—Die weisse Ameise oder die Termite). Крылья длинны, съ немногими жилками. Это замѣчательное насѣкомое водится въ жаркихъ странахъ, гдѣ, еще въ состояніи личинки, производитъ страшныя опустошенія въ лѣсѣ. Бѣлые муравьи истачиваютъ бревна и столярныя издѣлія, легко протачиваются въ сундуки и ящики и разрушаютъ все, что только могутъ угрызть.

Животныя эти, подобно обыкновеннымъ муравьямъ, водится большими обществами, въ которыхъ различаютъ три вида существъ:

- 1) Личинки или работники (Larva Les larves ou termites ouvrières Die Larven oder Arbeiter). Многочисленнъйшая часть, которая строить жилища и кормить молодыхъ.
- 2) Нимфы (Nymphae Les nymphes Die Nymphen). Изслѣдованы лишь недавно, отличаются своими зачатками крыльевъ; въдѣятельности своей повидимому одинаковы съ личинками.

3) Солдаты (Les soldat — Die Soldaten). Составляють только сотую часть, но больше ростомь и снабжены сильнѣйшими челюстями; ихъ дѣло — защита жилищъ. Кромѣ того, встрѣчаются еще четыре или пять видовъ самца или са́мки, которыхъ въ каждой колоніи бываетъ только по одной нарѣ.

Замвчательны гивзда термить, сдвланныя изъ одной земли. Высота ихъ до 12 футъ; состроенныя кучами, онъ издали кажутся какъ будто селенія дикихъ обитателей страны. Строеніе покрыто сводчатымъ куполомъ, но только нижняя часть его обитаема. Здёсь находятся жилища матокъ и молодыхъ, склады принасовъ и безчисленные ходы. Остроумное устройство этихъ жилищъ сдѣлало бы честь и человъческому разуму; всъ же эти, въ отношеніи къ строителямъ, исполинскія работы производятся насѣкомыми, ростомъ едва въ 1/4 дюйма и притомъ въ продолжении не болже 3 до 4 леть. Единственная въ каждой куче матка или королева исключительно кладеть яйца, при чемъ задняя ея часть распухаеть до 3 дюймовъ длины (см. изображение q). Безпрерывно кладя яйца, она производить ихъ до 60 въ минуту, а въ сутки болѣе 80,000.

Нѣкоторыя племена дикихъ употребляютъ термитъ въ пищу.

ТАБЛИЦА ХХУ.

IV. Плевистокрылыя или жильнокрылыя насѣкомыя (Piazata, hyzmenoptera—Les hymenoptères—Die bienen- und wespenartigen Insecten).

Имѣють четыре кожистыхъ крыла, большею частію, по бокамъ головы, два большихъ глаза, состоящихъ изъ множества ячеекъ, и еще по ияти малыхъ, простыхъ глазъ на лбу, сильныя зубатыя челюсти и жало, которымъ могутъ больно уязвлять.

Съ лѣвой стороны.

а) Галлица (Супіря — Le cyпіря — Die Gallwespe). Са́мка высверливаеть въ растеніяхь углубленіе, въ которое кладеть одно или нѣсколько яиць. У этой раны растеніе отдѣляеть обильные соки, изъ которыхъ образуются наросты разныхъ формъ, извѣстные подъ названіемъ чернильныхъ орѣшковъ. Тѣ изъ нихъ, которые служать для приготовленія черниль, берутся съ особенной породы дуба, произрастающей въ Малой Азіи и въ Остъ-Индіи. Галлица

просверливаеть не только дубовый листь, но и вѣтки розоваго дерева, при чемъ образуется такъ называемый ложный шиповникъ.

Другой видъ галлицъ кладетъ свои яйца въ илоды смоковницы или фиговаго дерева, отчего илоды эти не только бываютъ больше и вкуснѣе, но и скорѣе созрѣваютъ.

- b) Хризида, блестякъ (Chrysis La chrysis Die Goldwespe). Чудныхъ металлическихъ цвѣтовъ. Кладетъ свои яйца въгнѣзда шершней и другихъ пчелъ, высматривая для этого удобную минуту, когда самка оставляетъ ячейку.
- с) Навздникъ (Ichneumon L'ichneumon Die Schlupfwespe). Тъло длинное и тощее, задняя часть его держится на длинномъ стеблъ. Щупальцы и ноги длинны. Самки кладуть свои яйца въ гусеницы или куколки бабочекъ или другихъ насѣкомыхъ. Онф умфють отыскивать такихъ животныхъ въ самыхъ скрытныхъ убъжищахъ и, втачиваясь въ нихъ, оставляють въ ранѣ по одному или по нѣскольку яицъ. Скоро-развивающіяся личинки навздника живуть общественно, въ этомъ странномъ жилищѣ, питаются жирнымъ тёломъ гусеницъ, которыя нередко остаются живыми, въ этомъ состояніи, до превращенія жильцовъ въ куколки, но тогда уже погибають оть внутреннаго разрушенія. Такимъ образомъ навздники уничтожають безчисленное множество вредныхъ гусеницъ.
- d) Пилильщикъ (Tenthredo La mouche à scie Die Blattwespe oder Schmetterlingswespe). Тѣло безъ перехвата, у личинки отъ 18 до 22 ногъ. Самка, высверливая въ вѣтвяхъ и другихъ частяхъ растеній ямки, кладеть въ каждую по одному яйцу. Похожія на гусеницъ личинки пилильщика становятся вредными, обгрызая молодые побѣги хвойныхъ деревъ.

Виды построекъ или песчанныхъ осъ (Sphex — Les sphex — Afterwespen). Живуть уединенно; большая часть ихъ роеть въ землё норы и, положивъ туда яйцо и мертвую гусеницу или паука, закапываютъ. Личинка скоро выходитъ и питается припасеннымъ насъкомымъ; съёвши его, она превращается въ куколку. На рисункъ изображена:

e) Щитовка (Sphex figulus—Sphex figites—Die Töpferwespe), которая вытачиваеть гнѣзда въ деревѣ и вымазываеть ихъ глиною.

- f) Шершень (Eumenes miraria Le frêlon Die Maurerwespe). Строить изъ песчинокъ замазки крѣпкія гнѣзда, состоящія изъ 4 до 5 ячеекъ въ рядъ, каждая на одно яйно.
- g) Настоящая oca (Vespa La guêpe Die eigentliche Wespe). Всѣмъ извѣстная, имѣетъ тело гладкое, нестрое, желтаго и чернаго цвътовъ. Осы живуть общественно, ихъ рои состоять, какъ у пчелъ, изъ существъ троякаго вида. Пища осъ весьма разнообразна и состоитъ изъ меда, плодовъ, сахара, вина, мяса; онъ истребляють также пчель и мухъ. Гнёздо ихъ чрезвычайно искусной постройки, длиною отъ 12 до 18, а шириною отъ 10 до 13 дюймовъ. Оно состоить не изъ воска, а изъ древесныхъ волоконъ, которыя осы отгрызають, своими кръпкими челюстями, отъ столбовъ, оконныхъ рамъ и т. д. и, смачивая клейкою слюною, превращають въ тѣсто, подобное бумажному.
- h) Пчела (Apis mellifica L'abeille Die Biene). Зам'вчательное нас'вкомое это, неподражаемымъ искусствомъ въ сооруженіи своихъ келій, особенностями общественнаго быта и многими явленіями въ образ'в жизни, обращаеть на себя внимание всъхъ мыслящихъ. Въ дикомъ состояніи животныя эти водятся въ дуплахъ, въ освоенномъ же, занимають улья, для нихъ выставляемые. Пчелиный рой состоить изъ трехъ видовъ насъкомаго, отличающихся между собою не столько наружнымъ видомъ, сколько образомъ жизни; въ каждомъ ров только одна самка, называемая маткою или королевою; самцовъ или трутней отъ 800 до 1,000, а рабочихъ ичель отъ 20 до 30,000.
- i) Муравей (Formica La fourmi Die Ameise). Видъ его всякому извъстенъ. Насъкомое это живетъ также обществами, состоящими изъ самцовъ, самокъ и рабочихъ; первые крылаты и живутъ только нъсколько недъль, послъднія составляють большинство и должны исполнять всъ работы. Хотя въ искусствъ строенія муравьи и отстаютъ отъ пчелъ, но ихъ жизненная дъятельность и заботливость ставятся въ образецъ прилежанія и трудолюбія.

V. Полужесткокрылыя насѣкомыя (Hemiptera — Les hemiptères — Halbdeckflügler).

Имѣютъ большею частію надкрылья, но вмѣсто челюстей суставчатый хоботъ, для всасыванія животныхъ и растительныхъ соковъ. Они подвержены превращенію, однако неполному. Между ними встрѣчаются породы, въ которыхъ самки, въ иныхъ же и оба пола почти всегда безъ крыльевъ, напр.

Съ лѣвой стороны.

- i) Клопъ постельный (Acanthia lectularia— La punaise — Die Bettwanze). Къ сожалънію, всёмъ и повсюду извъстенъ.
- k) Клонъ ягодный (Cimex baccarum La punaise des bois Die Beerenwanze). Водится на ягодахъ и садовыхъ плодахъ; извъстенъ своимъ дурнымъ запахомъ.
- 1) Челоносъ свѣтящій (Fulgora laternaria Le fulgore ou portelanterne Der Laternenträger). Большая американская, дивно окрашенная порода; считается украшеніемъ всякаго энтомологическаго собранія.
- m) Тля (Aphis—Le puceron—Die Blattlaus). Самець обыкновенно съ крыльями, самка же безкрыла. Эти маленькія насѣкомыя водятся общественно, на растеніяхъ. Впродолженіе лѣта рождають онѣ цѣлыя поколѣнія женскаго пола; самцы же родятся липь осенью. Безпрерывно высасывая сокъ изъ растеній, тля становится для нихъ чрезвычайно вредною.
- п) Червецъ или кошениль (Coccus La cochenille Die Schildlaus oder Cochenille). У самцевъ бываетъ и 2 и 4 крыла, но нѣтъ хобота; самки безъ крыльевъ, но имѣютъ хоботъ. Послѣ кладки лицъ, тѣло засыхаетъ и служитъ имъ покровомъ. Изъ нѣкоторыхъ видовъ добываютъ превосходную красную краску; наиболѣе цѣнится такъ-называемая настоящая кошенилъ или мексиканская, которую разводятъ подобно шелковичному червю. Она даетъ драгоцѣнный карминъ и ярко-красный цвѣтъ.

VI. Чешуекрылыя насѣкомыя или бабочки (Lepidoptera—Les lépidoptères—Schmetterlinge).

Имѣютъ 6 ногъ, полый, раздвоенный сосательный хоботъ; крылья ихъ покрыты разноцвѣтными чешуями. Превращеніе бабочекъ полное.

A. Дневныя бабочки (Papiliones — Les papilions — Tagflügler).

Гусеница ихъ большею частію иглиста, куколка голая, а бабочка летаетъ только днемъ. Между ними встрѣчаются, въ жаркихъ странахъ, большія, красивыя, разноцвѣтныя, величиною больше ладони. Изъ числа европейскихъ приводимъ:

Съ правой стороны.

- a) Аполлонъ (Parnassius Apollo—L'apollon— Der rothe Augenspiegel, Apollo). Крылья желтоватобёлы, заднія съ чудными глазными иятнами. Гусеница чернобархатная, съ красными иятнами, водится въ гористыхъ мёстностяхъ и держится на бёломъ дикомъ молодилѣ (sedum acre).
- b) Махаонъ (Papilio machaon—Le papillion à queue d'hirondelle—Der Schwalbenschwanz). Красиво желтый, съ черными полосками и желтыми, лункообразными пятнами, въ черной каемкъ. Зеленая, совершенно безволосая гусеница его питается укропомъ, морковникомъ и т. п.
- c) Траурная бабочка (Vanessa antiopa—Le deuil—Der Trauermantel). Черная, съ желтою каймою. Къ этому роду принадлежитъ также:
- d) Адмиралъ (V. atalanta L'amiral Der Admiralfalter). Черныя крылья съ красными перевязами, бълымъ и голубымъ крапомъ на оконечностяхъ крыльевъ.
- e) Перламутровая бабочка (Argynnis La nacre—Der Perlmutterfalter). Нижняя сторона задней пары крыльевъ въ серебристыхъ пятнахъ, съ перламутровымъ блескомъ. Гусеницы водятся на фіалкахъ.
- f) Иимфа Ирида (Nymphalis iris Le chotoyand Der Schillerfalter). Съ верху съ лазоревымъ отливомъ, имѣетъ бѣлыя перевязи. Гусеница питается листьями ивы.
- g) Голубецъ (Lycaena—L'azurin—Der Bläuling). Хотя малъ, но красотою крыльевъ (голубыхъ, съ бѣлою окраиною) соперничаетъ съ прекраснѣйшими большими бабочками.

ТАБЛИЦА XXVI.

- a) Боярышница (Pieris crataegi—Le gazé des haies Der Heckenweissling). Крылья желтовато-бълы, съ черными жилками. Гусеница ея обгрызаеть листья фруктовыхъ деревъ.
- b) Бѣлянка капустная (Pieris brassicae Le gazé du chou Der Kohlweissling). Нижнія крылья желты, переднія съ черноватыми концами, пятнами и каемками. Гусеница ея иногда пожираеть цѣлые огороды капусты.

B. Сумеречныя бабочки (Sphinges — Les sphinx, Crépusculaires — Dämmerungsfalter).

Щупальцы веретенообразны, крылья, въ спокойномъ состояніи, сложены горизонтально. Летаютъ большею частію только въ сумерки. Гусеницы имѣютъ 16 ногъ, куколки кругловаты и обвиты обыкновенно кокономъ или другою оболочкою.

- с) Бражникъ (Sphinx Le sphinx Der Schwärmer). Щупальцы оканчивающіяся заостреніемъ. Эти бабочки, при быстромъ полетѣ своемъ, издаютъ особенное, отличительное жужжаніе. Сюда принадлежатъ:
- d) Бражникъ молочайный (S. euphorbiae— Le sphinx de l'euphorbe — Der Wolfsmilchvogel). Крылья буровато-желты, съ красивыми зелеными перевязями; зеленовато-черная гусеница его водится на молочав.
- е) Бражникъ мертвецъ или мертвая голова (S. Acherontia atropos—Le sphinx tête de mort—Der Todtenkopf). Носитъ на спинъ изображеніе черена; большая бабочка эта проникаетъ въ улья, за медомъ. Красивая гусеница ея, съ желтыми и голубыми полосами, водится на картофельникъ, коноплъ и жасминъ. Превращеніе блестящей, коричневой его куколки происходитъ въ землъ.
- f) Смеринтъ глазчатый (Smerinthus ocellatus—Le paon du soir—Das Abendpfauenauge, Der Weidenschwärmer). Переднія крылья выпукло-угловаты и пестро-буры; на розовыхъ заднихъ крыльяхъ находится темносинее глазное пятно, съ черною каймою и такимъ же зрачкомъ. Его зеленовато-синяя, съ бъльми полосами и притомъ рогатая гусеница водится на тополяхъ, ивахъ и яблоняхъ.
- g) Сезія, щетинохвостка (Sesia Le sésiaire — Der Glasschwärmer). Щупальцы къ концамъ утолщены, крылья въ большей части своей прозрачны, задняя часть тѣла въ волосахъ. Похожа на осу, летаетъ жужжа и очень быстро. Безрогая гусеница водится внутри растеній и тамъ же превращается.
- h) Зигена (Zygaena filipendulae Le petit chardonneret Der Kolbenschwärmer, Distelfinkchen). Переднія крылья у самцовъ темносинія, у самокъ зеленоватыя, съ красными пятнами. Гусеница водится на клеверѣ камнеломкѣ и другихъ нѣжныхъ травахъ.
- i) Корнякъ хмѣлевый (Hepialus humuli—La phaléne du houblon—Der Hopfenschwärmer).

Зловредная гусеница его, обгрызая корни хмѣля, иногда истребляетъ цѣлые хмѣльники. Бабочка са́мка желтовата, съ оранжевыми полосами; самецъ серебристъ.

C. Ночныя бабочки (Phalaenae — Les phalènes — Nachtvögel).

Щупальцы щетинообразныя; крылья, въ покойномъ состояніи, сложены горизонтально или обвивають тёло. Гусеницы, для превращенія, запрядиваются въ коконъ; куколка валообразна. Ночныя бабочки летають обыкновенно только вечеромъ, послъ заката солнца. Сюда принадлежатъ шелкопряды (Bombyces — Les bombyces — Die Spinner), — съ гребенчатыми или зубчатыми щупальцами и короткимъ хоботомъ, коихъ гусеницы большею частью волосаты, о 16 ногахъ, съ горбиками; производятъ прядь удивительнаго совершенства и ходомирки (Geometridae — Les arpenleuses — Spanner) съ щупальцами, по большей части щетинообразными, коихъ гусеницы отличаются отъ другихъ гусеницъ способомъ движенія (см. ниже, р).

- ј) Ночной навлинъ (В. pavonia—Le paon de nuit — Das Nachtpfauenauge). Наибольшая изъ европейскихъ бабочекъ — съ распростертыми крыльями бываетъ величиною въ 6 дюйм.; на каждомъ изъ буро-сѣрыхъ крыльевъ его по одному большему глазному иятну. Гусеница зеленая, съ голубыми, звѣздообразными бородавками.
- к) Шелкопрядъ настоящій (В. mori Le bombyx, ver-à-soie Der Seidenspinner, Seidenwurm). Съ грязно-бѣлыми, зубчатыми крыльями. Искусная прядь его гусеницы (извѣстнаго шелковичнаго червя), до превращенія въ куколку, даеть обыкновенный шелкъ. Гусеница питается листьями тутоваго дерева и живеть въ этомъ состояніи отъ 6 до 7 недѣль. Шелкъ, около 1300 лѣть тому назадъ, занесенъ изъ Азіи въ Европу, а отсюда и въ Америку.
- 1) Шелкопрядъ монашенка (В. Liparis monacha — La nonnette — Die Nonne). Бѣловатый, съ черными, неправильными полосками; гусеница его сѣрая, съ синими и красными бородавками; причиняетъ страшный вредъ сосновымъ лѣсамъ.
- m) Крушень древоточецъ (Coccus ligneperda—La chenilla de saule—Die Weidenraupe). Водится въ древесинъ ивы, дуба и ильма, вытачивая ее кръпкими своими

челюстями. Красноватая, съ черною головкой. Превращенія совершаются въ два года.

- n) Совица (Noctua—Le zigzag—Das Eulchen). Хоботь длинный, щупальцы одиночныя; нижнія крылья больше верхнихъ и различнаго съ ними цвѣта; гусеницы о 16 ногахъ.
- o) Шелкопрядъ ясневый (Catocala fraxini—Le cordon bleu—Das blaue Ordensband). Красивая и большая бабочка: нижнія крылья по черному полю украшены голубою поперечною перевязью. Гусеница водится на ясенѣ.
- р) Ходомѣръ янимовый (Phalaena syringaria—L'arpenteuse du sureau—Der Fliederspanner). Крылья угловаты,—съ янимовыми перевязями. Гусеница водится на бузинѣ и, не имѣя среднихъ брюшныхъ ногъ, для передвиженія, цѣпляется сперва передними ногами, сгибаетъ тѣло въ дугу и такимъ образомъ приближаетъ заднія ноги къ переднимъ; тогда, отцѣпившись передними, она выпрямляется, дѣлая такимъ способомъ большіе шаги.

Листовертка (Pyralis — La pyrale ou tordeuse — Der Zünsler oder Wickler). Гусеница завертывается въ цвѣтки или въ листья. Бабочка отличается своими, сзади усѣченными, трехугольными крыльями, напр.

q) Листовертка дубовая (P. tortia quercana— La pyrale du chène — Der Eichenwickler). Верхнія крылья зелены, по нимъ двѣ бѣлыя поперечныя полосы; нижнія крылья блѣдножелты.

Пальцекрыль (Pterophorus—Le teigne— Die Federmotte). Съ перообразными крыльями, напр.

- r) Фалена пятипалая (Pt. pentodactylus Le ptérophore pentadactyle Das Geistchen). Крылья снѣжно-бѣлы, верхнія раздѣлены на два, а нижніе на три перообразныхъ отдѣла. Гусеница ея водится на сливѣ и терновникѣ.
- s) Платяная моль (Tinea sarcitella La teigne de draps Die Kleidermotte). Портить шерстяное платье.
- t) Моль шубная (T. pellinella La teigne des fourrures Die Pelzmotte). Портить мъха.
- u) Моль хлѣбная (T. granella La teigne de grains — Die Getreidemotte). Въ видѣ

бѣлаго хлѣбнаго червя сильно новреждаеть хлѣба.

ТАБЛИЦА XXVII.

VI. Мухи или двукрылыя насѣкомыя (Diptera — Les diptères — Die Fliegen oder Zweiflügler).

Имѣютъ два крыла и шесть ногъ; ротъ, у большей части, снабженъ хоботомъ. Личинка ихъ — червякъ; куколка лежитъ обыкновенно неподвижно, въ оболочкъ.

- а) Оводъ (Vestrus L'oestre Die Bremse). Густо поросшій волосами, величиною и видомъ похожъ на шмеля, но не имѣетъ хобота. Принадлежитъ къ числу величайшихъ мучителей лошадей, рогатаго скота, оленей и нѣкоторыхъ другихъ четвероногихъ, кладя въ нихъ свои яйца, превращающіяся въ личинки, которыя питаются соками этихъ животныхъ. Личинки эти водятся или подъ кожею, или въ желудкѣ и въ кишечномъ каналѣ, —даже въ носовыхъ полостяхъ.
- b) Слѣпень (Tabanus Le taon Die Viehbremse). Хоботъ выдающійся, голова и грудь одинаково широки; глаза такъ велики, что почти сходятся между собой. Слѣпень сосетъ кровь у людей и четвероногихъ, въ особенности у лошадей и рогатаго скота.
- c) Жигалка (Conops—La mouche piqueuse— Die Stechfliege). Похожа на комнатную муху, но больно жа́лить.
- d) Обыкновенная комнатная муха (Musca domestica La mouche domestique Die eingentliche Fliege, Stubenfliege). Докучливое насъкомое это человъкъ встръчаетъ повсюду.
- e) Муха живородная или плотоядная (М. carnaria La mouche dorée commune Die Fleischfliege). Рождаеть живыхъ червей на всякомъ мясъ, которое отъ этого скоро гніеть.
- f) Комаръ (Culex pipiens Le cousin Die Singmücke, Stechmücke, Schnacke). Самое докучливое изъ насѣкомыхъ нашего климата, но кусаются однѣ только самки; самцы же мирно выплясываютъ по воздуху, подъ звуки собственнаго жужжанія.
- долгоножка или конскій комаръ (Тіриla — La tipule — Die Wiesenschnacke).
 Гораздо больше предъидущаго. Личинки его водятся подъ землею, ползають часто ты-

сячами, въ стройныхъ рядахъ, и вредны тъмъ, что поъдаютъ корни травъ.

VIII. Безкрылыя насѣкомыя (Aptera— Le Aptères — Ungeflügelte Insekten).

Имѣютъ шесть ногъ, крыльевъ же у нихъ нѣтъ. Они большею частію чужеядники; немногія лишь изъ нихъ подвергаются превращенію.

- h) Вошь (Pediculus La pou Die Laus). Отвратительное это насѣкомое водится на людяхъ и животныхъ. Вошь на человѣкѣ бываетъ трехъ видовъ: головная, платяная и изнурительная. (На рисункѣ изображена въ увеличенномъ видѣ).
- i) Влоха обыкновенная (Pulex irritans—La puce Der Floh). Всему свъту извъстное, прыткое насъкомое, водится преимущественно на собакахъ. (Рисунокъ і изображаетъ блоху въ томъ видъ, какъ она представляется подъ увеличительнымъ стекломъ).
- ј) Нарывная блоха (Р. penetrans La puce pénétrante ou la chique — Der Sandfloh). Гораздо опаснѣе предъидущей, водится въ Южной Америкѣ и Вестъ-Индіи. Она втачивается подъ ногти человѣческихъ ногъ и кладетъ тамъ свои яйца; если ихъ не вырѣзатъ заблаговременно, то вышедшія изъ яицъ личинки причиняютъ опасные нарывы, влекущіе за собою отнятіе пораженной части.
- к) Скодопендра (Scolopendra La scolopendre Der Scolopender). Тъло длинное, состоящее изъ множества кольцеобразныхъ суставовъ, каждый съ двумя ногами. Питается насъкомыми; нъкоторыя породы издають свътъ; кусающая сколопендра имъетъ 21 пару ногъ, бываетъ длиною въ 5 дюйм. и водится на Антильскихъ островахъ. Укушеніе ея опасно.
- IX. Безпозвоночныя животныя (Araneacea—Les Arachnides Spinnenartige Thiere). Осьминогія, безъ щупальцевъ, голова срос-шаяся съ нагруднимъ щитикомъ.
- 1) Клещь собачій (Ixodes ricinus La tique Die Zeche, Der Holzbock). Тёло кожистое, безъ замётныхъ глазъ, водится на деревьяхъ и кустарникахъ, съ которыхъ падаетъ на проходящихъ собакъ, овецъ, рогатый скотъ и т. п., всасывается въ кожу и мясо животныхъ, такъ что трудно его оттуда извлечь.
- m) Акаръ (Acarus L'acaride ou la mitte Die Milbe). Тъло мягкое, челюсти клешне-

образныя, большею частью такъ малы, что бывають видимы только подъ увеличительнымъ стекломъ. Водятся повсюду, въ съёстныхъ принасахъ, на кожё животныхъ, а нёкоторыя въ нарывахъ и прыщахъ, напр. въ чесоточныхъ.

Пауки (Aranea—L'araignée — Die Spinne). Многочисленныя породы ихъ ткутъ сѣти, съ замѣчательнымъ искусствомъ, для жилья, для ловли, частію же только для защиты своихъ яицъ. Всѣ пауки питаются меньшими насѣкомыми или пожирають другъ друга — даже самка самца. На рисункахъ изображены:

- n) Крестоносецъ (A. diadema L'araignée porte-croix Die Kreuzspinne). Желтобуро-кранчатый, съ бѣлымъ нятиконечнымъ крестомъ на снинъ.
- o) Паукъ домашній (A. domestica—L'araignée domestique — Die Fensterspinne). Темносѣро-бураго цвѣта.
- p) Тарантулъ или мизгирь тарантулъ (Lycosa tarantula La tarentule Die Tarantel). Водится въ Индіи и на Кавказѣ. Его укушеніе не такъ опасно, какъ полагають, по народнымъ сказаніямъ.
- q) Скорніонъ (Scorpio Le scorpion Der Scorpion). Грудь и брюхо въ ширину сросшіяся. Суставчатый хвость оканчивается жаломъ, изъ подъ острія котораго вытекаеть ядь. Укушеніе большихъ породъ скорпіона, которыя водятся въ жаркихъ странахъ, весьма опасно; не такъ страшны скорпіоны, встрѣчаемые въ Южной Европѣ. Питаются они насѣкомыми и рождаютъ живыхъ дѣтей.
- г) Лжескоријонъ (Chelifer cancroides Le faux scorpion — Der Bücherscorpion). Крошечное, темнобурое или черноватое насѣкомое, похожее на скоријона, безъ хвоста, водится въ старыхъ книгахъ, питаясь акаридами.
- X. Скордунняки (Crustacea—Les crustacés— Die Krustenthiere). Безкрылыя, суставчатыя животныя, дышащія жабрами.

Раки (Thoracostraca — Les écrevisses — Die Krebse). Голова и грудная часть болье или менье покрыты сверху крынкою бронею, глаза стебелечные, роть снабжень полнымь жевательнымь организмомь. По выходы изъ яйца дальныйшимъ превращениемъ не подвергается и, вообще, представляеть наиболье развитое животное этого класса. Изъ множества видовъ

рака, водящихся въ особенности въ морѣ, здѣсь изображены:

- t) Нашъ обыкновенный ракъ (Astacus fluviatilis L'écrevisse commune Der gemeine Krebs). Болѣе или менѣе темные цвѣта́ рака, послѣ отварки, превращаются въ красный. У мертваго хвость совершенно выпрямляется. Раки эти живуть до 20 лѣтъ, не переставая рости, и достигаютъ величины въ пядю. Замѣчательно, что у рака потерянныя клешни снова отростають и что мясо его бываетъ вкуснѣе въ тѣ мѣсяцы, въ названіе которыхъ не входитъ буква Р.
- u) Ракъ морской (A. marinus Le homard, ou l'écrevisse de mer Der Hummer). Бываеть длиною до $1^{1/2}$ ф., водится по берегамъ Европы и составляеть дакомое кушанье.
- v) Крабъ, странникъ полевой (Cancer gecarcinus ruricola — Le tourlouroux, ou le crabe de terre — Die Landkrabbe, Wanderkrabbe). Водится въ Вестъ-Индіи и въ Южной Америкъ, проводитъ большую часть года на сушъ; днемъ скрывается въ норахъ, вечеромъ же выходитъ за пищею и бъгаетъ необыкновенно скоро. Къ времени размноженія крабы въ несмѣтномъ количествъ отправляются къ морю, гдъ оставляютъ свои яйца. При этихъ походахъ они слъдуютъ неуклонно прямому направленію, перелъзая всъ преграды, даже черезъ дома.
- w) Отшельникъ діогеновъ (Padurus Bernhardi L'hermite, le pagure Der Einsiedler, Bernhardskrebs). Для сбереженія обнаженнаго хвоста своего, ракъ этоть прячеть его въ пустыя раковины. Водится во множествѣ въ моряхъ Евроны.
- х) Мокрица водяная (Oniscus murarius Le cloporte Der Kelleresel, Keller-Assel). Хвость шести-суставчатый. Водится обыкновенно по темнымъ и сырымъ мѣстамъ.
- y) Мечехвостъ молукскій (Limulus Le limule ou crabe des Moluques Der Molucken-krebs). Водится въ Индійскомъ океанѣ, бываеть отъ 1 до 2 футъ величины; движенія его тихи.
- z) Дафнія, водяная блоха (Daphnia pulex— La daphine—Der Wasserfloh). Туловище заключено въ прозрачную оболочку, голова свободна, съ однимъ только глазомъ, ноги раз-

вётвлены. Длина животнаго только въ одну линію, лётомъ и весною оно бываетъ краснымъ, въ остальное время зеленовато - бёлымъ и водится въ несмётномъ количеств въ стоячихъ водахъ, плавая необыкновенно скоро. (Къ этому разряду принадлежатъ изображенныя въ таблицё XX кистеногія животныя а, b и d).

тавлица ххуш.

Черви (Vermes — Les vers — Würmer).

Тѣло продолговатое, по большей части суставчатое, болѣе или менѣе валообразное, вовсе безъ ногъ, или съ ногами безсуставными. Внутреннее построеніе чрезвычайно разнообразно, такъ что о немъ мало можно сказать общаго. Изъ числа червей, живущихъ въ брюшныхъ полостяхъ другихъ, большихъ животныхъ и называемыхъ инстами (Entozoa — helminthes ои vers intest паих—Eingeweidewürmer), приводимъ слѣдующія:

- a) Пузыристая глиста (Hydatis La hydatide Der Blasenwurm). Водится иногда въ мозговой полости овецъ и причиняетъ бользянь круженія.
- b) Аскарида кишкососъ и прыгунчикъ (Ascaris varmicularis et lumbricoides L'ascaride Der Spulwurm und Springwurm). Водится часто въ кишкахъ человъка, особенно у дътей. Кишкососъ тонокъ, нитеобразенъ; прыгунчикъ же толщиною въ дождеваго червя.
- с) Струнецъ медицинскій или подкожная глиста (Filaria medinensis Le filaire Der Medinawurm). Бываеть длиною до 12 футь, а толщиною въ кишечную струну. Извъстенъ въ Азіи и въ Африкъ; водится у человъка подъ кожею, именно у ногъ, откуда его извлекають весьма осторожно, потому что, въ случать оборванія, оставшаяся часть причиняеть антоновъ огонь.
- d) Цѣпень обыкновенный или солитеръ (Таепіа La taeпіе ou le vers solitaire Der Bandwurm). Большею частію силющенный, въ видѣ ленты, состоить изъ множества суставовь. Съ передняго конца солитеръ тонокъ, какъ нитка, и уширяется постепенно. Голову едва можно различать простыми глазами. Живетъ въ кишкахъ человѣка и, достигая длины до 10 аршинъ и болѣе,

разстраиваеть здоровье; изгоняется не легко.

Кольчецы или Аннелиды (Annularia — Les annelides — Ringelwürmer), живущіе въ твердой скорлунть.

Имѣютъ тѣло валообразное, составчатое, и кругообращающуюся, красную кровь, мѣшковидный пищевой каналъ и суставчатый нервный узелъ; имѣютъ также органы дыханія.

- е) Дождевой червь (Lumbricus terrestris Le lombric terrestre Der Regenwurm). Съ жесткою щетиною; колецъ у него насчитываютъ иногда до 120 и даже болѣе. Питается землею, но и обгрызаетъ и корешки огородныхъ растеній, которыя отъ этого увядаютъ.
- . Піявка (Hirudo—La sangsue—Der Blutegel). Ротъ вооруженъ 3-мя челюстями, задъ оканчивается сосательнымъ хоботкомъ. Всѣ виды ніявокъ водятся въ водѣ и сосутъ кровь.
- f) Гладкотёлая врачебная піявка (H. officinalis— La sangsue médicinale, officinale— Der officinelle Blutegel). Спинка черноватая, съ шестью ржаво-красными продольными, ровными полосками, брюхо оливковожелтоватое и безъ пятенъ. Піявка эта употребляется для кровопусканія и сдёлалась поэтому предметомъ торговли.
- g) Конская піявка (Н. Gulo—La sangsue de cheval Der Rossegel). Цвётомъ темнѣе, безъ пятенъ, рёдко со спинными полосками. Для кровопусканія не годится, потому что укушеніе ен часто производитъ злыя раны. Кольчецы или аннелиды, въ жесткой оболочкѣ (Tubicoles Annelides tubicoles Ringelwürmer, die in harten Schaalen stecken).
- h) Клыканъ (Dentalium La dentale Das Meerzähnchen). Трубчатая оболочка съ обоихъ концовъ открыта.
- i) Серпула или Змѣйчатка (Serpula La serpule Die Wurmröhre). Заключая въ себѣ червяка, представляетъ твердую, известковую круглую трубочку; жаберные пучки похожи на пучки перьевъ.
- к) Нереида или морская сколопендра (Nereis—La nereïde—Die Nereide). Черви эти держатся стоймя, въ нескѣ морскаго дна; нѣкоторые изъ нихъ издаютъ фосфорическій свѣтъ.
- 1) Афродита или морская гусеница (Aphrodita—L'aphrodite—Der Goldwurm, Die schillernde Seeraupe). Имъетъ по бокамъ кръп-

- кія колючки и пучки золотисто блестящей щетины, игрою цвѣтовъ не уступающіе колибри и самоцвѣтнымъ каменьямъ.
- m) Наяда (Naïs La naïs Das Wasserschlängelchen). Тѣло просвѣчивающее, усаженное щетинкою; встрѣчается и въ прѣсныхъ водахъ Европы.

Лучистыя животныя или животнорастенія и наливочныя животныя (Radiaria — Animaux rayonnés — Strahlenthiere, oder Pflanzen- und Aufgussthiere).

Лучистыя животныя имёють лучеобразныя части тёла, коихъ главные органы находятся въ средине, а остальные вокругъ. Большая часть изъ нихъ имёеть ротъ и пищевой каналь; головы же и органовъ чувствъ вовсе нётъ, а у большей части отсутствуютъ и нервы. Внёшнія формы весьма различны. Всё онё живуть въ водё.

- п) Зеленый полипъ (Hydra viridis Le hydre Der grüne Armpolyp). Встрычается длиною въ 1/2 д., вытви (руки) его короче тыла. Животное это походить на одушевленное растеніе. Въ моры обрытаются безчисленные виды такихъ животнорастеній, съ отростками для хватанія; они водятся несмытными семействами, постепенно осаждая внутри себя, изъ собственныхъ тылесныхъ соковъ, твердую массу, древенистаго, роговаго или каменнаго свойства. Такія скопища животныхъ съ ихъ стебельками называются животно-растеніями. Сюда причисляются:
- о) Пробчакъ (Alcyonium L'alcyon Der Korkschwamm). Высушенный дѣлается ноздреватымъ и легко ломается; въ свѣжемъ же состояніи онъ мясисть, гибокъ и насквозь пророщенъ мелкими полипами.

Здѣсь же изображена и морская или такъ называемая грецкая губка (Spongia marina — L'eponge de mer — Der See- und Badeschwamm), которая, до новѣйшихъ временъ, причислялась къ многорукимъ полинамъ, но окончательно оказалась принадлежащею къ классу животно-растеній. Находится во множествѣ около острововъ и въ бухтахъ Средиземнаго моря, гдѣ добывается изъ глубины водолазами. Въ свѣжемъ состояніи ея скважены наполнены бываютъ органическимъ студнемъ, отъ котораго необходимо очистить губку, чтобъ она не гнила.

ТАБЛИЦА ХХІХ.

- а) Горгонія (Gorgonia La gorgone Die Gorgonien- oder Hornbaumkoralle). Стволь гладкій, рогообразный, иногда даже древенистый; мясистая кора горгоніи, по вынутіи изъ воды, не опадаеть, но остается ввидѣ известковой оболочки. Во всѣхъ моряхъ встрѣчается множество видовъ этой красивой породы.
- b) Морская перушка (Pennatulla La pennatule Die Seefeder). Стволь образуеть простой, полый стержень, внизу обнажень, а вверху покрыть тысячами полиповъ. Всѣ эти полипы оживлены будто одною волею, потому что двигаются всѣ разомъ и по одному направленію.
- с) Милепора (Millepora La millepore Die Millepore). Стволъ суковатъ или плоскъ, съ крошечными отверзтіями въ оконечностяхъ. Полицы большею частію безъ рукъ.
- d) Мадрепоровые полипники, звѣздчатые коралды (Madrepora Les madrepores Die Sternkorallen). Имѣють красивыя звѣздоподобныя отверзтія, съ листочными ячейками.

Эти кораллы выростають очень скоро, и они-то, подъ названіемь коралловыхь рифовъ, представляють такую опасность мореплаванію. Возвышаясь надъ уровнемь моря, они образують цѣлые острова, которые, чрезъ постепенное вывѣтриваніе поверхности и при содѣйствіи наносовь изъ растительныхъ веществъ, получають плодоносную почву и современемь обращаются въ удобообитаемые для человѣка острова.

e) Кораллъ красный (Corallium rubrum, Isis nobilis — Les coraux — Edelkorallen, rothe Korallen). Находятся большею частію на большихъ глубинахъ, на днѣ морскомъ, въ видѣ деревьевъ, твердыхъ какъ камень, откуда добываются водолазами или носредствомъ сѣтей. Изъ этихъ коралловъ выдѣлываются цѣнный дамскій украшенія.

Морскія крапивы, кисели (Acalephae — Les acalephes ou orties de mer — Die Meernesseln, Quallen). Студенистыя, свободно плавающія лучистыя животныя, снабженныя особенными, лучеобразно - расположенными пищевыми каналами. Водятся во всёхъ моряхъ; ночью онѣ свётятъ, прикосновеніе къ ихъ щупальцамъ производитъ жгучее ощущеніе, смертоносное для мелкихъ животныхъ, кото-

рыхъ морская кранива высасываетъ, посредствомъ своихъ сосательныхъ трубочекъ.

Здёсь изображены:

- f) Медуза (Medusa rosea La méduse Die Rosenqualle). Особенно часто встрѣчаемая въ Балтійскомъ морѣ.
- g) Парусникъ (Velella La vellèle Die Segelqualle). Оболочка хрящеватая, на верхней сторонѣ ея имѣется листообразный хрящъ, которымъ животное, при плаваніи, пользуется какъ бы парусомъ. По ночамъ ярко свѣтитъ и встрѣчается во всѣхъ моряхъ.
- h) Дынникъ (Beroë—Le beroë—Die Rippenqualle). Тѣло яйцеобразное, съ 8-ю рядами илавательныхъ пластинокъ. Большая часть этихъ киселей ярко свѣтитъ и искрится, подобно самоцвѣтнымъ камнямъ.
- i) Физалія или аретуза (Physalia Stephanomia La physalie Die Blasenqualle).
 Плаваеть по морю посредствомъ своего пузыра, наполненнаго воздухомъ. Пузырь длиною 8 дюйм., блестящаго багроваго цвѣта; сосательныя трубки свѣтло-фіолетовы, а хватающія нити блѣдно-красны. Встрѣчается въ Атлантическомъ океанѣ.
- k) Стефаномія (Stephanomia amphitritis L'amphitrite—Die Kranzblasenqualle). Встрівчается также въ Атлантическомъ океан'в; ночью світить, подобно звіздному вінку.

ТАБЛИЦА ХХХ.

а) Актинія или морской анемонъ, конскій (Actinia — L'anémone de mer — Die Seeanemone). Походить часто на нестрый цвѣтокъ со множествомъ лепестковъ, прикрѣпленный широкою, гладкою нижнею частію своего.

Шероховики (Echinodermata — Les échinodermes — Stachelhäuter). Организмъ ихъ болъе развитъ, чъмъ у морскихъ киселей.


- b) Морская звѣзда (Asterias L'astérie Der Seestern). Имѣетъ видъ звѣзды, обыкповенно о 5 лучахъ.
- c) Офіура или змѣехвостка (Ophiura L'ophiure — Der Schlangenstern). Около круглаго щита имѣетъ пять змѣеобразныхъ, длинныхъ, составчатыхъ лучей. Встрѣчается по всѣмъ морямъ.
- d) Морской ежъ (Echinus—L'échinide, oursin ou hérisson de mer Der Seeigel). Кругловатый, имѣетъ известковую, тонкую скорлупу; внизу, по срединѣ ея, расположенъ


большой роть, изъ котораго торчать иять крѣпкихъ зубовъ. На скордупѣ правильные продольные ряды бородавокъ, снабженныхъ шипами, двигающимися по произволу животнаго. Находящіеся у задняго прохода яичники, имѣющіе каждый свое отдѣльное наружное отверзтіе, употребляются въ пищу.

- e) Медузникъ (Gorgonocephalus La tête de Meduse Der Medusenstern). Тѣло о пяти главныхъ лучахъ, которые вилообразно раздѣляются на множество вѣтвей, такъ что число оконечностей доходитъ до 8,000. Встрѣчается почти во всѣхъ моряхъ.
- t) Энкринъ, морская нальма (Pentacrinus— L'encrine — Die Meerpalme). Стебель пятигранный, а звѣзда о пяти лучахъ; каж-


дый лучь опять раздваивается; кромѣ того, по стеблю расположены, съ промежутками, мутовки. Замѣчательно, что каждая часть можетъ двигаться независимо отъ прочихъ. Странное животное это принадлежитъ къ величайшимъ рѣдкостямъ и внутреннее строеніе его еще мало извѣстно.


Оканчивая на этомъ рядъ нашихъ изображеній къ естествоописанію животныхъ, мы оставляемъ незатронутымъ еще цёлый, отдёльный міръ существъ микроскопическихъ, называемыхъ животными наливочными или инфузоріями, коихъ существованіе уловимо для нашего ока только при помощи сильнъйшихъ микросконовъ.




















































































































































































र १५०

